



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1595/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1595/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1595/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1595/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1595/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1595/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1595/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1595/A


1595⁵ A

L. xxxiii. Cvi









VAL. CORDI

DISPENSATORIVM, 42550

SIVE

PHARMACORVM

CONFICIENDORVM

RATIO.

PIETRO COVDEBERGO Pharmacopo-
Antuerpiano plusquamtrigentis erroribus libe-
rata atque vindicata, scholisque illustrata:

ADLECTO, VALERII CORDI NOVO
libello, aliisq; paucis post praefationes annotatis.

Quid porro à MATTHIA LOBELIO pra-
stitum sit, sequens pagina indicabit.

Metal



LUGDVNI BATAVORVM,
EX OFFICINA PLANTINIANA,
Apud Franciscum Raphelengium,
CLIO. 10. XC.

His accessit DIARIUM PHAR-
MACORUM parandorum SIM-
PLICIUM QVE colligendorum

Matthia LOBELIO apud Middel-
burgenses Medico collectum.

*Additis aliquot selectioribus cathartici me-
dicamentis, & emendatioribus quotidiano-
rum lenitiuorum vsitatissimorum solutiuo-
rumque medicamentorum descriptionibus;
alioqui vbique passim officinarum perperam
peruersis: Eodem LOBELIO auctore.*

³
VIRTVTVM OMNI

GENERE CLARISS. VIRO

D. GERARDO GRAMAIO,

Domino Vefaliæ Comitæ, ac ærarij
bellici Quæſtori Statuum digniſſimo,
Petrus Coudenbergius S. P.

CVM Valerij Cordi de conficiendis
Pharmacis libellum Chriſtophorus
Plantinus prælo ſuo eſſet commiſſu-
rus, rogauit me, vt ſi quid haberem quod edi-
tionem iſtam iuuare poſſet, cum ſtudioſis
communicarem. Fuit enim optimo viro ſem-
per propoſitum, vt quos libros imprimit, non
niſi emendatiſſimè è ſua officina prodire ſinat.
Quamobrem, vt de ipſius incredibili taceam
diligentia & ſumptu, in omni diſciplinæ
genere doctiſſimorum virorum opera vititur.
Ego verò, etſi quæ iam olim in hunc Cordi
libellum (quem ego, quicquid dicat præſatio
anonyma, poſt obitum auctoris in lucem hæ-

A 2

redam

redum vel amicorum cura produsse, certis de
caussis persuasum habeo) annotaueram, non
essent apud me tanti momenti, vt vel semel
de illorum editione cogitauerim; tamen non
potui non homini mihi amicissimo, & hone-
sta petenti morem gerere. Quare vespertinas
aliquot hac hieme horas; quæ solæ me quid
scribere vel legere permittebant, libelli huius
correctioni dedi; & maximo mendorum nu-
mero sublato, in suum quæque ordinem re-
stitui; multis interim ipsius auctoris adiectis
medicaminibus, quæ hætenus hîc fuerunt
desiderata; ita vt operam me meam non
malè posuisse confidam: vbi à nonnullis haud
immeritò notatur, explicatè subiunctis id
rationibus doceo, & nonnumquam ineptas
quorundam reprehensiones refuto, quæ solo
nouitatis studio sine vllis rationibus videntur
inactæ. Si quid autem à me erit omissum,
copiosè & diligenter excutietur in magno
meo huius farinae opere, quod fortasse ali-
quando

quando medicis & pharmacopœis non minorem voluptatem quàm vtilitatem adferet. Quod verò illud nondum perficiam & publicem, maximas habeo & grauissimas consilij mei causas, tum quòd eorum fauore non subleuer, quorum intererat curare vt tale quid diligenter præscriberetur; tum quòd tempora sint eiusmodi, vt plures fiant aliptæ, quàm experti Medici & Pharmacopœi. Qua de re cùm mecum cogito, nihil fero molestius, quàm gentis nostræ inscientiam; quæ cùm in alijs ferè rebus omnibus nulli sit nationi secunda, nusquam aequè peccat, quàm quòd nostri ordinis hominibus sit iniquior. Id verò pluribus verbis aperire non est necesse. Quis enim est vel mediocriter in pharmacopolijs versatus, cui hoc non sit notissimum? Magna spes erat præterea, Ioannem Goropium Becanum, non tantùm rei Medicæ, sed vniuersæ Philosophiæ & antiquitatis peritissimum virum, aliquid de
A 3 pharma-

pharmaceutice scripturum. quod vinam fecisset. Sed quia nunc omni doctrina refer-
tum opus, quod verè veneranda antiquita-
tis plaustrum quis appellet, præ manibus ha-
bet, nostris certè rebus vacare non potest:
ideoque nec hortum, ut constituerat, colere.
Id quidem ego totis serè viginti annis feci
sedulò: & quidem nunc maximis labori-
bus & impensis, ad sexcenta exoticarum
stirpium genera in meo florere hortulo quo-
tidie, etsi rei familiaris cum iactura & di-
spendio; maxima tamen cum voluptate cer-
no. Et nisi cultor pauperis horti esset pau-
perior, darem operam, ne quid mihi dces-
set, quod nostra saltem tellus, licet summa
cura, ferre posset. Interea id quod possum
ago, quando quod volo non licet. Speran-
dum, inquit Euripides, & ferendum. Ce-
terum, ut ad institutum redeam, quæ in
hoc opusculo præstiti, illa tibi Gerarde Gra-
maie, singularis omnium bonarum artium
patro-

EPISTOLA.

7

patrone, dico dedicóque; partim vt obser-
uantiam erga te meam testificer, partim
vt hac qualtacumque nominis tui auctori-
tate inuinita, inuidiam & calumnias tanto
facilius ferant. Suscipies ergo hac, qua tua
est humanitas, benigno vultu, quo Petrum
Coudenbergium in tuam iam pridem clien-
telam recepisti; & receptum constanter tue-
ri pergis. Vale, Macenas optime. Ex offi-
cina nostra pharmaceutica, Antuerpia Ka-
lend. Martius cIo. Io. LXVIII.

A 4

PRÆ-

PRÆFATIO PRISCÆ
EDITIONIS, AD
LECTOREM.

CUM Valerius Cordus, Eutitij illius
celeberrimi Medici filius, studiorum
gratia Italiam petiturus, obiter ad
urbem nostram Norimbergam per-
uenisset, atq. cum doctis quibusdam ac bonis
viris, præcipuè Medicis, mutuâ notitiâ, ami-
citiam, familiaritatemq. studiosè contraheret:
inter cetera, quæ de bonis literis atq. re Me-
dica, vtrò citroq. inter eos familiariter, ut fie-
ri solet, agitata sunt, mentio incidit Dispensa-
torij, quod ipse ex omni genere honorû aucto-
rum, cum veterû, tum recentium, de Pharma-
corum omniû, quatenus in usu sunt, cõficien-
dorum ratione collectum, diligenter & emen-
datissimè conscripserat. Cumq. cõstaret, illud
iam antea in aliquot Saxonix urbibus, præci-
pue Medicis approbâribus, in usum publicum
fuisse receptum, interimq. tamè ab eo & locu-
pletatû, & annotationibus eruditis magis atq.
magis illustratum; rogatus fuit à cõpluribus,
ut illud ipsum etiam nostris Pharmacopolis
impertiret. Cordus autè, etsi ad iuuandam rem
Medi-

Medicam iam tum mirificè esset accensus, pro sua tamen modestia atq. prudentia, non nihil subuerebatur priuatam suam auctoritatem ad Pharmacopolas permouēdos, ponderis haudquaquam satis esse habitam. Itaque librum suū Senatui potius offert, tum demū in vsum publicum assumēdum, cum esset illius iudicio & auctoritate comprobatus. Senatus verò, pro sua in studiosos omnes propensione, ac reipublicæ omni ex parte iuandæ diligētia ac sollicitudine, officiū illud Cordi perquàm gratum habuit, librumq. collegio Medicorum, Cordo præsentē, perlegendū & examinandū tradidit: ut si quid mutandū, adiiciendūve arbitrari essent, id auctore non modò sciente, verū etiam consentiente fieri posset. Quod cum sedulò ac magna diligentia factum esset, Senatusque ex Medicorum censura iam intellerisset, nihil hætenus absolutius aut emendarius in hoc descriptionum genere typis inuulgatum esse: librum nō solum in publicum edendum, verū etiam Pharmacopolis, ut eum veluti lumen quoddā deinceps sequantur, offerendum esse decreuit. Cuius quidem editioni, hæc quoq. de causa studiosius inuigilatum est, ut auctore interim in Italia, dū ad metā studio-

A 3 rum

rum suorum quàm acerrimè cōtendit, imma-
tura morte sublato, aliquid tamen illius exta-
ret, quod ingeniū eius & industriā posteritati
restaretur, eumque ab obliuione vindicaret.

Hoc igitur Valerij Cordi, candidissimi &
diligentissimi iuuenis monumentum quale-
cunque, certè non pœnitendum, studiose le-
ctor, obuiis vlnis amplectere, & si quid ex eo
iuuaberis (iuuaberis autem, nisi fallor, quàm
plurimum) amplissimo Norimbergensi Sena-
tui, cuius libera'itate tibi communicatur, gra-
tias habe. Sin autem aliquid in eo displicue-
rit, ne Auctorem mortuum inhumaniter ca-
lumniis impetēs sed absolutiore opère in pu-
blicum edendo, illum vincere, & nomen eius
obscurare contende. Et bene vale.

I O A N N E S P O S T H I V S

D. M E D I C V S G E R M A N V S.

Pharmaca quæ Cordus variis collegit in hortu

Lætus agens aut tempora verna sui,

Post obitum in multos transcripta fuere libellos,

Perum his errores non tolerandi inerant;

Quos gelido veniens Petrus de monte remouit,

Miscendo fida pharmaca cuncta manu.

Dij tibi, Coudenberge, senis dent Nestoris annos,

Ut quod habes, ingens perficiatur opus.

I N D E X

INDEX SECTIONVM.

II

<i>Pharmacopœum qualem esse decent</i>	Pag. 13
<i>Confectiones aromatica</i>	20
<i>Confectiones Opiata</i>	78
<i>Condita</i>	147
<i>Conserua</i>	148
<i>Syrupi</i>	152
<i>Rob</i>	195
<i>Lohoch</i>	199
<i>Lenitiua & Solutiua</i>	204
<i>Pilula</i>	243
<i>Trochisci</i>	272
<i>Olea</i>	299
<i>Vnguenta</i>	332
<i>Cerota</i>	365
<i>Emplastra</i>	366
<i>Preparationes quorundam simplicium</i>	379
<i>Ponderum ratio</i>	388. nota 391
<i>Accesserunt nunc primum Val. Cordi De pur-</i> <i>gantium medicamentorum extractione, ac</i> <i>Oleorū artificiosa distillatione (prater nonnul-</i> <i>la pharmaca locis suis inserta) libellus.</i>	392
<i>Epitaphium eiusdem.</i>	416

APPEN.

A P P E N D I C I S E X
I A C O B O S I L V I O,
I N D E X.

*De collectione, Repositione, & Duratione
Simplicium.*

*De Adulterationibus Simplicium medica-
mentorum cognoscendis.*

*De Simplici aliquo absolute scripto, quid
accipiendum.*

De Succedaneis, scilicet, Quid pro Quo.

L E C T O R I.

Scias, benigne Lector, asteriscos spar-
sim in hoc libello obuios loca emenda-
ta, mutata, vel restituta denotare.

V A L E.

13
VALERII CORDI

SIMESVSII PHARMA-

CORVM CONFICIEN-

DORVM RATIO.

*Qualem virum Pharmacopœum
esse deceat.*

MAGNUM præsidium, hu-
manæ imbecillitati in Me-
dicina situm est, ut Home-
rus omnium poetarum præ-
stantissimus, Medicum non
sine causa πολλῶν ἀντάξιον
ἔμμεν pronuntiasse videat-
tur. Verum huius laudis, ut nunc quidem Me-
dicina administratur, non exiguam partem
Pharmacopola sibi vindicat, cum sit Medicus
quasi dextera manus, pericliteturq. ipsius cul-
pa sæpè, non solum egræ valetudo, verum etiam
Medici, quantumvis præstatis, fama & existi-
matio, cum ea quæ Medicus rectè præscribit,
parum dextrè exequitur, aut materia vititur
exolera aut adulterata. Inde enim frequenter
accidit,

accidit, ut æger vel non iuuetur omnino, vel, quod multo peius est, etiam lædatur. Medicus autem, præterquam quod pro imperito habetur, etiam in errorem ducitur, dum se aut de morbo non rectè iudicasse, aut non debitam medicinam administrasse suspicatur. Quare non temerè quemlibet ad huius muneris functionem admittere deberent, qui ad gubernacula rerum publicarum sedent. Verùm illi ut volent, suo fungatur officio, nos idoneum Pharmacopolam paucis delineabimus, ut ineptos & improbos à functione tam periculosa submoueamus, idoneos autem ad hoc munus capeffendum alacriores reddamus.

Principiò, Latinæ lingvæ non vulgariter tantum, sed ad munditiem & proprietatem usque peritum esse oportet, ut ea quæ eruditi Medici, vel in genere, vel in specie ipsi præscribunt, rectè & exactè intelligere possit. Neque confidat se satis instructum esse, si semel vulgarem quandam viam functionis suæ, quasi artificium manuarium perdidicerit. Nam quum multa quotidie nova conficiendarum medicinarum ingenia inveniuntur, multa etiam veterum, obliuione sepulta, iterum in lucem eruantur, nova illi itidem quotidie discenda erunt,

erunt, neque semper habere poterit aliquem, qui ea ipsi quasi per manus tradat, & ad oculum demonstrat, ex eruditorum virorum descriptionibus ea ut discat necesse est. Quare si Latinæ linguæ probè peritus non fuerit, fructu nouorum ingeniorum, aut omnino, aut magna ex parte expers manebit.

Deinde opus est illi etiā cognitione rerum minimè vulgari, aut proclita, earum præsertim quæ propriè ad functionē eius pertinent, cuiusmodi sunt Simplicia omnia, quorum descriptiones ex præstantissimis auctoribus petitas, ad res ipsas cōferre debet, donec exactam illorum cognitionem hauriat, & prorsus imbibat. Cognita verò, visu, gustu, olfactu, tactu, & aliis debitīs modis sæpe ac diligenter examinet, non solum ut falsa à veris, & adulterata à sinceris, verum etiam ut præstantissima à mediocribus, & mediocria à degeneri-ous discernere consuescat.

Est & alia causa cur tam diligenti examine opus sit, quædam enim alioqui grata & salubria, ubi insignē tamē acrimoniam in vasculis æreis decocta, aut instrumentis ferreis diu tractata, iam tetrum ac horribile virus inde cōtrahunt, et gustu fiant abominanda, & quouis valenti ventri-

ventriculo intolerabilia. Quare hoc quoque scire debet quo genere vasculorum & instrumentorum, vnaquæque medicina sit coquenda, tractanda, & conseruanda.

Hanc curam, alia quasi huic connexa sequitur, scilicet, vt herbas, flores, fructus, semina, radices, debito tempore colligat, & tunc reponat, ne vel parum efficacia sint, vel putrescant, aut nimis arefacta, virtutem omnem amittant.

Habeat etiam ædes salubri loco sitas, ac variis reponendis conseruandisq. accommodas, nonnulla enim humido, pleraq. calido, quædam sicco, quædam etiam frigido loco rectius conseruantur, quam varietatem non qualibet domus præstare potest.

Diuitiæ quoque saltem mediocres adesse oportet, in primis autem animus liberalis, ab avaritia sordibusque alienus. Diuitiæ enim hoc præstare poterunt, vt commodè habitet, & Medicinas quæ emenda sunt, suo tempore quàm optimas coëmat. Animus autem liberalis, minimeque avarus, cauebit, ne compendij, aut lucri sui causa, deteriores vili pretio libentius, quàm præstantissimas, paulo largiore comparet.

Iam simplicibus medicinis omnibus diligenter

genter collectis, coemptis & repositis, succedit industria compositarū ritè dispensandarum, vbi cum in primis vigilantem & circumspēctum esse oportet. Nec temerè confidet ingenio suo in succedaneis eligendis, sed peritum Medicum consulēt, quem etiam omnino in conficiendis Opiatis, & similibus præstantibus, ac magni momenti medicinis, vt præceptorem & iudicem adhibebit: cui adiunget, si commodè fieri poterit, vnum & alterum bonum atque doctum virum, vel Senatorij ordinis, vt eos habeat veluti testes suæ diligentiae, industriæ ac fidei. Deinde quamque medicinam sic ritè præparatam, debito ac præscripto tempore, fermentari sinat, antequam eam in vsum publicum expendat.

Nec minor in eo fides requiritur in reiciendis simplicibus atq. cōpositis, quàm in iisdem reponendis & componendis. Debet enim singulis mensibus, aut sæpius etiam, omnia lustrare, & diligenter considerare, vt corrupta, putria, mucosa, exoleta, & quouis modo inutilia, vel inefficacia reddita, reiciat, bona fide, nec in iis quærat suum lucrum, quibus aegroto crearetur vitæ periculum: sed sit, vt diximus, animo liberali & magno, cogitetque paruum
B illud

illud damnum, fide sua iam perspecta, maioris sibi lucri causam fore.

Hæc omnia cum indefessam diligentiam & animum sibi semper præsentem requirant: hoc quoque observare convenit, ne sit aleæ aut similibus ludis deditus, ne comotationibus gaudeat, aut alioqui vinosus vel ebriosus, neque fœdis amoribus implicatus teneatur. Alea enim negligentiam parit: ebrietas, errores, obliuionem & stuporem inducit: turpis verò amor, etiã veneficia illi extorquere posset.

Quare omninò, si fieri potest, maritus sit, cui cum vxore rectè conueniat, liberosque habeat, quos honestè educare studeat; huiusmodi enim pignoribus obstrictus, vagas libidines detestabitur, neque illis fomenta sciens subministrabit: & posteritati suæ consulens, bonam conscientiam seruare adnitetur; nec metu, nec gratia, nec prece, nec pretio, ad vllum veneficium impelletur.

Quòd si accesserit vera pietas, hoc est, timor Dei, & fides in Christum, charitas erga proximum, & spes futuræ vitæ, omnia erunt tutiora, illustriora & feliciora. Tum enim cogitabit: Si quid per negligentiam in vitam aut valetudinem proximi peccauero, iudicium
Dei

Dei non effugiam : quanto minus effugiam, si
sciens ac prudens venenum dederò, abortum
procurauero, aut aliquod aliud ingens atque
insigne flagitium designauero? Et si humani-
tas eorum qui infirmos & ægrotos tantum vi-
sitare solent, Christo adeò grata est, ut illud
beneficium in seipsum collatum esse affirmet;
quantò gratior erit illi mea cura & sollicitudo,
dum studeo illis Medicinas rectè componere,
tempestiuè exhibere: & non propter lucrum
tantum, verum etiam humanitatis respectu
operam dare, ut melius habeant & conua-
lescant?

Hæc & similia si cogitabit, ultro, ac sua
sponte, erit humanus, placidus, affabilis, beni-
gnus, alacris, in primis autem mitis erga pau-
peres, & commodus erga imperitos; non
enim in eorum ineptias, sed in necessitatem
ægroti respiciet, ac Deum omnium inspecto-
rem ac iudicem præ oculis habebit: qui rectè
agenti longè maiora & beatiora præmia lar-
gietur, quàm ab vllò mortalium persolui
possint.

CONFECTIONES

AROMATICÆ.



*Aromaticum Garyophyllatum descri-
ptionis Mesuæ.*

- ℞. Garyophyllorum ℥ vii.
 Macis Zedoariæ Galangæ
 Santali Machoziri Trochiscorū Diarhodon
 Cinnamomi Lignialoës Spicæ Indicæ
 * Piperis longi Cardamomi minoris ana ℥ j.
 Rosarum ℥ iiij. Glycyrrhizæ rasæ
 Galliæ moschatae veræ ana ℥ ij.
 Folij. [*Sumatur eius loco casia lignea vera,
aut duplex pondus Cinnamomi.*]
 * Cubebæ ana ℥ ij. Ambre ℥ j.
 Moschi ℥ ss. Sacchari optimi.

VAL. CORDI ANNOTAT.

- IN cōfectionibus aromaticis ad sacchari librā
- * *unam pendente ℥ xij. accipietur ℥ i. specierum.*
- MYROPOLAE accipiant in cōfectionibus
 librā continentē ℥ xij. & secundum hanc di-
 * *uidatur uncia, drachma & scrupuli. Scrupulus
 verò pēdeat grana electa xx. Nicolao præsertim.*
- GALANGAE, id est, minoris Galangæ &
 rufa,

rufa, saporis aromatici: nam affertur hodie nova quadam Galanga magna, crassa, foris subrufa, intus Zingiberis palliditate & filis, gustu acerrima, sine aromatica aliqua gratia, hac in nullas confectiones Galanga nomine iniicienda est. Quod semel dixisse satis sit.

SANTALVM Machoziri, est species citrini A
santali, odoratissima, & valde aromatica, tam gustu quam odore: & affertur ad nos cum santalo albo, & citrino vulgari.

GLYCYRRHIZA est dulcis radix, quam hodie vsitato nomine Liquiritiam appellant.

FOLIVM nondum allatum est ad nos in Germaniam; quare cum eo careamus, necesse est eius loco aliquod succedaneum accipere. Est autem eius succedaneum, ut Galenus nobis reliquit, Spica Indica, aut Cassia lignea vera. Cum autem haec confectio alioquin capiat Spicam Indicam, Folij vice cassiam ligneam veram accipiendam esse censeo.

MOSCHI scribendum est: nam Musci appellatione, arborum villosa canities dicitur.

PETRI Coudebergi in compositiones nonnullas, ac Val. Cordi annotationes aliquot, Scholia.

Santalum Machoz. est species, &c.] Santali citrini duas reperiri species, cum Cordum dicere

Franciscus Alexander in suo Apolline miretur, nos easdem quoque iisdem acceruis à Lusitanis Antuerpiam aduectas interdū observauimus. Vnam nempe (Santali albi corde ad rufedinem accedente, ignaris quandoque imponitur) inter vulgarem optimā, ex pallido rufescentem, odoratam ac aromaticam. Alteram verò prorsus luteam, aut quasi croco tinctam, odoratissimam & valde aromaticam tam gūstu quàm odore, ut & Cordus ait: atque insuper unguinosam, sed eam admodum raram. De hac itaque specie cum Cordum hic locutum esse existimem: non ea propter tamen id ipsum quartum Santalum dici debere putamus, ut Franciscus sinistrè colligit, baud secus atque nigri Piperis species plures cum sint, magnitudine, duritie, pondere atque acredine differentes, illorum aliquod quartum piper esse dici non possit. Ceterum de Santalis plura, eaque magis indubitata, quàm à quoquam hactenus scriptitatū est, qui cupit, Garçia ab horto de Aromatibus Indicis libellum, nuperrimè ex Lusitanico in Latinam linguam à Carolo Clusio conuersam, consulat.

B Folium.] Folio tribus nervis distincto, laurino simili. quod Folij Indi nomine in efficiis passim prostat: Folij in medicamentis locum non incommodè

commodè obtinere possit, dum genuinum adferatur, haberiq; abunde queat. De hoc quoque pluribus *Garcia libellus.*

Ventriculū & cor confortat, nauseam & vomitum sedat, & valet cōtra putrefactionem in partibus ventriculi. Membra verò nutritionis calefacit, ac ventositates dissolvit & terminat.

*Aromaticum Rosatum Gabrielis,
descript. Mesuæ.*

℞. Rosarum rubrarum ʒ xv.
Glycyrrhizæ rasæ ʒ viij.
Ligni aloës Santali Machozini ana ʒ iij.
Cinnamomi electi ʒ v.
Macis Caryophyllorum ana ʒ ij. β.
Gummi Arabici
Tragacanthæ ana ʒ ij. ʒ ij.
Nucis moschatæ Cardamomi minoris
Galangæ ana ʒ j.
Spicæ Indicæ Ambre griseæ ana ʒ ij.
Moschi ʒ j. Sacchari

CARDAMOMI, videlicet minoris: nā cū simpliciter Cardamomū scribunt auctores, minus Cardamomum id est, usuale intelligunt.

MOSCHI, hoc est, ut vulgò dicitur corrupto vocabulo, Musci, prout illud aromaticum.

VENTRICULO imbecillo, aliisque nutritioni deferuentibus instrumentis succurrit. Ventriculi humiditatem, oranemque in eo putredinem emendat, concoctionem iuuat, & ex morbo conualescentibus auxiliatur.

Dianisum D. Mesua.

R. Anisi electi ℥ xx.

Glycyrrhizæ rasæ Mastiches ana ℥ j.

Carei [*i. carui.*] Macis Galangæ Fœniculi

Zingiberis Cinnamomi ana ℥ v.

Macropiperis Melanopiperis Leucopiperis

Calaminthæ Pyrethri

Cassæ lignæ veræ ana ℥ ij.

* Cardamomi minoris Garyophyllorum

Cubebarum Spicæ Indicæ

Croci ana ℥ j. β. Sacchari.

MASTICHES, hoc est, ut vulgò dicitur, *Masticis.*

CASSIA lignea vera debet accipi, qua nuper cæpit afferri: figura Cinnamomi, gustu aliquantulum lubrica, & Cinnamomi æmula: at non ille parvus cortex saporis insipidi ac stiptici, ut hæctenus factum est.

CRASSIS flatibus in vetriculo natis, eiusdemque perfrictioni succurrit. Pituirâ in eo
crudam

crudam absumit, tussique diuturnæ prodest.

Diambra D. Mesua.

℞. Cinnamomi Doronici
Garyophyllorum Macis Nucis Moscata
Folij [*aut succedanei eius.*] Galāgē ana ℥ iij.
Spicæ Indicæ Cardamomi maioris
Cardamomi minoris ana ℥ j.
Zingiberis ℥ j. β.
Santali citrini Ligni aloës
Piperis longi ana ℥ ij. Ambræ ℥ j.
Moschi ℥ β. Sacchari albissimi.

CONTRA omnem corporis imbecillitatem efficax est, omnemq. corporis perfrictionem discutit, nativum suscitatur calorem, & redituum recreat, refarcitque eos qui frigido torquentur humore. Iuvat articulos, & membrum omnibus magnifice subuenit. Venter fastidientem, quiq. cibum continere non potest, roborat: & inappetentiam cibi summe corrigit. Cor ipsum roborat.

Diathamaron D. Nicolai.

A

℞. Antophyllorum
Zingiberis ana ℥ v. ʒ j. ʒ xvj.
Cinnamomi
Garyophyll. ana ℥ iiij. ʒ j. ʒ iiij.
B s Carnium

- Carnium dactylorum ʒ iiij. ʒ. ʒ viij.
 * Galangæ Spicæ Indicæ Zedoariæ
 Costi Pyrethri Corallij rubri
 B Rheupontici [*accipiaturs eius panuria rha-*
 * *barbarum sic vocatum.*]
 Saliuncæ Tragacanthæ Anacardij
 Ossium dactylorum Carpobalsami Anisi
 * Baccarum Iuniperi ana ʒ ij. ʒ ij. ʒ viij.
 Leucopiperis
 * Macropiperis ana ʒ j. ʒ j. ʒ ij.
 Limaturæ auri puri Limaturæ argenti meri
 * Ossium è corde cerui ana ʒ ij. ʒ. ʒ vj.
 Rasuræ Eboris Moschi ana ʒ j. ʒ vij.
 Ambra ʒ j. Sacchari.

THAMAR Arabibus dactylum, palma ar-
 boris fructum significat, unde confectioem nomen
 * Diathamaron: corruptè Diacameron.

ANTOPHYLLI sunt grandes Garyophyl-
 li, qui ad maturitatem pervenerunt, nucleo in-
 tus duro bifidoq̃, sapore non tam acres ut Ga-
 ryophylli, præterquam in superficie.

COSTI, videlicet albi, feruidum & aro-
 maticum saporem habentis. Non vulgaris illius
 grandis, qui teterrimum & rancidum saporem
 habet, & adulterinus est, atque ex Heluetio-
 rum alpiibus & Italia ad nos afferitur.

CAR-

CARPOBALSAMI. Non habentur Opebalsamum, Carpobalsamū, & Xylobalsamum secundū eorum verā descriptionem: verū cū experientia didicerimus, quod olea Cinnamomi & Garyophyllorum secundam nostram artem distillandi, veteribus ignota, parata, in probis Balsami veri, & virtutibus similia esse (quare etiam pro Opebalsamo, oleum Garyophyllorum in Theriacam nostram accepimus:) nō inconsultum esset, si quis pro Carpobalsamo acciperet Cubebas, aut Garyophylla, siue etiam Cardamomum, aut aliud semen, quod haberet mordacitatem in gustu, cum quadā redolentia, secundum Carpobalsami descriptionem, si horū nūllum antea esset in descriptione.

SALIUNCA Germanicum est vocabulum, quo significatur Spica Celtica vera, quam in Pharmacopoliis Spicam Romanam appellant. Sed in Nicolae Alexandrino Greco, inuenitur loco Saliunca Elelissphacum, id est, Salvia, praesertim in Auroa Alexandrina.

LIMATURA auri & argēti. Cū aurum sit metallicū & valdē ponderosum corpus, limatura eius vel scobs semper fundū petit, nec aqualiter confectionibus cōmiscetur, quare & hic, & reliquis omnibus locis, sumantur folia auri.

P. C.

A *Pondera apud Cordum hacce in compositione deprauatissima restitui: sed non veluti L. Fuchsius ex suo Myrepsso vult, bocce in medicamento, innumerisq; aliis corruptissimo.*

B *Corallium album, quod à Cordo perperam appositum erat, deleui.*

E F F I C A C I T E R prodest difficulter spirantibus, arteriacis, tussicibus, tabidis & omni thoracis & stomachi offensæ: Aquæ subter cutem fusæ, renum doloribus: Voluptatem parit, corporaque saginat.

Diacalaminthon D. Mesuæ.

Rx. Calaminthæ montanæ
Calaminthæ campestris Seselios
Petroselini Macedonici ana ʒ vj.
Zingiberis ʒ iij. Seminis Apij
Comarū Thymi ana ʒ ij. Ligustici ʒ vj.
Piperis ʒ xij. Sacchari albißimi.

C A L A M I N T H A montana nascitur copiosissimè in montibus circa Confluentiam urbem ad Rheni & Mosellæ confluentes.

C A L A M I N T H A campestris, hoc est, vsualis Calamintha, quæ in aruis nascitur (Mesuæ fluuiatilem requirit) hac enim efficacior est,

est, quàm in humidis locis nata. Germanicè Kornmyntz vocatur.

SESELIOS, id est Sifelios, quod etiam Siler montanum vocatur.

COMARVM Thymi, id est, summitatum foliorum, & florum Thymi.

PETROSELINVM Macedonicum non est Olsatrum, vel, ut corruptè pronuntiant, Olixatrum, aut Alexandrum; semine oblongo, magno, nigro, amaro, ac myrrham amulante sapore. Sed quia iam vero Macedonico Petroselino caremus, licet nobis eius loco Olsatri semen accipere (quod vulgò in Pharmacopoliis Petroselinum Macedonicum, falsò tamen, appellatur) donec aliquando verum nobis contingat.

PIPERIS, id est, piperis nigri: nam cum piper simpliciter pronuntiamus, semper nigrum intelligimus.

AVXILIATVR iis quos cibi fastidium urget, appetentiam reuocàs: agrè quoque spirantibus, ventriculo refrigerationē sentienti, & flatibus disento, confert.

Diacalaminthon Galeni, Sanitatis
tuende lib. 4.

R2. Calaminthæ Pulegij Petroselini

Sese-

30 CONFECTIOES

Seselios ana ℥ j.

Apij Cacuminum Thymi ana ℥ ij.

Ligustici seminis ℥ viij.

Piperis ℥ xxiiij. Sacchari

* CRASSA ac lenta attenuat & discutit,
vrinas mouet, ac mulieribus menses.

Diacuminum D. Nicolai.

* ℞. Cumini præparati [*id est, pridie in aceto in-*
fusi, & iterum exiccati] ℥ viij. ʒ j.

Cinnamomi

A Garyophyllorum ana ℥ ij. β.

Melanopiperis

Zingiberis ana ℥ ij. ʒ v.

Galangæ

Thymbræ [*sive loco sume Satureiam.*]

Calaminthæ ana ℥ j. ʒ ij.

Anmios

Ligustici ana ℥ j. ʒ xvij.

Macropiperis ℥ j.

Spicæ Indicæ Cardamomi

Nucis Moschatæ ana ʒ ij. β.

Sacchari.

THYMBRA est propriè Satureia siluestris,
circa quam nascitur Cuscuta Epithymo similis,
qua Epithymum appellatur. Affertur iam ad

nos

nos ex Orientalibus partibus, verum raro, ideoq;
in defectu eius satiuam Thymbnam, hoc est, Sa-
tureiam accipere nobis licet.

P. C. SCOL.

Ana ʒ ij. ʒ.] *Cacutit Fuchsi*, ʒ ij. ʒ ij. A
ex *Pseudomyrepso* suo legendum existimans.

ARTERIACIS, difficultati spirandi, tus-
siculosis, inflationibus efficaci est adiuumento.
Noxam ventriculi corrigit, concoctionem ad-
fert, adstrictionum vitia sanat.

Diacinnamomum Mesue.

Rx. Cinnamomi tenuis	ʒ xv.	A
Cinnamomi crassi boni		
Enulæ ana	ʒ iiij.	B
Galangæ	ʒ vij.	
Garyophyllorum	Piperis longi	
Cardamomi maioris	Cardamomi minoris	
Zingiberis	Macis	
Nucis moschatæ		
Ligni aloës ana	ʒ ij.	*
Croci	ʒ j.	
Sacchari tabarzeth	ʒ v.	
Sacchari albißimi.		

SACCHARI tabarzeth, id est, purissimi
atq. optimi Sacchari, cuius ʒ v. miscetur specie-
bus:

bus: idq³ ideò hoc loco accipitur, ut species eò melius cõseruentur ad vsum. Vltimùm Saccharum additur, cùm vis rotulas facere ex speciebus.

P. C. SCHOL.

A Cinnamomi tenuis, Cinnamomi crassi,]
 Per Darseni vel potius Darchini, lignum Chinenſe, ceu lignum odoratum, hoc eſt Chinamomum, tanquam China amomum, ſive Cinamomum intelligunt Perſæ atque ſcriptores Arabes; cortices quandoque ligna appellantes, ut Xylocinamomum Græci. Quod interim crassi corticis eſt, Cinnaſum vocant. Per Darseni Cinami igitur, Cinamomum crassi corticis, tanquam ligneum ſignificare volunt; eſt enim & in genere craſſioris Cinamomi, quod & valde bonum eſt, hoc eſt, acre, odoratum ac aromaticum. Nec caret hæc Meſua mens, ubi craſſum Cinamomum requirit, ſuis rationibus: quas perpēdat Franciſcus Alexand. Apollo oportet. Itaque Cinnamomum tenuis corticis electum, per ſe, æquè atque per Darseni Cinami, crassi corticis Cinamomum bonum, diſtinctum cum Cordo hic interpretandum, intelligendū atque legendum exiſtimo: utrumque tanquam in ſuo genere optimum. De Cinnamomo autem & Caſia, Garçia de Aromatibus librum quem dixi

ixi, consule: ubi doctissimorum etiam hactenus
 virorum de hisce rebus altercationes, aniles,
 rorsúsque futesse animaduertes.

Cyminum à Cordo huic medicamento temere **B**
 impositum, hortante & id quoque Fuchsius, Mo-
 nachis id prius monstrantibus, expunxi.

EST medicina salubris ad humoresitatem
 ventriculi, & putrefactionem in eo. Phlegma
 digerit, & digestionem adiuuat.

Dianthos D. Nicolai.

℞. Florum Rosmarini ʒ j.
 Violarum Rosarum
 Glycyrrhizæ ana ʒ vj.
 Caryophyllorum Spicæ Indicæ
 Nucis moschatæ
 Galangæ Cinnamomi
 Zingiberis Zedoariæ
 Macis Ligni aloës
 Cardamomi Anisi
 Anethi [videlicet seminis] ana ʒ iij.
 Sacchari.

PRODEST præter rationē tribularis, car-
 diacis, animi lætitiā augeat. Eos roborat qui
 longo morbo debiles adhuc sese recolligunt,
 ventriculum perpulchrè emendat.

C

Dia-

Diamargariton frigidum

D. Nicolai.

34. Nucleorum sem. Citrulli
 Cucurbitæ Melonis Cucumeris
 Seminis portulacæ
 Papaveris albi
 Santali albi
 Santali moschatellini [*id est, Citrini boni odo-*
 Ligni aloës Zingiberis (*ris.*)
 Rosarum rubrarum
 Florum Nymphae albæ [*id est, Nenupharis.*]
 Florum Borraginis
 Myrtillorum verorum ana 3 j.
 Corallij albi
 Corallij rubri ana 3 β.
 Margaritarum 3 iij.
 Sacchari.

NUCLEVS seminum, est ipsa in medio se-
 minum medulla. Sunt autem eximendi horum
 seminum nuclei, cum iam preparanda est confe-
 ctio hac aut alia, qua durare debent: nam diu
 antè exempti rancidi fiunt.

OMNEM virium imbecillitatem firmat,
 iis quos animus deficit, siue à corde siue à sto-
 macho deliquium originem ducat, omnem

NOXÆ

noxa causam vitalium partium discurit. Insuper asthmaticis, ruffientibus, tabidis auxiliatur. Longo morbo deiectos, & imbecillitate languentes recreat, & ad pristinum robur conducit.

Diamargariton calidum

D. Auicenna.

℞. Margaritarum non perforatarum

Pyrethri ana ʒ j. Zingiberis

Mastiches ana ʒ iiij.

Zedoariae Doronici.

Seminis apij Casia.

Cardamomi Nucis moschatae

Macis Cinnami ana ʒ ij.

Been albi. Been rubci.

Piperis

Macropiperis ana ʒ iiij.

Cinnamomi ʒ v.

Sacchari

A

B

C

D

E

F

G

P. C. SCHOL.

Zedoariae.] Auicenna exemplaria editionis Apianultima, Zurumbet, postrema autem à Valgriso inquam exhibita, Zedoarie legunt, ut hinc vocum harum & rerum vicinitatem atque ambiguitatem (de quibus à plerisque concertatur)

C 2

tur)

tur) tibi expendendam nunc relinquam.

B Doronici.] L. Fuchsius Doronicum hic expunxit, quod tamen omnia Auicenna exemplaria aptissimè etiam recipiunt.

C Casia.] Cum Cordus huius loco rad. Tapsia pessimè haberet, correctiora Auicenna exemplaria Scitaragi legunt, nonnulla Capsia: quod non nisi Casia est. Nam ineptiores Itali etiā Casiam addita p ante s Capsiam scribere solent. Seytaragi autē cum plura significata habeat, littera vnius forsitan aut carentia, aut mutatione (ut in plurimis dictionibus usu venit) quandoq. Lepidiū designat, quandoq. Casiam: quam hic intelligendā, commodissimèq. indendā dico. Quare Francisci Alex. Apollinis stupidā pertinaciam, Fuchsius etiam mihi astipulante, demiror: Tapsiam hic (medicamento huic adeò iniquam) sumendam esse mordicus defendentis. Interim non tantum quomodo C in T mutata, sed Radicis vox accedere quī potuerit, forsā exclamabitur: verū Lacones habeo hic mihi imperantes.

D Cinnami.] Hac voce Cordus carebat, aequè atque Been albi. In Auicenna Cherse legitur, quod Cinnamum interpretantur.

VALET mulieribus, rectificat enim dispositionem matricis, & ventriculorum earum.

Dia-

Diamoschum dulce D. Mesua.

ꝯ. Croci Doronici
 Zedoariæ Ligni aloës
 Macis ana ℥ ij.
 Margaritarum albarum Serici crudi tosti
 Charabæ [*id est, Succini.*]
 Corallij rubri ana ℥ ij. β.
 Galliæ moschatæ veræ
 Ocimi citrati ana ℥ j. β.
 Been albi Been rubri
 Folij [*aut succedanei eius.*] Spicæ Indicæ
 Garyophyllorum ana ℥ j.
 Zingiberis Cubebarum
 Piperis longi ana ℥ j. β.
 Moschi ℥ ij.
 Sacchari albi.

*O C I M U M citratum non est Melissa, sed
 species quadam Ocimi siue Basilici, odore Melis-
 sa aut citrei mali, cuius defectu, garyophylla-
 tum Ocimum sumi potest.*

*P R O P E S T contra cordis palpitationem:
 ei quoque cui tumultuosa insomnia obuersan-
 tur, item iis qui incertis timoribus corripun-
 tur. Malis cerebri frigidis, vertigini, comitali-
 bus, & difficulter spirantibus succurrit.*

C 3

Dia-

Diamoschum amarum D. Mesue.

- ℞. Croci Doronici
 Zedoariæ Ligni aloës
 * Macis ana ʒ ij.
 Margaritarum albarum
 A Serici crudi tosti Charabæ
 * Corallij rubri ana ʒ ij. β.
 Gallie moschatae veræ
 * Ocimi citrati ana ʒ j. β.
 Been albi Been rubri
 Folij [aut succedanei eius.]
 Spicæ Indicæ
 Garyophyllorum ana ʒ j.
 Zingiberis Cubebarum
 Piperis longi ana ʒ j. β.
 Moschi ʒ ij.
 Absinthij
 * Rosarum ana ʒ iiij.
 * Aloës lotæ ʒ iiij.
 Castorei
 Ligustici ana ʒ j.
 Cinnamomi ʒ ij. β.
 Sacchari.
 * SERICVM crudum tostum significat Serica bombycis vellus, nullo colore tinctum, nulliq̃ humori

humori aut succo qui tingendo sit, incoctum: sed tale quale natura est, sicuti quæ inditum, ac donec contereri possit tostum aut assatum, vulgò dicitur Sericum vstum, quamvis comburi non debeat, sed torreretur aut assari tantum.

P. C. SCHOL.

Seta pro Serico Cordus undiqueque barbare legebat. A

Hæc confectio valentior est ad ea quæ supra dicta sunt: & propriè ad exiccandum humiditates ventriculi, & putrefactiones eius.

Diagalanga D. Mesue.

R. Galangæ A

Ligni aloës ana 3 vj.

Garyophyllorum Macis

Ligustici ana 3 ij.

Zingiberis Macropiperis

Leucopiperis Calami aromatici

Cinnamomi ana 3 j. β.

Calaminthæ siccæ Mentæ siccæ

Cardamomi maioris

Spicæ Indicæ Seminis Apij

Seminis Fœniculi Seminis Anisi

Seminis Carni ana 3 j.

Sacchari albissimi

C 4

P. C.

A 3. vi.] Legendū esse 3. vi. Fuchsius recte
monet, non 3. vii. ut Cordus malè habebat.

VALET aduersus crassiores flatus, acidos
ructus, prauamq. concoctionem. item actio-
nes ventriculi & iecoris à frigiditate impedi-
tas, robustiores reddit, easdemque emendat.

Diapenidion D. Nicolai.

℞. Penidiarum 3. ij.
Pincarum

A Amygdalorum dulcium
Papaveris albi ana 3. iij. 3. j.

Cinnamomi
Garyophyllorum
Zingiberis Succi Glycyrrhizæ
Tragacanthæ Gummi Arabici
Amyli candidissimi

Seminis enucleati Cucurbitæ
Citrulli

Cucumeris

Melonis ana 3. j. 3. ij.

* Camphoræ 3. β.

* Sacchari albissimi.

AMYLVN hodie corrupto vocabulo dicitur
Amydnum.

Deleui Amygd. amaras, quas Cordus perpe- A
um addid. rat.

VALET aduersus omnē thoracis noxam, ruf-
m à frigore contractā, vocis iacturam, tabidis
enique & purulenta excreantibus succurrit.

Diarris simplex.

1. Ireos ℥ β. Sacchari candi
specierum diatragacanthi frigidi ana ℥ ij.
Sacchari albissimi.

POTESSE ferē eadem quod sequens, licet
imbecillius.

Diarris Salomonis, ex Nicolao.

2. Iridis ℥ i.
Pulegij Hyssopi
Glycyrrhizæ ana ℥ vj.
Fragacanthæ
Amygdalorum Pinearum
Cinnamomi Zingiberis
Piperis ana ℥ iij.
Caricarum Passularum enucleatarum
Carnium dactylorum ana ℥ iij. β.
Styracis calamitæ rubæ [potius rufa, legis
P. C.] ℥ ij. ℥ i.
Sacchari albissimi.

C 5

TVSS1-

Tussiculosis, difficulter spirantibus auxilia-
tur, abscessu vocis iacturam refarcit, quæ refri-
geratione contracta sit.

Diatragacanthum frigidum

D. Nicolai.

℞. Tragacanthæ albiſſimæ ℥ ij.
Gummi Arabici ℥ i. 3 ij.
Amyli ℥ β.
Glycyrrhizæ
Nucleorum ſeminum Cucurbitæ
Cucumeris Citrulli
Melonis ana 3 ij.
Camphoræ 3 β.
Penidiarum 3 iiij.
Sacchari albiſſimi.

Medetur omnibus pulmonū & thoracis vi-
riis aridis, maximè tabidis, macie cōfectis. In-
flāmatione lateris laborātibus, omnibusq. tuſ-
ſibus calidis & ſiccis, exaſperationi linguæ &
fauciū. Deuoratū tam diu ægrotans in ore con-
tineat, quò ad liquefactum perfectè exugatur.

Diatragacanthum calidum

D. Nicolai.

* ℞. Gummi Tragacanthæ ℥ iiij.
* Hyſſopi Pineorum nucleorum
Amygda-

amygdalorum amborum, purgatorum
 seminis Lini ana ʒvj. Seminis foenigræci
 annamomi ana ʒβ.
 glycyrrhizæ rasæ Succiglycyrrhizæ
 gingeris ana ʒij.
 sacchari albi.

Valet ruffientibus ex frigido phlegmate, &
 non valentibus eicere. asthmaticis, empyicis,
 phelosis, suspitiosis, peripneumonicis, pthi-
 sis, & ad omnem coarctationē pectoris, sto-
 machum confortat, digestionem procurat.

Manus Christi perlata.

Sacchari clarifaciti P. ij.
 aquæ rosarum P. β.
 Concoquantur dum aqua rosacea igni eua-
 lesceat, & saccharum iustam crassitiē cōsequa-
 tur, in fine margaritarum minutissimè trita-
 tum ʒβ. addatur, atque super marmor aqua ro-
 sacea inspersum infundatur, & fiant rotulæ.

P. C. SCHOL.

*Quantis cachinnis Cordus, & tanquam caci-
 co duce Fuchsf. Colonienses medici, ac Fran-
 cisci Alex. Apollo, vel pueris Pharmacopœorū,
 hoc scripto sese deridendos exhibuerint, vix ex-
 primi possit: ut hinc non tractari à fabris fabri-
 lia,*

lia, lucidè cerni queat. Eo pacto quod huiusce
modi imaginariis, extraq̃ arenam Medicorum
quorundam scriptionibus, nullā debitā miscend
conficiendiq̃ rationem, ut neque modum, & e
consequenti parū aut nihil artis sua frugis, ope
risq̃ manuarū commodi, haurire discerēne pos
sint Pharmacopœi: ni margaritas, oleum &
operam omnem frequentissimè perdere, ac vitia
tas materias porcis obicere velint.

MEDETUR deiectis viribus, ardentibus fe
bribus, & imaginationes falsas abolet.

Diabyssopum D. Nicolai.

℞. Hyssopi Ircos Thymi
Melanopiperis ana ʒ xxx.
Pulegij
Thymbra [eius loco sume Satureiam.]
Rutæ Cumini ana ʒ xx.
Carnium dactylorum
Tragacanthæ Glycyrrhizæ
Caricarum pinguiū Passularū onucleatarum
Fœniculi ana ʒ x.
Zingiberis Sem. Anisi
Carui
Ligustici ana ʒ v.
Sacchari.

Accom-

Accommodatum est ad capitis querelam ex
 rigido. vnam exiccat, arterias purgat, tussim
 impescit, omnes frigiditates pectoris & sto-
 machi emendat; digestionem procurat, pleu-
 riticis & empyicis mirabiliter opitulatur.

Diacostum D. Mesua.

Costi candidi, aromatici, amari
 Asiae lignae verae Cinamomi ana 3 v.
 Seminis Apij Seminis Anisi
 Schoenanthi
 Habarbari ana 3 iij.
 Saffori 3 iij.
 Croci Aristolochiae
 Myrrhae ana 3 ij.
 Sacchari.

SCHOENANTHI, hodie corrupto nomi-
 ne, dicunt Squinanthum.

COSTI AMARI coepit hisce annis affer-
 ri loco veri costi adulterinus quidam, qui ne-
 quaquam accipiendus est, ut supra dictum est,
 sed candidus, amarus & aromaticus.

ASARI, id est, radicum eius; sola enim radi-
 ces ad medicinam accipi debent.

VALET ad dolorem viscerum & oppila-
 tionem in eis, & ad principium hydropisis.

Dia-

Diarhodon Abbatis, ex Nicolao.

R. Santali albi
 Santali rubri ana ʒ ij. β.
 Tragacanthæ
 Gummi Arabici
 Spodij ana ʒ ij.
 Alari Mastiches
 Spica Indicæ Cardamomi
 Succu Glycyrrhizæ Croci
 Xyloaloes [id est, ligni aloës.]
 Caryophyllorum
 * Gallie moschate Nicolai
 Anisi Fœniculi
 Cinnamomi Rhabarbari
 Seminis Ocimi
 A Berberis [id est, acinorum eius.]
 B Seminis Scariolæ Seminis Portulacæ
 Nucleorum seminis Cucurbitæ
 Citrulli Cucumeris Melonis
 Seminis Papaveris albi ana ʒ j.
 Margaritarum
 Ossis e corde cerui ana ʒ β.
 Sacchari cadi [ut eodem melius species cōseruentur.]
 Rosarum ana ʒ j. ʒ. iij.
 Camphoræ ʒ viij.

Moschi

oschi ḡ iij. ḡ.

chari albiſſimi.

SCARIOLA propriè eſt Endinia illa vul- B
aris, qua in dorſo foliorum eſt ſpinoſa. Quid
tem vera ſit Endinia, ubi locus poſtulauerit,
emus.

P. C. SCHOL.

(gri.

beris.] acini ſunt hic fructus Berberis ante- A
Scariola.] Cordum nō nouiſſe Scariolam hoc B
erine vulgarē admodum plantā. monente ḡ
Franciſco Alex. ſatis liquet; ex eo quòd in fo-
rum dorſo eam ſpinoſam faciat, vt Sonchum
e oculis habuiſſe videtur.

V A L E T aduerſus ventriculi calorem, ieci-
ris, lienis, pulmonumque. Contra viſcerum
lores, & omnem totius corporis noxam à
lore proficiſcentem.

Dialacca maior D. Meſua.

Laccæ præparatæ [eius præparatio in ſino
habebitur.]

habarbari ana 3 iij.

laccæ Indicæ

laſtiches

Apij

coliculotum Schœnanthi

Abſinthij

ucci Eupatorii Meſuæ

Ammios

Ammios Sabinæ

Amygdalorum amarorum

Costi Myrrhæ

Rubæ tinctorum Fœniculi

Anisi Asari

A Aristolochiæ rotundæ veræ

Gentianæ Croci

Cinnamomi Hyslopi

Casia lignæ veræ Summitatū Schœnanti

Bdellij ana ʒ j. ʒ.

Piperis

Zingiberis ana ʒ j.

Sacchari albiſſimi.

COLICVLO RVM Schœnanthi.] herba
hæc aromatica à Græcis dicitur σχοίνον, id est
Schœnus, & significat iuncum aromaticum, quod
hactenus improprie dictus est Squinanthū. Nam
Schœnanthum siue σχοίνον ἄνθος, significat iun-
ci huius aromatici florem, qui non affertur ad
nos In hanc autem compositionē ingreditur bis
Schœnanthum, hoc quidem loco coliculi aut sti-
pites eius, inferius verò summitates eiusdem.

SUMMITATVM Schœnanthi, id est, flo-
rum eius: nam flores in summitate huius herba
constituti sunt, & proprie Schœnanthum appel-
lantur: sed quia flores non ad nos feruntur, cogi-
mur

ur tenerrimas eius partes in sacumine decer-
as, eorum vice medicamentis miscere.

SUCCI Eupatorii] hic succus non debet fieri B
vulgaris Eupatorio, neque ex Eupatorio Gra-
rum, id est, Agrimonia falso hodie vocata,
d ex Eupatorio quod Mesue describit. Est au-
tem Eupatorium Mesue ea herba, qua ab Italis
icitur Gratia Dei, siue Gratiola, cuius ma-
nus est prouentus Wittemberge, in pratis ad
Albim fluium fitis.

P. C. SCHOL.

Aristolochiam longamerroneè in contextum A
Cordo intrusam, deleui.

Succi Eupatorii.] Gratiola vocata, purga- B
oria herba, foliis hyssopi, Eupatorium Mesue
sud dubio, ut & L. Fuchsius, Mathiolus, ac
Franciscus Alex. rectè monent, esse non potest.
Satius igitur erit, Ageratum Dioscoridis, quod
& hodie Eupatorii Mesues nomen obtinuit, in
ius locum substituere, donec melius doceatur.

VALET aduersus frigus ventriculi, obstru-
ctiones, inflationes iecinoris, & renam duri-
as sanat. aquæ inter cutem causas omnes
discutit. menses ciet, flatuosos spiritus ab alto
corpore abigit.

D

Dia-

*Diacurcuma, id est, Δια κροκῆ
maior D. Mesua.*

R². Croci Aſari

Petrofelini Macedonici

Dauci Anifi

Aprijana 3. iij.

Rhabarbari Men

Spicæ Indicæ ana ʒ. vj.

Costi Myrrhæ

Cassia lignea vera Schœnanthi

Carpobalsami [aut aliquod succedaneum, ut
superius significatum est.]

Rubæ tinctorum

Succi Absinthij

Succi Eupatorii Mesux [*i. Gratiola.*]

Opobalsami [aut aliquod succedaneum, siue
oleum Caryophyllorum, aut aliud crassum
odoriferum oleum.] ana ʒ ij.

Calami aromatici

Cinnamomi ana ʒ i. β.

Scordij [*videlicet veri.*]

* Scolopendriae [ceterach, intelligo.]

Succi glycyrrhizæ ana 5 ij. ℞.

Tragacanthæ 5 j.

Sacchari albissimi.

Con-

AROMATICAE.

51.

Confert ad ægri tudines antiquas, & cache-
 iam, & ad hydropisim iuuamentū est mani-
 festū & eradicat ægri tudines hepatis & lienis
 chronicas, quæ iā induratæ sunt, & confert ad
 corruptionem stomachi, & humiditatem fri-
 gidam, & ventositates grossas in eis, & ad do-
 lorem renum & vesicæ, & urinam prouocat.

Diaprasium D. Nicolai.

℞. Prassij	℥	v. ℞.
Fragacanthæ	Pinearum mundatarum	
Amygdalorum duleium		
Pistaciorum	Carnium dactylorum	
Caricarum pinguium		
Passularum enucleatarum	ana	℥ iij. ℞.
Cinnamomi		
Baryophyllorum		
Nucis moschatæ		
Macis	Ligni aloës	
Galangæ	Spicæ Indicæ	
Zingiberis	Zedoariæ	
Glycyrrhizæ	Rhapontici	
Anacardij	Syracis calamitæ	
Galbani	Terebinthinæ	
Mastiches	Myrrhæ	
Creos.	Aristolochiæ rotundæ	

D 2

Cor.

Corticum radicum Capparis

Gentianæ Melanopiperis

Anisi Fœniculi

Anethi Apij

Perroselinæ Macedonici

Saxifragiæ ana ʒ ij.

Hermodactylorum

Origani Peucedani

Schœnanthi Cardamomi

Leucopiperis

Carui Ligustici

• Viacetroxici ana ʒ j. ʒ. ʒ. ʒ.

Balsamiæ Pulegij

Dictamni Cretici

Costi Pyrethri

Thymbræ Basiliconis

Prœniæ [*videlicet radicis eius aut seminis.*]

Macropiperis. Amomi Sinoni

Orobiveri ana ʒ j. ʒ. ij. ʒ.

Xylobalsami [*aut succedaneum aliquod simili descriptioni Xylobalsami.*]

Cassiæ fistulæ

Corallij rubri Rasuræ Eboris

Carpobalsami [*aut aliquod succedaneum, ut supra*]

Dauci Cretici ana ʒ ʒ.

Moschi

Moschi Ambrae

Ossis è corde cerui ana ḡ xliij.

sacchari albiissimi.

SAXIFRAGIA in Italia dicitur ea herba, quam in Germania Pimpinellam vocamus Itali habent diuersam Pimpinellam.

BALSAMITAE. } Nicolaus Alexandrinus Latinè impressus, non Balsamitam habet, sed Balsamum: significat tamen Balsami vox, nonnunquam etiam Mentam; cuius species est Balsamita hoc loco recipienda: nam si Balsami liquorem intellexisset Nicolaus, non simpliciter Balsamum, sed Opobalsamum posuisset.

SINONVM secundum Matthæum Syriacum, est Petroselinum agreste. Sed de eo infra in annotationibus Aureæ Alexandrina.

CASIAE fistula nomine hoc loco nequaquam debet intelligi Casia fistula, cuius nigra medulla bilem per aluum purgat; sed Casia lignea aromatica, quæ Cinnamomo similis est: nam hac etiam apud probatos veteres auctores Casia fistula vocatur.

DAUCVS Creticus hodie ignotus est, ideo B possumus eius loco Seseli Creticum accipere, id est, Beruvurtz, aromaticam herbam foliis feniculi, sed multò minoribus.

D 3

P. C.

A Balsamita.] Cum Nicolai codex, ut & Cordus fatetur, Balsami legat; eo non herba Balsamita vocata, neque cum Fuchſſo Balsami veri folia, sed oleū seu succus veri Balsami, Opobalsamūve hic intelligendum esse existimo.

B Daucus Creticus.] Beruvurtz Germanis vocata herba, seu Foeniculus porcinae Belgis, non est Seseli Creticum, ut neque Daucus Creticus, sed potius Meū Diosc. aut illi proximum. Daucus autem Creticus verus, Diosc. delineationi admodum conueniens semine acri, albo, hirsuto, oblongo, nuperrimè cognosci cœpit, videtque in hortulo hodie, inter plurimas raras plantas, nostro.

Sanat capitis vertigines, oculorum caligines abstergit, palatum & arterias purgat, distillationem vix astringit, dentium dolorem mitigat. Asthmaticis & suspiciosus peculiariter opitulatur; pectoris & pulmonis causas facile amputat. Stomachi & hepatis dolores & debilitates sedat, spleneticorum & pleureticorum angustias paragonizat, omnium interaneorum vitiiis prodest, inflationes & torsiones ab eis aufert. Nephriticos, calculosos, stranguriosos & colicos purgat, & dolorem releuat. Sa-
pius

ius autem sumptum, colorem pallidū emen-
tat, menses deducit, & in ordinem debitum
edigit. Typos quotidianarios & quartanarios
reprimat. Qui autem hoc electuario usus fue-
rit, à multis conseruabitur morbis.

Diatrion santalon. D. Nicolai.

R. Santali albi	Santali rubri
Santali citrini	Rosarum
Sacchari ana	℥. iij.
Rhabbarbari	Spodij
Succi Glycyrrhizæ	
Seminis Portulacæ	ana ℥. ij. 3. f. 6. v.
Amyli	Gummi Arabici
Tragacanthæ	
Nucleorum seminis Melonis	
Cucumeris	Cucurbitæ Citrulli
Seminis Scariolæ	ana ℥. j. β.
Camphoræ	3. j.
Sacchari albiſſimi	

*SCARIOLA est Endivia vulgaris, cuius
folia in dorso habent spinulas, ut dictum est su-
prà in Diarhodon Abbatis.*

Pollet aduersus iecinoris & ventriculi calo-
rem mirum in modum. tabidis & regio mor-
bo correptis itidem prodest.

D 4

Dia-

Diaxylo aloës D. Mesua.

R. Ligni aloës crudi
 Rosarum ana ℥ j.
 Caryophyllorum spicæ Indicæ
 Macis Nucis moschatæ
 Galliæ moschatæ Mesuæ Cubebarum
 Cardamomi maioris
 Cardamomi minoris
 * Zingiberis Mastiches
 Cinnamomi
 Cyperi Schœnanthi
 Zedoariæ Been albi
 Been rubri
 Folij [aut macis siue spica nardi]
 Serici crudi Margaritarum
 Coralli rubri Charabæ
 Foliorum citrei mali Corticum citrei mali
 Ocimi garyophyllati
 Silymbrii Mentæ siccæ
 Samplicis [id est, Maiorana.]
 Piperis longi
 Zingiberis ana ℥ iiij.
 Moschi boni ℥ j.
 Ambre ℥ i. β.
 Sacchari albillimi.

CYPE.

CYPERI, videlicet Cyperi rotundi : nam
runda radices Cyperi propriè & simpliciter ab
ectoribus Cyperus vocantur. Longis verò ra-
cibus Cyperus, vocatur ab iisdem Cyperis.
Quoniam verò non semper rotundum habere li-
t, necesse est in paucis eius, longo uti.

SISYMBRIUM est menta aquatica ni-
ricantibus, ut purpura, caulibus.

PRODEST malis vetriculi, cordis & icci-
oris frigidis, animæ defectioni, concoctioni-
ue. Oris foetorem abigit, lætitiāque parit.

Diatrion pipereon Mesue.

2. Macropiperis	Melanopiperis
leucopiperis	ana ʒ v.
Zingiberis	Thymi
Anisi	ana ʒ ij.
opicæ Indicæ	Ammios
Amomi	[quod nō habetur, & loco eius capiatur carpesium siue cubeba, aut calamus aremati- cus officinarum, qui pro vero atoro habetur.]
Cinnamomi	ana ʒ j.
Cassia lignæ	Seminis Apij
Seseliis	
Asari	
Enulæ siccæ	ana ʒ β.
	D ʒ Sacchari

Sacchari albissimi.

Refrigerato ventriculo, & acido ructu
quartanis, exolntis, iecinorosis, & inflationi
bus auxiliatur. Item ruffientibus.

Diazingiber D. Nicolai.

℞. Zingiberis	Galangæ
Garyophyllorum	Cinnamomi
Nucis moschatæ	Granorum paradisi
Piperis longi	Macis
Cardamomi	Spicæ Indicæ
Rhabarbari	Rosarum rubiarum ana ʒ xv.
Pinearum mundatarum	ʒ β.
Phisticorum [id est, pistaciorum.]	ʒ ij.
Anisi	Fœniculi
Glycyrrhizæ rasæ	Croci ana ʒ β.
Sacchari albissimi.	

Ventriculum roborat & firmat.

Electuaria Ducis D. Nicolai.

℞. Anisi	ʒ ij.	ʒ xv.
Glycyrrhizæ		
Mastiches	ana ʒ ij.	ʒ v.
Cinnamomi		
Chamædryos	Zingiberis	
Galangæ	Fœniculi	
Carui	ana ʒ j.	ʒ xv.
		Xylocassia

Locasiæ	Calaminthæ
nuci	Pyrethri
peris albi	Piperis longi
yperis [<i>scilicet rotundi.</i>]	
hermanthi	Ireos
nomi [<i>aut succedaneum eius.</i>]	
olij [<i>aut succedaneum eius.</i>]	
fari ana 3 j.	
oicæ Indicæ	Croci
ummi Arabici	Tragacanthæ
eminis Anethi	Calami aromatici
ubebarum	Garyophyllorum
arpobalsami	
igustici	Seminis Olusatri
accarum Iuniperi	Seselios
entaphylli [<i>videlicet radicem eius.</i>]	
eminis Asparagi	
eminis Citri	
acori [<i>aut loco eius Galanga.</i>]	
ummi	Rhabarbari
Nucis myristicæ [<i>id est, nucis moschata.</i>]	
Ligni Aloës	
basilici garyophyllati	
Milij solis	
Seminis Saxifragiæ	
Nucleorum seminis Citrulli	
	Cucume.

Cucumeris

Melonis

Cucurbitæ

Seminis Scariolæ

Petrofclini

Been albi

Been rubri

Styracis calamitæ

Cardamomi ana ʒß. G. v.

Penidiarum ʒ iij. ʒ ij. β.

Sacchari albiſſimi.

CHAMAEDRYOS, videlicet vera, quae
folia habent similia quercus. nascitur in monti-
bus Iena, & inter Herspruck atq. Ambergam.

OLVS ATRI semen, est magnū semen quod
in omnibus Pharmacopoliis dicitur Macedoni-
cum. siue Petroselinum Macedonicum.

Valeat ad indigestionem & ventositatē stomachi & intestinorū, & ilei dolorē & lapidis.

Electuarium de Gemmis D. Mesuæ.

R. Margaritarum albarum 3 iij.

Sapphiri Hyacinthi

Sardæ Granatorum

Smaragdi ana 3 i. B.

Zedoariae Doronici

Corticum Citreim ali Macis

Seminis Ocymigaryophyllati ana ʒ ij.

Corallij

Gallij rubri Charabæ
 Suræ Eboris ana ʒ ij.
 n albi Been rubri
 ryophyllorum
 ngiberis Piperis longi
 cæ Indicæ

ij [aut succedanei eius]
 oci

rdamomi ana ʒ j.

ochiscorum Diarhodon

gni aloës ana ʒ v.

onamomi Galangæ

rumbeth ana ʒ j. ʒ.

oliorum Auri

oliorum Argenti ana ʒ ij.

mbra ʒ ij. Moschi ʒ ʒ.

acchari albißimi.

S A P P H I R V S & Smaragdus qui passim in
 tyropoliis habetur, nihil valet, cum flammam
 ant in igne, & ex argentifodinis colligantur:
 uare omittendi sunt, aut loco eorum, de Hya-
 ntho & Granato maius pondus sumatur.

S A R D A est gemma qua neotericis Carne-
 vocatur, quod diligenter est notandum. Ha-
 tenus enim qualis esset gemma Sarda; ignora-
 imus omnes.

Z V R V M

ZURUMBETH est species Zedoaria, quæ radicem habet rotundam & globosam, & affertur cum Zedoaria longa.

P. C. SCHOL.

A Zurumbeth est spec.] Inter tres Zedoaria species quæ Antuerpiam aduehuntur radiculæ oblongis, quartum quid optimo Zedoario potissimum immixtum reperitur, rotundis globulis & ea propter truncosa Zedoaria à Materialistis nostris vocitata: hac utentur zurumbeth loco Pharmacopœi, & Garciam ab horto de Aromatibus Indicis hisce de rebus consulant plura noscere qui voluerint.

Malis cordis, ventriculi, cerebri, iccinoris, & uteri frigidis auxiliatur. Item palpitationi cordis, defectioni animæ, ac concoctioni, tristitiam denique citra causam ortam amouet.

Electuarium Iustinum D. Nicolai.

R. Cinnamomi

Folij [ant succedanei eius.]

Costi

Nardi [id est, Spica Indica.]

Cassia lignea

Aristolochiæ longæ

Aristolochiæ rotundæ

Enulæ campanæ

Hysopi

Pulegij

Artemisiæ

Pea-

Antaphylli [*videlicet radice eius.*]
 Cucupiperis Orobi veri
 Petroselini Ligustici
 Muscatelli [*i. Petroselini Macedonici vocati.*]
 Seminis Vrticæ
 Milij Solis
 Xifragiæ seminis [*sumatur eius loco semen*
pimpinella nostra, Germanorū videlicet, non
Sanguisorba vocata.]
 Cascarum Iuniperi Seminis Asparagi
 Sileris montani
 Seminis Apij Seminis Anethi
 Seminis Rutæ Seminis Citrei mali
 Seminis Fœniculi Seminis Anisi
 Cascarum Lauri ana ʒ j. ʒ.
 Cascarum albiſſimi.
 Valet ad dolorem renum, calculos frangit,
 arenas expellit, ac stranguriam dissoluit.

Confectio Liberans [scilicet à peste.]

Radicum Tormentillæ
 Seminis Acetosæ
 Endiuicæ
 Coriandri præparati
 Citrei mali ana ʒ j. ʒ.
 Santalorum omnium
 Dictamni

Dictamni albi ana ʒ j.

Boli Armeni præparati

Terræ sigillatæ [*loco eius Bolus leuanticus, est, orientalis, sumatur.*] ana ʒ iij.

Margaritarum Corallij albi

Corallij rubri Charabæ

Rasuræ Eboris

Spodij [*id est, Eboris resti, de quo in fine.*]

Ossis è corde cerui

Been albi Been rubri

Doronici Cardamomi

Cinnamomi Macis

Ligni Aloës

Canæ lignæ [*aut succedaneum eius.*]

Groci Zedoariæ ana ʒ ʒ.

Smaragdi [*loco eius Hyacinthi aut Granati.*]

Hyacinthi Granati

Serici crudi incisi & torrefacti ana ʒ j.

Penidij

Sacchari Candi ana ʒ ij.

Florum Nenupharis [*id est, Nymphae.*]

Bagollæ

Rosarum ana ʒ j.

Camphoræ ʒ vij.

Moschi

Ambrae ana ʒ iij.

Sacchari

acchari albissimi.

Contra pestem plurimum valet, tutatur cor-
des ne lædatur à pestifero aëre, & præseruat
amores à corruptione.

Confectio Cordialis.

Margaritarum

Podij [*id est, Eboris vsti*]

Tranatorum verorum

Cinnamomi

Tormentillæ

Boli Armeni ana ʒ ij.

Antalorum omnium Rasuræ Eboris

Unicornu ana ʒ ij. Hyacinthorum

Opophiri [*loco eius maius pondus Hyacinthi.*]

Corallij albi Corallij rubri

Charabæ albi Valerianæ veræ

Dictamni Zedoariæ

Signi aloës ana ʒ j.

Terræ figillatæ [*aut Boli leuanticæ, hoc est,*

orientalis.] ʒ j. ʒ ij.

Merici crudi modicum torrefacti ʒ ij.

Ossium è corde cerui ʒ j. ʒ.

Ben albi

Ben rubri ana ʒ ij.

Foliorum auri fini numero v.

Moschi

℞

Ambræ

Ambrae ana ḡ x.

Sacchari albiſſimi.

PRÆSERVAT cor à peste.

Electuarium Letitiæ Galeni

ex Nicolao.

℞. Florum Ocimi garyophyllati

Croci Zedoariæ

Xylobalſami [*pro quo lignum aloës, cū in iſta
deſcriptione non habeatur.*]

Garyophyllorum Corticum citrei mali

Galangæ Macis

Nucis moſchatae

Styracis calamitæ ana ʒ ij. β.

Aniſi Raſuræ Eboris

Thymi Epithymi ana ʒ j.

Camphoræ Moſchi Ambrae

Margaritarum perforatarum

Oſſium de corde cerui ana ʒ β.

Auri foliati meri [*id eſt, puriſſimi.*]

* Argenti foliati meri ana ʒ β

Sacchari albiſſimi.

Fiat confectio ſolida.

Si verò volueris facere in forma liquida ſi-
ue opiatæ, tunc adde

Succi Cydoniorum

Pomo-

Pomorum odoratorum dulcium

Boraginis

Vini veteris optimi, ana partes æquales in
ita mensura, quanta despumando & deco-
quendo saccharo satis fuerit: nulla enim aqua
saccharum dissolui aut decoqui ad spissitudi-
nem debet in hac confectione.

LAETITIAM colorisque bonitatem efficit,
concoctionem iuuat, & canitiem retardat.

Electuarium Letificans Rhasis.

. Melissæ

Corticum Citrei mali

garyophyllorum

Galliæ moschatæ Mesuræ

Castiches

Croci

innamomi

Nucis moschatæ

ardamomi

Jeremisch [pro quo potest semen pæonia accipi]

een albi

Been rubri

edoariæ

Doronici

eminis Ocimi

eminis Ocimi garyophyllati

ana ℥ β. *

Moschi

℥ xxiiij. *

sacchari albißimi. Fiat confectio in tabulis.

Si verò volueris facere in liquida forma, vt

decet, tunc prædictas species sequenti Syrupo

misce, & fac in modum opiatae.

E 2

R. My-

- * R^x. Myrobalanorum Chebulorum, numero x
- * Emblicorum numero xxx.
- * Aquæ P iij. aut quantum sufficit. Coquantur trita myrobalani in prædicta aqua, donec remaneat tertia pars, deinde cola. Colaturæ adde de mellis despumati P j. loco prædicti sacchari bulliat postea vsque ad iustam spissitudinem & insperge species prædictas, postquam feruor Syrupi remissior factus fuerit.

NEREMISCH apud Rhazim est Rosa asinina. Auerrois autem interpres dicit Paoniam esse rosam asinorum. Ergo, secundum hunc Neremisch idem esset quod Paonia: nisi Rhasis de utraque, id est, de Neremisch & de Paonia, duo propria faceret capitula, tamquam de rebus diuersis. Certum igitur statuere non possumus, quid sit Neremisch.

Confortat omnia membra principalia, e quibus virtutes manant naturales & animales, iuuat calorem naturalem, & spiritum viuificat, compescit malas cogitationes, & bonos mores, lætitiā & gaudium gignit.

*Electuarium Plirisarcoticum, seu potius,
Pleres archonticon, D. Nicolai.*

R^x. Cinnamomi
Ligni aloës

Garyophyllorum
Galangæ

Spica

Spicæ Indicæ	Nucis moschatæ
Zingiberis	Spodij
Schœnanthi	
Cyperī	Rosarum
Violarum	ana ʒ j. ʒ xv.
Folij [<i>loco ipsius Macis sumatur.</i>]	
Glycyrrhizæ	Mastiches
Styracis calamitæ	
Sampsuchi [<i>id est, Maiorana.</i>]	
Balsamitæ	Ocimi
Cardamomi	Macropiperis
Leucopiperis	
Myrtillorum	
Corticis Citrei mali	ana ʒ ij. ʒ v.
Margaritarum splendidarum	
Been albi	Been rubri
Corallij rubri	
Serici tosti	ana ʒ j. ʒ ij. ʒ.
Moschi	ʒ vij. ʒ.
Camphoræ	ʒ v.
Sacchari albißimi.	

Tristibus, melancholicis, imbecillo ventriculo, deliquio animi à corde proficiscenti succurrit. Memoriam amissam recuperat, sensus acuit, comitialibus & asthmaticis prodest, omnemque cerebri debilitatem aufert.

E 3

Lichen-

Lithontribon D. Nicolai.

℞. Spicæ Indicæ Zingiberis
 Xylobalsami [*aut ligni aloës ut suprâ.*]
 Acori [*sive calami aromatici hodie vocati.*]
 Cinnamomi
 Peucedani [*videlicet radicis eius.*]
 Mei [*loco eius accipe Seseli Cretici radicem, in
est, Beruvurtz, Germanis vocatam*]
 Melanopiperis Macropiperis
 Leucopiperis Saxifragiæ ana ʒ ij. ʒ
 Opobalsami [*loco eius sumatur oleum ex gra-
nis Iuniperi.*]
 Garyophyllorum
 Costi Rhapontici
 Glycyrrhizæ Cyperi
 Tragacanthæ
 Seminis Olusatris [*est semen quod Macedoni-
cum vulgò perperam vocant.*]
 Chamædryos Seminis Apij
 Ammios Asparagi Ocimi Vrticæ
 Citrei mali ana ʒ i. ʒ xv.
 Folij [*aut succedanei eius.*]
 Croci Schœnanthi
 Lignæ Casiæ [*aut succedanei eius.*]
 Bdellij Mastiches

Ircos

fit, simul atque suauiter olere, & simplicitate
 odoratum esse, aliquantulum cum etiam diffi-
 rant. Eo modo, ut quae de Meo Asturia ac Sistr.
 Monachi obseruarunt & scribunt: ego, utpot
 mihi quoque comperta, approbem, illisq; mani-
 dem. Proinde si quispiam adhuc nihilominus re-
 fragari voluerit, pro Meo vero tamen eo tan-
 tisper utetur Pharmacopœi, deserto illo quo ha-
 etenus vsi sunt nostrates, dum ipse Diosc. Geniu-
 nobis aliud proferat. Ceterum imprudenter ad-
 modum Mathiolum carpit Fuchsius, quod ille
 unà cum Monachis, hanc herbam Apulis Im-
 peratoriam nominari inquit, quam Angeli-
 cam esse (sic à Germanis appellatam) malè in-
 terpretatur Fuchsius: cum Imperatoria nomine
 ab isthoc Meo admodum diuersa, à Germanis
 demonstrantur planta.

Præclarum ad indigestionem stomachi ex-
 frigiditate. Iliorū lumborumq; dolores com-
 pescit, lapides in renibus & vesica potenter
 confringit, & inde mirabiliter expellit. Stran-
 guriā & dysuriā è vestigio soluit.

Rosata Nouella D. Nicolai.

℞. Rosarum	Sacchari	
Glycyrrhizæ	ana	℥ j. 3 j. ʒ ij. ʒ.
		Cinna-

Cinnamomi ʒ ij. ʒ ij. minus ʒ ij. *
 Caryophyllorum
 Nardi [*id est, Spica Indica.*]
 Zingiberis Galangæ
 Nucis moschatae Zedoariae
 Styracis calamitæ Cardamomi
 Seminis Apij ana ʒ j. ʒ vj. *
 Sacchari albissimi.

CONFERT apprimè calori & siccitati
 stomachi, cordis, hepatis & pulmonis. Sitim
 compescit & vomitum, abscindit debilitatem
 stomachi, adstringit laxa. Cardiacis subuenit,
 sudorem diaphoreticum reprimit, ex chroni-
 ca infirmitate debiles recreat.

Electuarium Diapaeonias.

R. Radicis Paeoniae ʒ j.
 Macis Spica Indica
 Croci Coralliorū rubrorum
 Margaritarum non perforatarum
 Mastiches ana ʒ β.
 Myrtillorum verorum ʒ j. β.
 Cinnamomi
 Nucis moschatae
 Caryophyllorum
 Folij [*loco eius Cassia lignea vera.*]
 E s Zingi-

Zingiberis

Piperis longi

Cardamomi

Granorum paradisi ana ʒ ij.

Glycyrrhizæ ʒ v.

Anacardi ʒ j. β.

Moschi Ambrae ana ʒ vj.

Sacchari albiſſimi

Fiat confectio in tabulis in æſtate.

In hieme verò adde ſpeciebus triplum molli
deſpumati, & conficiatur electuarium.

CONFERT epileſiæ.

Electuarium Reſumptiuum

D. Nicolai.

℞. Roſarum

Glycyrrhizæ

Sacchari ana ʒ ij. ʒ v.

Gummi Arabici

* Tragacanthæ ana ʒ ij. ʒ ij.

Santali albi

Santali rubri ana ʒ j. β. Papaueris albi

Succi glycyrrhizæ Amyli

Seminis Portulacæ

Lactucæ

Scariolæ ana ʒ iij.

Garyophyllorum

Spodij [pro eo, Eboris uſti.]

* Cinnamomi ana ʒ j.

Zingi.

Gingiberis

Styracis calamitæ ana ʒ ij.

Croci ʒ v.

Penidiarum ʒ β.

Nucleorum seminis Cucurbitæ

Citrulli Cucumeris Melonis ana ʒ ij.

Seminis cydoniorum ʒ ij.

Amygdalorum dulcium Pincorū nucleorum

Berberis Seminis Maluæ

Seminis Coti siue Bombacis

Seminis violarum Sebesten

Nymphææ ana ʒ ij.

Cum Syrupi violati quātitate sufficienti fiat
Electuarium.

RESTATVRA T humiditatem radicalem,
lenit, humectat, nutrit, & cōfortat. Aperit po-
ros, obsistit cholerae, sedat febrem, tussim & si-
tim. Restituit integras vires, & pristinam sa-
nitatem, extenuatis, consumptis & hecticis.

Diacorum D. Mesuæ, in sua praxi, cap. 1.

de affectibus nervorum.

R. Radicum Secacul Acori

Pinearum ana ℥ j. β.

Radices Secacul mūdare & incisæ coquātur
in aqua clara, donec aqua consumatur, postea
opti-

optimè pistentur, & in minutissimas partes conterantur, donec pulti similes fiant. Deinde adfunde eis mellis odorati & optimè despumati ℞. coquatur lento igne, donec tota aqua quam radices Secaculi imbibierunt, in vaporem resoluta sit; diligenter agitando, ne ad vasis fundum adurantur radices. Cum autem iusta spissitudinis consistentiâ acquisuerit, ab igne deponito, & adde radices Acori tenuissimè tritas, & Pineas minutissimè incisas, cum subsequenti puluere optimè mistas.

℞. Piperis ℥ j. Piperis longi
 Caryophyllorum Zingiberis

A Macis ana ℥ iiiij.
 Nucis moschatæ Galangæ
 Cardamomi ana ℥ iiij.

Omnia ista simul cum melle & radicibus Secaculi misceto & vnito, diligenter agitando ne grumi aliqui relinquantur.

B SECACULUM verum est Siser, quod Germani vocant Gritzelmoren, & Klinghelmoren, Galli Escheruis & Seruiles, Bavari Nudle, Sueni Geyrle.

ACORUS, id est, vulgò vocatus Calamus aromaticus. Mesue iubet etiam Acori radice elixari. Sed quia nos recentes & virides non habemus

mus, ut ij qui in calidis regionibus habitant,
leo melius est eas tritas melli admiscere.

P. C. SCHOL.

Rosas è contextu, à Cordo perperam imposi- A
us, Fuchsis quoque & id volente, sustuli.

Secacul verum.] Secacul nō est Sifer, ut Cor- B
us existimat: sed veluti Francisco Alexand.
quoque placet, esse posset ea planta quam Crith-
um spinosum, seu Pastinacam marinam vocāt
Anspessulani: unde mihi in horto meo à Ma-
thia Lobelio doctore Medico semine transmissio,
nunc viret. Genuinum interim si id non fuerit,
ei eius locum tamen commodè substitui posset,
respondentibus facultatibus: dum Arabs quis-
iam ipsissimum nobis monstrauerit.

Confert mirum in modum ægitudinibus
eruorum, acuit omnes sensus & ingenium,
edat dolores capitis; est peculiare remedium
rigidarum ægitudinum, senum, & maximè
atarrihi.

Pulvis ad Epithemata cordis.

℞. Santali rubri ℥ j.

Corticum Citrei mali Santali albi

Rosarum Corallij albi

Corallij rubri Charabæ

Spodij

Spodij [*accipe Eboris vsti.*] ana ζ β

Offis cordis ceruini

Croci ana ζ j.

Specierum Lætitia Galeni

Specierum electuarij de Gemmis

Specierum Diamargariton ana Θ iiij

Camphoræ Θ j.

In puluerem redactæ species cōmisceantur.

Pulus ad Epithemata hepatis.

\mathcal{R} Rosarum Santali albi Santali rubri

Absinthij Schœnanthi

Spodij [*pro eo Eboris vsti.*]

Spicæ Indicæ ana ζ β .

Contrita in puluerem misce & reponc.

CONFECTIOES

OPIATÆ.

Diaolibanum D. Nicolai.

\mathcal{R} . Castorei Opij

Hyoscyami albi ana ζ iiij.

* Calicæ lignæ ζ ij. Θ ij.

Folij [*ant succedanei eorum.*]

Croci

Thuris

thuris masculi ana 3 ij.
 hapontici
 momi [pro quo Carpesium] ana 5 j. 3 ij.
 lyrrhæ 3 j. β.
 æoniæ Styrcis calamitæ
 lacropiperis ana 3 j.
 picæ Indicæ
 yrethri Euphorbij
 eucopiperis ana 3 ij. β.
 mellis despumati triplex pondus.

EST verò obseruandum in omnibus opiatis,
 et singulis vnciiis specierum, misceantur tres
 uncia mellis despumati. Si minus fuerit, exci-
 tatur confectio facilè: si verò plus addatur, vi-
 res eius disperguntur.

THVS Masculum, est Thus album aut
 ruuum purissimum in globulos rotundos singu-
 los, aut testiculorum figura geminos concretum,
 deoq; Masculi cognomen accepit.

VTILE est ad diuersas passionēs capitis,
 emicranicum dolorem placat, & supercilij
 chrymas potenter stringit; fauces rheuma-
 tizatas & arterias lenit. Hæmoptoicis & tussi-
 ntibus medetur. Vomitus cōpescit, dolorem
 stomachi & nauscam aufert. Peripneumoni-
 s, pleuriticis, empyicis sine dubio subuenit.

GONOR-

Gonorrhœam & satyriasm emendat, & menstrualem sanguinem sistit.

A *Musa Enea, siue ZaZenea, vel Egerea*
D. *Mesue.*

R. Castorei

Myrrhæ

Melanopiperis

Galbani

Cinnamomi

Meu [aut loco eius *Seseli Creticum*, id est, Beni

Dauci

Opij

Macropiperis

Costi

Phu

Asari

Croci ana 3 iiij.

Mellis despumati optimi triplex pondus.

P. C. SCHOL.

A *Musa.*] *Erroneè à Cordo Musa hac confectio inscribitur, veluti & Francis. Alex. ritè obseruauit cum Sagzenea à Mesue vocetur. Musa enim Enca apud Nicolaum confectio est, ab hac plurimum differens.*

VALET ad omnes passiones frigidas, & ventositates crassas, & dolorem dentium & corrosionem eorum, & ad frigus stomachi, tarditatem digestionis, colicam, difficultatem vrinæ, & ad frigus & phlegma, & ad muccositatem vrinæ.

Philonium

*Philonium Maius, siue Romanum**D. Nicolai.*

Leucopiperis

lyoscyami albi [*i. seminis eius*] ana ʒ v. *

apij ʒ ij. β.

aliæ lignæ [*aut succedanei eius*] ʒ j. β.

seminis Apij ʒ j.

A

Petroselini Macedonici Fœniculi

Dauci Cretici ana ʒ β.

B

roci ʒ j. Spicæ Indicæ

*

edoariæ

*

pyrethri ana ʒ β. ʒ v.

cinnamomi ʒ j. β.

euphorbij Costi ana ʒ j.

Sellis despumati optimi triplex pondus.

Pro Dauco Cretico accipere licet Seseli Creticum, id est, Beruvurtz.

P. C. SCHOL.

Sem. Apij ʒ j. & paulo pòst, Sem. Dauci A

na ʒ β] *Pro ʒ j. Cordus malè ʒ j. sicuti B**& pro ʒ β erroneè ʒ j. legebat: ut Fran-**isco Alex. quoque placet.*

Emendat tussim cum vino multo oblatum,

peripneumoniam cū hydromelite, sanguinis

putum cum polygoniæ succo. Indigestionem

E

stoma-

stomachi & vomitum cum posca, dolorem hepatis cum cœnomelite curat, spleneticis & auriginosis cum oxymelite subuenit, cœliacis cum apozemate pegani. Pleuritacis, ilioosis, nephriticis & vesicæ symptomatis cholerice medetur.

Philonium D. Mesuæ.

℞. Piperis albi

Seminis Hyoscyami albi ana ʒ xx.

Opii ʒ x. Croci ʒ v.

Spicæ nardi Indicæ Pyrethri

Castorei ana ʒ j.

Mellis despumati optimi triplum pondus.

MIRVM in modum mitigat dolores, præcipuè stomachi, matricis, laterum, totius ventris, & colicæ cum decoctione chamæmeli veruræ, & statim prouocat somnum cum aqua lactucæ vel syrupo papaueris. Tollit dolorem capitis cum decoctione stœchadis, prohibet catarrhum cum decoctione olibani vel spicæ. Contra spasmus & paralyfim bibitur cum decoctione nucis moschatæ. Facilitat anhelitum cum decoctione baccarū lauri vel hyssopi, & sedat tussim cum aqua mellis. Prouocat urinam, faciliat mictum, & frangit lapides vesicæ.

eficæ, cum decoctione Saxifragiæ vel aqua
 pij. Compescit vomitū & fluxum sanguinis
 ex ore, cum succo plantaginis vel decoctione
 mastiches, & sedat prouocationes & singultus,
 & vitia matricis, & potenter somnū inducit.

Philonium ex Galeno &

P. Ægineta.

℞. Croci ʒ v.
 Pyrethri Euphorbij
 Picæ Indicæ ana ʒ j.
 Piperis albi ʒ xx.
 Hyoscyami ʒ viij.
 Lachrymæ Papaueris ʒ x.
 Mellis despumati optimi triplum.

P. C. SCHOL.

Hyoscyami ʒ viij.] *Cum non Galeni, sed* A
P. Ægineta tantum corrupta exemplaria perpe-
ram legant Hyoscyami ʒ viij. atque ex Corna-
rij Dolabella ʒ xx, pro ʒ viij. restituenda sint,
cum Mesues descriptione hoc pacto conueniet, ut
note qui ex hisce eandem desumerit; Castorium
in Euphorbij locum substitutum si exceperis.

Philonium Persicum D. Mesue.

℞. Piperis albi
 Hyoscyami albi ana ʒ xx.
 F 2 Opij

Opij

Terræ sigillatæ [pro qua Boli Armeni ut si
præ] ana ʒ x.

Lapidis Hæmaritis Croci ana ʒ v.

Castorei

Spicæ Indicæ

Euphorbij

Pyrethri

Margaritarum

Charabæ

Zedoariæ

Doronici

Trochiscorū Ramich[de quibus infra] ana ʒ

Camphoræ ʒ i.

Mellis rosati optimi triplum.

P. C. SCHOL.

Piperis albi.] *Insulsè admodum Papauer i
huius locum surrogauerat Cordus, quod e
suboluit facile Euchsio: sequētibus nihilominus
Cordum Coloniensibus medicis, in ab ipsis euu
gato non ita diu Dispensariolo.*

INVENTVM est ad retinendum sangui
nem menstruorum, hæmorrhoidarum, fluxum
ventris, vomitum, & sputum sanguineū; præ
sertim si cum succo plantaginis dissolutum
bibatur, & ad fluxum menstruorum mittatur
in vuluam, & ad fluxum sanguinis excoria
tium clysterizetur. Cōsolidat fermè vlcera &
venas, & nihil est quod magis & tutius præ
seruet ab abortu prægnantem grauidam.

Requie

Requies Nicolai.

℞. Rosarum
 Violarum ana ʒ iij.
 Opij Hyoscyami
 Papaveris [*videlicet albi.*]
 Mandragoræ [*videlicet cort. radice eius.*]
 Scariolæ [*videlicet seminis.*]
 Lactucæ [*videlicet seminis.*]
 Seminis Portulacæ

Psyllij

Nucis moschatæ Cinnamomi
 Sacchari ana ʒ j. β.
 Santali albi Santali citrini
 Santali rubri Spodij
 Tragacanthæ ana ʒ ij. ḡ v.
 Mellis despumati optimi triplum.

REQUIES dicitur, quia requiem acci-
 pientibus præstat: maximè typicè febricitan-
 tibus, quotidianariis, tertianariis, quartana-
 riis, acutis & peracutis.

Tryphera magna D. Nicolai.

℞. Opij ʒ ij.
 Cinnamomi
 Caryophyllorum Galangæ
 Spicæ Indicæ Zedoariæ
 F ʒ zingi-

Zingiberis	Coffi
Styracis calamitæ	
Calami aromatici	
Cyperi	
Iridis Illyricæ	
Peucedani	
Acori [<i>aut Calami aromatici hodie vocati.</i>]	
Mandragoræ	Nardi Celticæ
Rosarum	Piperis
Sem. Anisi	
Apij	Petroselinij Macedonici
Fœniculi	Dauci
Hyoscyami	Cumini
Ocimi	ana ʒ j.

Mellis despumati optimi triplum.

IRIS Illyrica, est eadem qua in Pharmacopoliis dicitur Ireos.

NARDVS Celtica siue Spica Celtica, & Saliunca est eadem herba qua in Pharmacopoliis dicitur Spica Romana.

AUXILIATUR dolori stomachi ex frigiditate, & cum accepta fuerit, statim patientē ad sudorem prouocat. Phreneticis, & mulieribus quæ ex melâcholia de matrice insomnes sunt, rheumaticis, peripneumonicis, & qui excernunt excrementa cum sanguine, vtilissima est.

Try-

*Tryphera minor Fænonis,
ex Mesue.*

℞ Myrobalan. Chebulorum
Bellericorum Indorum Emblicorum
Nucis moschatæ ana ℥ v.
Nasturtij assati Asari
Origani Persici Piperis
Olibani Ammios
Zingiberis Fructus Tamarisci satiuæ
Nardi Indicæ Schizanthi
Cyperii ana ℥ iiij.
Scoriæ ferri, quinquē diebus in aceto macera-
tæ, & deinde tostæ ℥ xx.
Myrobalani cum butyro recens non salito
assentur modicum, reliqua oleo amygdalino
dulci inuoluantur: deinde addantur
Moschi ℥ i.
Mellis despumati triplex pondus.

Oportet autē diligenter attendere, ne My-
robalani cōburantur, cū in butyro assantur.

ORIGANVM Persicum, id est quod ori-
ganum Orientale: nascitur etiam in Creta in-
sula, & Græcia: habet autem surculos, capitula,
folia, & ramulos maiorana similia, saporem
verò inter Satureiam & Dictamnū Creticum

F 4

medium,

medium, estq³ valdè odoratum & aromaticum
affertur ex Oriente in Italiam: loco autem eius
accipere licet Diétamnium Creticum verum.

TAMARISCUS sativa arbor est procera
sed ea nos caremus, ideoq³ cogimur loco eius no-
stratis Tamarisci foliis uti.

SCORIA ferri, propriè significat ferri re-
crementum, id est, eysenschlaken Germanis vo-
catum. verùm id non debet hoc loco accipi, sed
Squama aut Batitura ferri optimi aut Chaly-
bis, quam Græci Stomoma appellant.

VALET ad corruptionem & exuberan-
tiam menstruorum, & hæmorrhoidarum, &
ad corruptionem formæ, & debilitatem sto-
machi, & destruit humorem crudum, & clari-
ficat calorem. Confortat vesicam, & abscindit
fluxum ventris.

Tryphera Sarracenica

D. Mesue.

℞. Myrobal. Chebulorum

Indorum Bellericorum Emblicorum

Citrinorum ana ꝑ v.

Cinnamomi Leucopiperis

Macropiperis Melanopiperis

Secacul [id est, Siseris, ut supra.]

Folij

olij [*aut succedanei.*]
 picæ
 Cardamomi maioris Cardamomi minoris
 Cassiæ lignæ [*aut succedanei eius.*]
 Citræ Indi Cyperi
 Cypri Linguæ auis
 Caryophyllorum
 Cinnamon albi Been rubri
 Zingiberis ana ʒ ij.
 Nucismoschatæ Macis
 Sesami excorticati ana ʒ iiij.
 Amygdalorum dulcium
 Amygdalorum amarorum ana ʒ v.
 Ligni aloës Rhabbarbari
 Rutæ Seminis Fœniculi
 Mastiches ana ʒ ij.
 Ocimigaryophyllati Menthæ siccæ
 Origani Persici [*eius loco Dictamnium Creticum accipe.*] ana ʒ j. β.
 Fricentur Myrobalani tritæ cum butyro
 vaccino recenti & non salito, aliæ verò species
 cum oleo amygdalino dulci, & confice cum
 mellis despumati optimi triplo.
 SECACUL, non est Iringus siue Eringium,
 neque Iringus qui habet folia Cretami marini,
 neque Sigillum Salomonis. Sed verum Secacul
 F s est

est veterū Sifer, hoc est, radix illa quæ Germanicè dicitur Klingelmorn, Gritzelmorn, Nudlex, & Geyrlen: Gallicè Eschernis & Seruilles.

LINGVA auis, est semen fraxini.

SEITARAGI Indum, est herba Nasturtij odore & sapore, foliis longis, radice simili eius herba quam Merretich vocant Germani, & Pfeffervurtz, Raphanum magnum.

CONCOCTIONEM ventriculi & hepatis suo calore iuuat, ob id flatus dissipat, humores in ventriculo & aliis visceribus putres absumit, oris & corporis odorem & colorem commendat, lassitudinem tollit. Sanitatem præsentem tuctur, & morborum generationem prohibet. Venerem auget, hæmorrhoides sanat.

Tryphera Persica D. Mesue.

R. Succorum Solatri siue Solani

Endiuixæ veræ & fatiuxæ

* Apij ana P ij.

Lupulorum depuratorum P ij.

Proiciantur desuper

Violarum siccarum aut viridium

• Rosarum ana ℥ iiij.

Foliculorum Senæ ℥ ij.

Agarici ℥ i.

Pruno

unorū Damastenorū pinguiū numero L. *

uscutæ ℥ β.

oica Indicæ ℥ iiij.

alliat molliusculo igne, donec supersint ℞ ij.

t iniiciantur

pirhymi ℥ xl.

tyrobalanorū Citrinorū

Chebulatorū

Indorū fricatorū in oleo amygdalo-

rum dulcium ana ℥ ij. *

Bulliant leuiter, deinde ab igne deponan-

ur & percoleatur, atque dissoluantur in vna

parte istius percolati.

Tamarindorū recentium ℥ iiij.

Mannæ electæ ℥ j. β.

pulpæ cassiæ ℥ iiij.

acchari violati ℞ j.

Percolentur & mudentur à granis & sordi-

tis, atque in aliam aquæ partem proiciantur

acchari albissimi ℞ iiij.

Aceti vini ℞ j.

Coquatur leuiusculo igne, deinde proficiantur

super illud quod dissolutum est in succis, &

aggredientur simul in vnū, atq. coquantur do-

dec mellis crassitiē obtineāt: postremo in pul-

uerem redactæ sequētes species inspergantur.

Rha-

Rhabarbari optimi ℥ ij.
 Myrobalan. Citrinorum ℥ j. ꝑ.

Chebulorum

Indorum ana ℥ j.

Bellericorum

Emblicorum ana ℥ iiij.

Seminis Fumiterræ

Trochiscorum Diarhodon

Macis Mastiches

Cubebæ

Spodij [*loco eius Eboris vsti.*]

* Santali citrini ana ℥ ij.

Nucleorum seminis Cucurbitæ

Citrulli

* Cucumeris

Melonis ana ℥ ij. ꝑ.

Anisi ℥ iiij.

Spicæ Indicæ ℥ ij.

Inuoluantur hæ species in oleo violato. & confectio reponatur in vase vitreo.

CONFERT febribus acutis, & inflammationi stomachi & hepatis, ictericis calidiss. de oppilatione incolumitatem acquirit. Visum à fumis cholericis perditum, reparat. Sitim mitigat, morbos adustionis fieri prohibet.

Confe.

Confectio Anacardina D. Mesue.

2. Piperis nigri
 Piperis longi
 Myrobal. Chebulorum
 Emblicorum Bellericorum Indorum
 Castorei ana ʒ ij.
 Costi Anacardij
 Sacchari tabarzeth
 Burungi
 Baccarum Lauri ana ʒ vj.
 Cyperi ʒ iiij.

A

Anacardi per se terantur, & aliis tritis ad-
 misceantur: deinde omnia cum butyri recen-
 tis non saliti &

Mellis despumati ana ʒ v. ʒ.

Simul coctis bullitione vnica conficiantur. *

P. C. SCHOL.

Burungi.] Cordus huius loco semen Eruca A
 posuerat, hanc dictionem ita interpretatus;
 cum Melissam esse existiment plerique, vt &
 monet Fuchsius, Mathiolo aliter sentiente. Si
 verò dictionem hanc Eruca semen esse Mesue
 mens fuerit, per id Sinapi semen à colore al-
 bum vulgo hic nuncupatum, atque ab officinis
 nostris perperam Eruca semen vocitatum, in-
 telligen-

intelligendum erit; ab huius confectio nis virtutis
scopo non alienum.

Est cōfectio sapientum, & eorum qui de
siderant scire: acuit enim intellectū, subtilis
sensum, memoriam recuperat, & confert dolo
ri stomachi & vētris à frigiditate facto. & cl
arificat sanguinem, colorem bonum facit.

Aurea Alexandrina D. Nicolai.

℞. Asari (præ
Carpobalsami [aut aliquod succedaneū, ut su
Sem. Hyoscyami albi ana ʒ ij. ʒ.

Garyophyllorum

Opij Thebaici Myrrhæ.

Cypei rotundi ana ʒ ij.

A Balsami [loco eius oleum Garyophyllorum.]

Cinnamomi

Folij [aut succedanei eius.]

Zedoariæ Zingiberis

Costi veri Corallij

Cassia lignæ veræ Euphorbij

Tragacanthæ

Thuris masculi

Meu [vel potius Mei.]

Syracis calamitæ

Salicæ [id est, Spica Celtica, quæ nunc Roma
na di

*edicatur. Sed in Græco Alexandrino habetur
Helisphacon, id est Salvia.]*

Cardamomi minoris Seselios

Seminis napi Seminis saxifragiæ B.

Anethi

Anisi ana 3 j.

igni aloës

Chapontici

diptæ moschatæ Castorei

picæ nardi Indicæ Galangæ

Opopanax Anacardij

Mastiches Sulphuris viui.

Radiciis Pæoniæ

Eringij [*videlicet radicis eius.*]

Costarum Thymi

Acori veri [*sive Calami aromatici.*]

Pulegij Aristolochiæ longæ

Gentianæ

Corticum rad. Mandragoræ

Chamædryos Phu

Baccarum Lauri

Ammij [*id est, ammeos.*]

Dauci Cretici. [*eius loco licet accipere Seseli*

Creticum, id est, Beruvurtz.]

Macropiperis.

Leucopiperis

Xylo-

Xylobalsami [*aut aliquod succedaneum.*]

Sem. Carui

Amomi

Petrosclini

Ligustici

Rutæ

Sinoni ana ʒ β.

Auricosti [*.i. omnino igne depurati & sinceri.*]

Argenti meri

* Margaritarum albarum

Blattæ Byzantiæ

* Ossis è corde cerui ana ʒ xv.

Limaturæ Eboris

Calami aromatici

* Pyrethri ana ʒ vij.

Mellis despumati triplum.

I N Græco Alexandrino Nicolao etiam ali-
quadam pretiosa habentur in fine, ni fallor. Sa-
cut videbitur, si in lucem venerit.

M Y R R H A E. Actuarius auctor, quæ Ruel-
lius interpretatus est, pro Myrrha habet Myr-
baccarum, id est, Myrtillorum, facili ex alter-
in alterutram vocem lapsu: nam Myrta in plu-
rati numero Græcis sunt fructus Myrti, quæ vo-
magnam habet similitudinem cum Myrrha.

M E V vero nos caremus, eius loco accipere li-
cet Sisonis semen, quod iam dicitur Amomum
aut Sefeli Creticum, hoc est Beruvurtz. sed hoc
inferiu

ferius est accipiendum pro Dauco Cretico.

N A P V S, est parua, densa, at solida rapa, quam appellamus Germanicè Merseburgisch, ortfeldisch, & Bairischrublein.

P H V verum, quod ad medicinam requirunt auctores, non est Valeriana vulgaris, nempe grestis: sed alia herba qua Germanicè dicitur Gartensoliunck, Teriacskraut & Spicvurtel. Caulem & flores habet Valeriana, radicem maiorem & odoratiorem, folia longa & mollia. colitur à nobis in hortis.

A M O M V M verū] est Rosa Hierichuntis odorata, sed eo Pharmacopola hætenus caruerunt. ius succedaneū est verus acorus aut carpesium.

S I N O N V M siue Sison, siue Sinnus, siue E sinon, est semen nigrum aromaticum, quod hodie Amomū in Pharmacopoliis vocitatur falsò.

A M B A R V M Margaritarū] hoc est, perforatarum & non perforatarū: alij legunt albarum Margaritarum. Actuarius habet simpliciter Margaritarum: non malè ergo quis aget, si tam perforatarū quàm non perforatarū, ana ʒ ss. ʒ vj. & ʒ. acceperit. ita ex utrisq. unū fiet pon- tus, videlicet ut Nicolaus habet, ʒ j. ʒ xij.

P. C. SCHOL.

Balsami.] Opobalsami, legebat Cordus, au- A
G Floris

etoris potius mentē interpretā's & ponens, quā
vocem eam quam repererat seruans. Per Balsa-
mum verò absolute scriptum, herbam ipsam ip-
sius Balsami fruticis intelligi vult Fuchf. My-
repsum Xylobalsamo, Carpebalsamo, Opobal-
samo, & Balsamo, quatuor distinctis vocibus
ut perhibens. Sed eundem Myrepsum quatuor
illis simul in eodem usurpari medicamento, ne-
dicit nec demonstrat. Quare per Balsamū, Ni-
colaum succum seu Opobalsamum intellexisse
unā cum Francisc. Alex. Apolline censeo.

B Sem. Napi.] Seminis Sinapis legit Fuchf. in
huius loco ex Myrepsō, cui & aliquot vetust
mea exemplaria consentiunt.

C Rhapontici] Rhabarbari perperam legeba-
Cordus, indicante & id quoque Fuchfio, quod
à Rhapontico diuersum est. Id ipsum autem ad
amussim Dioscoridis descriptioni conuenien-
hisce nuperrimis annis primū adferri denuo at-
à peritioribus nonnullis cognosci coepit. Non ita
diu enim, eius uncias paucas (variusculum
enim adhuc est) ex urbe Veneta, in qua tū ag-
bat, ad me dono misit, non minus doctus, quā
bacce in nostra arte si quis alius versatissimus
atq. diligētissimus Valerandus Doreus, Lugdi-
ui pharmaca nūc faciens. Verū in huius Rha-
panur

anuria Rhabarbare non incommode uteris.

Amonium verum. } Rosa Hierichantis vo- D
ata vulgò, Amonum hercle esse non potest, ut
Mathiol. Fuchsius, & Francis. Alex. rectè sen-
tiunt. Quare eius utendum succedaneo.

Sinonum. } Cordimentum ut neq. Auguilla- E
ta intelligit Fräcisci Alex. Apollo. Dicere enim
volunt, Sinonum seu Sisonem verum, esse semen
quoddam nigrum, acre, aromaticum, exiguum,
apij semini simile: eius herba, inquã, cuius ima-
go à Hieronymo Trago, & Cordo, Sisonis nomi-
ne depicta est; ac cuius semen Belgij atque Ger-
mania officina Amonum falsò vocitant, proq̃
eo sinistrè utuntur. Idipsum interim si Sinonum
non fuerit, facultate cum illi sit satis vicium,
pro eodem vsui esse poterit.

Ambarum Margar. } Cùm ita legeret Corvius F
unà cum multis aliis, longè aliter sese res habet;
nempe ut in contextu, restitui.

C O N T R A defluxiones capitis frigore con-
ceptas efficax est, oculorum lachrymas exiecat,
dentium dolores lenit, aduersus capitis cru-
ciatum summopere prodest. Illitum fronti co-
mitiales, insanos, vertiginosos, & in vnuer-
sum omnem capitis noxam mulcet. Tabidis,
tussiculosis, humorem à thorace reicientibus,

G 2

cardiacis,

100 CONFECTIONES

cardiacis, sanguinem excreantibus præsentis
est auxilio, ischiadicis, coli & renum cruciatibus.
Aduersus iliorum noxam, difficultatem urinae,
& eiusdem stillicidii valet, calculos cominuit,
omni ventris malo liberat. Quotidianis &
tertianis febribus circa accessionis initium,
sufferuefacto stœchadis iusculo, medetur.

Diacodion simplex D. Mesua.

✱ R. Caput Papaueris mediocrium flaccidorum numero x.

✱ Macerata horis xxiiij. in Aquæ cælestis sextario vno, coquantur ad tertias, id est, tamdiu usque quò tertia pars aquæ super sit.

Colaturæ expressæ adde

Sapæ optimæ ad tertias coctæ ℥ iiij.

Mellis optimi ℥ j.

Coquantur ad perfectionem.

Diacodiū compositū verò ut fiat, addantur

Acaciæ, non ita aridæ, sed liquidæ:

✱ Rubiæ tinctoriæ Hypocistidis

Croci Myrrhæ

Balaustiorum [hoc est, florum malogranat. siluestrium] ana ℥ j.

Ranich ℥ iiij.

FLACCIDORVM, id est, non omnino recentium

centium, neque aridorum, sed medio habitu,
ualia sunt pridie decerpta. Si verò sicciora fue-
int capita, biduo maceranda erunt.

SEXTARIUS mensura genus est, quod si
velle repleatur, pendet ℥ xxx. si oleo, pendet ℥
xviij. si verò aqua repleatur, pendet aqua ℥ xx.
hoc autem loco accipiendus est sextarius aqua
alestis: ergo aqua oportet esse uncias xx. ponde-
ales. Variant tamen Auctores in sextarij defi-
nitione, ut inferius in unguentis dicetur.

HYPOCISTIS, id est, ut hodie corrupto
nomine vocant, Hypocistidos.

RAMICH, compositio est peculiaris, qua
ponitur in Trochiscis.

MELLIS quantitas admodum parua vide-
tur esse in hac confectiōe. Actuarius aliud ha-
bet Diacodion; quod huic subiiciemus statim.

DIACODION simplex confert eis qui-
bus ex capite ad pectus & ad pulmonem sub-
tiles catarrhi defluunt, & sunt causa tussis.

Compositum autē, naturæ impetum sistit,
& sanguinis reiectionem à visceribus thoracis.

Diacodion D. Actuarij.

℞. Capita Papaveris, neque perquam viridia,
neque etiam ariditate exucca, numero xiiij.

G 3

Rosa-

Rosarum ʒ i. ʒ j. β.

Crocī Acaciæ

Dulcisradicis [id est, Glycyrrhiza.] ana ʒ i.

* Armenæ glebæ [id est, Boli Armeni.] ʒ β.

Cinnamomi Hali

Hypocistidis

Florū siluestris Punicæ [id est, balaustrorum.]

ana ʒ j.

Myrti Dauci ana ʒ j.

Corallij candidi [id est, albi.]

Corallij rutili [id est, rubri.]

Rhois culinarij [id est, obsoniorum.]

Sanguinis Draconis

Florum Althææ ana ʒ j.

Seminis portulacæ ʒ j. β.

Capita papaueris in celesti imbre sufficien-
 ti duos dies macerato, postmodum ad tertias co-
 quito, & decoctum expressum ad iustam con-
 sistentiam coquito cum mellis optimi f ij. Po-
 stre mō deposito ab igne vase, species subtilis-
 simè tritas adicito, & bene vnito.

ʒ. hoc signum significat pondus, quod dicitur
 Sicilicum, pendet autem tantum quantum ʒ ij.
 Et est quarta pars uncia vnius.

HALVS aut Halum siue Alum, est Cōsoli-
 da saxatilis, id est, Symphytum petraum, quod
 hodie

die non habent Pharmacopola, ideoq; necesse
est Symphyti, siue Consolida maioris radices ac-
bere. nam Galenus dicit, utile esse magnum
symphytum, id est, Consolidam, ad omnia ad
he Petraum, id est, Alum.

R H V S Culinarium, id est, quod nunc vo-
ant Arabico nomine Sumach: oportet autem
nucleatum, & pulpam eius accipere.

AUXILIO est coeliacis, dysentericis, lenitati
intestinorum, alui profluvio cum aqua celesti,
in qua spodium infusuerit aut succinum tor-
refactum, vel cum stillaticio rosarum liquore.

Diacastorium D. Nicolai.

A

Rx. Castorij

Myrobalanorum citrinorum ana ʒ iiij.

minus ʒ j. β.

Assæ fœtidæ

Myrrhæ

Euphorbij ana ʒ j. ʒ xvij.

Aloës ʒ j. β. minus ʒ j.

Folij [aut succedanei eius.]

Artimoni [id est, Pyrethri.]

Glycyrrhizæ

Tragacanthæ

Calami aromatici

Nitri

Galbani

Schœnanthi

Opopanacis

G 4

Spicæ

Spicæ Nardi Indicæ	
Sagapeni	Nucis moschatæ
Calicæ lignæ	Leucopiperis
Macropiperis	Melanopiperis
Xylobalsami	[<i>aut succedanei eius.</i>]
Carpobalsami	[<i>aut succedanei eius.</i>]
* Colocynthidis	Rhapontici
Styracis calamitæ	Zingiberis
Cinnamomi	ana 3 j. 6 ij.
Staphisagriæ	
Dauci	Fœniculi
Petroselini	Apij
Sileris montani	Baccarum Lauri
Petrolei	Seminis Sinoni
* Styracis rubræ	[<i>id est, rufa, purissima.</i>]
Sanguinis draconis	Cardamomi maioris
* & minoris	
Thuris	Agarici
Mastiches	
Salis Hammoniæ	Zedoariæ
* Anisi	ana 3 j. 6 ix.
Thymbreæ	Hyssopi
Chamædryos	Pulegij
Origani	Balsamitæ
Ocimi	Brançæ vrsinæ
Di&amai	[<i>videlicet Cretensis.</i>]

Semi

minis Rutæ Aristolochiæ longæ
 istolochiæ rotundæ Ari
 bathematicum Afari
 luæ [*videlicet minoris.*]
 bsarum
 ellij ana ḡ xviii.
 ithymi Polypodij quercini
 pobalsami [*loco eius oleū Garyophyllorum.*]
 ana ḡ xiiij.
 lypidos
 apparis [*id est, radices eius.*] ana ḡ xij. *
 nacardij Sabinæ Gentianæ
 orticum rad. Mandragoræ ana ḡ x. *
 cucedani
 bsinthij ana ḡ viij.
 eos ḡ iij. ḡ.
 tellis despumati triplum.

PETROLEVM hoc loco accipiendum est
 arum, flauum atque liquidissima tenuitatis:
 non nigrum & crassum.

STYRACIS rubea, id est, calamita rubea:
 oc enim loco non est accipiendus cortex ille fuf-
 us & aridus, quem vocant Thymiana, atque
 male Storacem rubeam. Sed Styracis calamita
 urissima gutta quibus rufus est color.

S A L I S Hammoniæ, hodie dicunt Armo-
 niaci.

niaci est autem hic duplex. Facticius, quo utuntur Chymista, Aurifabri & Ærarij. Atq. Natiuus, qui ad medicinam recipitur. Cum autem careamus natiuo, necesse est eius loco salē gemmeum accipere. Nam hoc loco non requiritur sal hammoniacus facticius, ut puto; potest tamen tantilla eius portio tuto misceri tam numerosis simplicibus huius compositionis.

BRANCA Vrsina, hoc loco non significat eam herbā quam Germani Bernklauv vocant foliis asperis, umbella & semine Anethi, odor & sapore cimicum, radice acri & feruida: sed eam brancam quæ in Italia Vrsina vocatur, radicibus longis, Tragacantha modo mucosis.

MABATHEMATICVM, aiunt esse cauliculi siluestris succum; est autē cauliculus seu caulis agrestis id olus quod Cato & alij rei rustice scriptores apud Latinos Brassicam siluestrem vocant, cuius multa sunt species.

BALYPIAS, siue Alypum, quid sit, nondum constat: quidam interpretantur Mezereon, est, Chamelæam, sed falsò: utrumque enim seorsum peculiari capite ab auctoribus depingitur vires habet acres, & atram bilem per aluū purgandi. possumus autem eius loco accipere Erythimum, Thymbra, aut Thymum.

P.

Huius confectionis descriptionem cum non A
legitimam, sed corruptissimam, Fuchsius ex
Franciscus Alex. merito conquerantur, eam nos
sua integritati restituiimus; quamquam non
Fuchsi Myrepso deprauatissimo, ut neque
Francis. Apolline.

Alypias siue Alypum.] Eius, qua hoc nomine B
die cognoscitur, herbam affabre tibi Mathiolus
suis illis heroicis commentariis depictam exhibet.

CONFERT cephalalgicis, epilepticis, ver-
ginosis, hemicranicis, paralyti omnium mem-
brorum, & omnibus frigidis ægritudinibus,
tempore frigido nocentibus confert.

Michleta D. Nicolai.

Myrobalan. citrinorum
Chebulorum
Indorum omnium tostorum ana ʒ ij. ʒ.
Myrobal. Bellericorum
Emblicorum tostorum ana ʒ ij.
Nasturtij tosti [id est, seminis eius.] ʒ ij. ʒ.
Camini Anisi
Cniculi Ammios
Carui ana ʒ j. ʒ.
Omnia cruda terantur & macerentur in aceto
vini

vini modico xxiiij. horis, exciccentur cum in-
 sperso aceto; postea torreantur supra prunas,
 tostis addantur subsequencia.

Spodij [*id est, Eboris vsti.*]

Balaustiorum

Pulpæ Sumachij

Mastiches

Gummi Arabici

ana ʒ i, ʒ xv.

Omnia cum oleo rosato fricentur, & com-
 misceantur cum Syrupi myrtini triplo.

Proprie valet ad hæmorrhoides, & ad ven-
 tris torsionem & rugitum lyenterix, & dysen-
 terix, & optima est omni solutioni ventris.

Electarium de Baccis lauri

D. Rhafis.

℞. Fol. Rutæ siccorum

ʒ x.

Ammios

Cumini

Nigellæ

Ligustici [*id est, seminis eius.*]

Origani

Carui

• Petroselini

Amygdalorum amarorum

Piperis nigri

Piperis longi

Mentastri

Dauci

Acori

Baccarum Lauri

Castorei

ana

ʒ

ij.

Sagapeni

ʒ

ʒ

Opop

popanacis ʒ iiij.

Mellis despumati triplū [.i. lib. j. ʒ iiij. ʒ vij.]

SAGAPENV M corrupto nomine vocatur
rapinum in Pharmacopoliis.

VALET ad colicam & iliacam passionem,
doloribus intestinorum ex causa frigida vel
ventosa confert.

Diasatyrium D. Nicolai.

Testiculorum Satyrii recentium densorum

radicum Pastinacæ sativæ recentium

radicum Secacul [id est, Grietzelmoren.]

Lucis Indicæ Pincarum

istaciorum ana ʒ xij. ʒ.

Saryophyllorum

ingiberis Anisi

ruæ seminis

linguæ avis [.i. seminis fraxini.] ana ʒ v. *

ʒ xv.

Cinnamomi Caudarum Scincorum

seminis bulbi ana ʒ ij. ʒ.

Moschi ʒ vij. ʒ.

Mellis despumati optimi ℞ iiij.

SATYRION habet duas radices, unam so-
lidam, alteram flaccidam: ex his tantum su-
nenda sunt densa & solida.

SEMI-

SEMINIS Bulbi: Bulbus vulgò non est cognitus: quare eius loco urtica semè accipere lice

SCINCORVM. notandū est in primis non esse accipienda reptilia illa quadrupedia ex fossis quæ nos vocamus *Vvassermolchen*, siue *Vvasser Eydexen*; ut hætenus factitatum est. Veri autē Scinci iam denno in copia afferuntur ex Alexandria Ægypti, quos à Materialistis expetant Pharmacopola in posterum.

POLLET contra vesicæ & renum imbecillitatem; is etiam auxilio est, qui urinam reddere nequeunt; venerem stimulat, eamq. cessa de causâ cessantem, haud segnier restituit.

Diasatyrium aliud D. Mesue.

℞. Secacul albi & mundi, & elixati in decoctione cicerum, quorum prima aqua in qua decoquebantur, sit effusa ℞ j.

Telliculorum vulpis ℥ viij.

Radice Raphani ℥ iiij.

Radice Lophi plani ℥ ij.

Terantur hæ tres radices posteriores, & infundatur super eas lactis bubuli aut ouillitatum, ut lac duos digitos emineat, adiaciendū Olei sesamini

Butyri recentis non saliti ana ℥ iiij.

Coqua

Coquantur cum facilitate vsque ad cōsum-
 onem lactis, & donec omnino remollitæ
 radices, & habeant iustam spissitudinem
 pultis crassioris: nam si aqueum quod in
 & radicibus est, non consumatur, situm
 contrahit hoc medicamentum.

Postea affunde omnibus hisce prædictis
 radicibus,

Mellis despumati optimi P. vj.

Mucci Ceparum recentium P. j.

Coque omnia simul ad perfectā decoctio-
 nem, deinde ab igne depone, & insperge sub-
 sequentium specierū minutissimū puluerem.

Caudarum Scinci cum renibus & sumine ℥ j.

Seminis Erucae Zingiberis

Been albi Been rubri

Linguae auis [*id est, seminis fraxini arboris.*]

Seminis nasturtij Cinnamomi

Piperis longi Seminis Bauciae

Seminis napi

Pulpæ seminis asparagi maximè recentis ana
 ℥ iiij.

Confice cum eis: ultimò verò adiciantur sub-
 sequentia,

Pinearum mundatarum P. j.

Fisticorum [*i. Pistaciorum mundatorum*] ℥ x.

Cere-

* Cerebellorum passerum 3 ij.

Confice & misce omnia optimè, & aromatiza cum

Moschi boni 3 j.

RADICIS Raphani, videlicet sativam quam vocamus Rettich.

LUPH planū] Duplex est Luph (id est, Serpentaria) crispum scilicet & planum: Crispum folia habet diuisa & crassa. Planum verò latius & plana, vultu Aron, unde utrique nomen inditum est. Vulgò autè apud nos caremus Luph id est, vera Serpentaria: Ideò eius loco accipienda sunt radices herba quam Aron vocant.

A TESTICULI vulpis] hoc loco non sunt accipiendi testes animalis, dicti vulpes, sed radices Satyrj siue Orchios, quæ habent similitudinem testiculorum vulpium. Vnde etià nomen herba accepit. quia in re quosdam turpiter errasse sci-

NAPUS est paruum, oblongum, densum quærapum: cuius sunt species plures, Bayerrisch rublein, Stechrublein, Merseburgisch & Bonfeldisch rublein.

BAYCIA est pastinaca sativa siue Caryota, Ghelbenmoren Germani vocant.

FISTICUM siue Phisticum, idem est quod Pistachium siue Pistacium.

Testiculi vulpis hoc loco.] *Cordus* hic Or- A
 ix cū *Satyrione* cōfundit, ut ritè inquit *Fran-*
scus Alex. Quare *Orchios* dictio delenda est.

V A L E T ad erectionem virgæ, multiplicat
 erma, & desiderium coeundi.

Theriaca D. Andromachi, ex Aëtio.

Trochiscorum scylliticorum 3 xlvij.

Trochiscorum de vipera, seu Pastillorū The-
 riacorum

Trochiscorum Hedychroi Piperis nigri

Opij Thebaici recentis ana 3 xxvij.

Cosarum siccarum Scordij Gretici

eminiis Buniadis agrestis Iridis Illyricæ

Agarici albi Pontici [id est, in Ponto nati.]

Cinnamomi Succi Glycyrrhizæ sicci

Opobalsami [loco eius olei Garyophyllorum.]

ana 3 xij.

Myrrhæ Troglodyticæ

Croci Cilicij Zingiberis

Rheupontici [id est, Rhabarbari.]

Radicum Quinquefolij

Calaminthæ montanæ Marrubij comarum

Stæchadis cacuminum & foliorum

Petroselinij Macedon.

H.

Costi

114 CONFECTIONES

Costi recentis [videlicet veri, non adulterini.]

Piperis albi Piperis longi

Diſtamni Cretici Thuris masculi

Schoenanthi [id est, Iunci odorati floris.]

Terebinthinæ Chiæ [i. in Chio insula nata.]

Cassiæ fistulæ [videlicet Cassia lignea vera.]

Spicæ Nardi ana ℥ vj.

* Gentianæ radicis Polij comarum

Styracis calamitæ Seselios Massiliensis

A Abrotoni Seminis Thlaspios

Ammij Chamædryos comarum

Chamæpityos comarum

Hypocistidis succi Malobathri foliorum

Spicæ Celticæ [id est, spica Romana.]

Anisi Helladici [hoc est cognomen Anisi à regione, ubi optimum est.]

Mei Athamantici [vulgò Meu.]

Fœniculi seminis

* Sigilli Lemnij [aut eius panuria Boli Arme- (ni.)

Chalcitidis seminaſſatæ

Amomi racemi Acori radicis

Phu Põtici [accipe verũ, quod in hortis colitur.]

Carpobalsami Hyperici cacuminum

Acaciæ liquidioris Gummi vermiculati

* Cardamomi ana ℥ iiij.

Dauci Cretici Galbani puri

Opopa

popanacis

Sagapeni Persici

ruminis Iudaici [*id est, Asphalti.*]

Centaurij minoris comarum Castorij

ristolochiae tenuis ana ʒ ij.

ini veteris odorati, quantum liquoribus & gummis dissoluendis satisfecerit.

tellis despumati optimi triplum. Hoc est P xiii). ʒ vj. vt sequetur paulo post.

Confice sic: Cinnamomum Crocumq. (vt
 etius vult) vnumquodque per se terito, & si
 oles etiam Rhabarbarū & Hedychroos Tro-
 niscos: misce deinde inuicem optimè, postea
 reliquas herbas ac radices, & omnia arida si-
 militer tundito, semper similia cum suis simi-
 libus, aromata per se ac reliqua etiam per se
 corsum. Postea (vt Actiū imitari est animus)
 Crocum, Cassiam, Cinnamomū, & Lemniam
 erram in pila cum vino optimo tere atq. vni-
 o, ac reliqua omnia secundum artem addito,
 & melle despumato vniuersa excipito.

Ego verò ita præparare consueui simili ferè
 atione.

ʒ. Piper nigrum Piper album

Piper longum Iridem Illyricam

Zingiber Costum

Amomum [*aut eius succedaneum.*]

H 2

Acorum

Acorum Cardamomum Carpobalsamum
 Incidenda minutim cōcidito, & in minutissi-
 mum puluerem conterito, & per angustissi-
 mum cribrum excernito, postea in scatula di-
 ligenter, ne expiret, extructa reponito, donec
 reliquis admisceas.

Postea

R. Radices Quinquefolij Gentianam
 Meon [*aut eius succedaneum.*] Phu
 Dauci Cretici radicem [*aut eius succedaneū.*]
 Aristolochiæ tenuis radicem Rosas
 Trochiscos scylliticos Scordium
 Trochiscos de vipera
 Calamathen montanam
 Marrubij comas Stæchadis comas
 Dictamnū Creticum Schœnanthum
 Polij montani comas Abrotonum
 Chamædryos comas Chamæpityos comas
 Nardum Celticam Hyperici comas
 Centaurij minoris comas, atque
 Castorium, & semina omnia.

Concidito omnia minutim, teritoque in
 tenuissimum puluerem, & per angustissimum
 cribrum excutito. Excussum puluerem prædi-
 cto quem reposuisti adiecito, diuque donec
 perfectè commisti sint, in mortario terito, ad
 hibito

ibita diligēti cura, ne quid inter tundendum
excernendumque percat, aut temerè ponderi
decedat: mox è mortario exemptū pulverem
iterum ne expiret reponito, vsquequò omnia
conficiantur. Interea ℞ Agarici optimi albis-
simi, atque in longa rectaq. capillamenta fis-
silis, frustra electa, ab his scobē deradito ℥ ij.
sed quia non facilè per se tunditur, neq. etiam
cum aliis, proptereà quòd in pulverem vola-
tilem resolutus evanescit, ita vt multum pon-
deri eius decedat: ideò ad scobem Agarici præ-
dictam infunde optimum vinum, & fac Tro-
chiscos minutos in tepida vmbra exiccandos,
exiccatos minutissimè contundito, atque per
cribrum excernito angustissimum, excreti de-
inde Agarici cape pondus, quod requirit com-
positio, videlicet ℥ xij. & prædicto pulveri
summa diligentia commisceto: quo facto,

℞. Opium

Succum Glycyrrhizæ

Myrrham

Acaciam

Gummi

Hypocistida.

Concidito omnia in minutas partes, & mi-
stis superinfundito vini optimi quantū dissol-
uendis atque eliquandis succis satis fore con-
ieceris, exprimito, postea per rarum colū lique-

H ;

factam

factam & modicè calefactam pulticulam colato, ita ut nihil præter sordes in colo remaneat. Quòd si succi & liquores isti sordidi, & furculis foliisque pleni fuerint, ponderi eorum aliquid addendum esse facile æstimare quis potest: quod in sequentibus densatis liquoribus etiam observandum est. Deinde

℞. Galbanum

Opopanacum & Sagapenum. hæc affuso optimo vino, modeste supra prunas dissolvantur, & per rarum linteum fortiter exprimantur: his dissolutis,

℞. Thus masculum

Bitumen Iudaicum, terantur quàm minutissimè poterint, addendo Terebinthinam & sincerissimam, aut ex scobe ac sordibus expressam Styracem, dissolvantur lento admodum igne, cum mellis despumati sufficienti copia & ita calidam pulticulam postea cum reliquis calentibus misceto, & diligenter rudicula agitato, ne rursus in grumos concregant thus & bitumen, ubi refrixerint: quapropter aliqui de contusorum pulvere est admiscendum. Quòd si hoc modo dissolvere, & miscere distingas, bitumen & thus vnà cum reliquis ariditudo, & tantum Styracem atque Terebinthinam

nam dissoluito, atque melli despumato ca-
nti admisceto. his factis,

℞. Cinnamomum

Malobathrum [*aut eius succedaneum.*]

Cassiam fistulam veram

Trochiscos Hedychroi

Spicam Nardi Indicam; & simul tundito in
tenuissimum puluerem:

Postea

℞. Crocum

Rheon siue Rhaponticum, id est, quod ho-
die Rhabarbarum vocatur, & vnumquodque
seorsum tundito, deinde iis misceto

Trochiscorum Hedychroi Cinnamomi

Cassiae

Spicae Nardi

Croci & Rhei Pontici, pulueres, diligenter:

Postea

℞. Mellis optimi & aromatici, quale est Li-
thuania Dantiscum affertur, despumetur sedu-
lo, despumati postremo mellis sume ℞ xiiij.

℥ vj. ex eo modicum infunde in amplum ahe-
num ex aurichalco factum, & insperge paula-
tim commistos paulo ante Trochiscorum He-
dychroi, Cinnamomi, Cassiae, Spicae, Croci &
Rhei Pontici pulueres, alternis vicibus, mel
despumatum tepidum, atq. pulueres iniicien-

H 4

do: quae

do: quæ diligentissimè interim pistillo ligneo
agitanda sunt. Cum hæc optimè fuerint com-
mista, & floridum puniceumque colorem con-
traxerint, iniicito Lemniam terrâ antea sub-
tilissimè per se, deinde cū vino tritam, & vnâ
etiam Chalcitida assatam, quâ hoc modo assa-
bis: Accipe purissimæ Chalcitidis circiter ℥
iij. eam in fictile nō ita profundum iniectam,
supra prunas ponito, donec liquefiat & bul-
liat: deinde ab igne auferto, & abiicito id quod
in superficie durum est atq. rufescit, & ex me-
dio eius sume ℥ iij. & cum vino tritam atque
dissolutam medicamentum admisce. Postea pau-
latim etiam infundito tepesfactos liquores &
succos quos antea in vino dissoluisti, alternis
vicibus, succos, mel & reliquos pulueres, quos
primò contriuiisti iniiciens, simul etiā admisce
Syracem Terebinthinamque & Opobalsa-
mum, ita vt omnia exactissimè admisceantur,
atque sigillatim mel & pulueres commisce,
donec vniuersa vnita & in vnâ substantiam
reducta sint, assiduè agitando, ne grumi ali-
qui relinquantur, aut nodi.

Postquàm verò optimè totam cōfectionem
miscueris, indito in vas ex densa materia fa-
ctum, videlicet ex plumbo albo, quod hodie
stannum

annum appellant: oportet verò vt tertia aut
quarta pars vasis relinquatur vacua, vt effere-
scens medicamentum attollere se queat, nec
refluat. Reponendum autem est hoc medica-
mentū, donec feruescat in tepido & sicco loco:
postquā verò subsederit, in frigido & sicco lo-
co conseruandum erit. Porro ego hac ratione
parauī Theriacen: alij verò paulò aliter
conficiunt. Sed omniū pessimè faciūt qui suc-
cos & liquores & reliqua omnia simul tūdunt,
postea tūsum puluerem impuro melli inco-
quunt. Animaduertendū etiā est, ne vini plus
quàm opus sit liquoribus & succis dissoluen-
tis adfundatur. Nā si ultra modū vinū succis
addatur, situm contrahet Theriaca: propterea
iam non cōsueui Casiam, & Crocū, & Cin-
namomū vino permiscere, sed mel. nā a quo-
us est vinū nostrate: quod intelligentes qui-
ā ex recentioribus, qui de Cōpositis medica-
mentis scripserūt, iubēt pro vino accipere co-
ctū mustū. hoc est, sapā passum aut defrutum,
quibustamen non assentior. Nā hæc vina sunt
pissiora, quàm vt in eis concreti atq. densati
succī, & liquores dissolui queant. Nam eius
tantū rei gratia vinū Antidoto huic permisce-
re soliti sunt veteres, quos & nos imitabimur.

H ;

Hæc

Hac descriptio est sumpta ex Aëtio: paulo post ponetur ea quam transtuli ex Græco carmine Andromachi senioris.

VIPERAE serpentes sunt in Italia: inde etiam facti ex eis Trochisci petendi sunt.

TROCHISCI Hedychroi, inferius in Trochiscis describentur.

PIPERIS nigri. Andromachus senior qui inuentor est huius compositionis, hoc loco habet

PIPER longum, in Carmine Elegiaco Græco

SCORDII Cretici. Optimum Scordium nascitur in Creta insula: nos interim nostratam utamur, satis efficaci. Porro verum Scordium herba est Chamadry similis, odore aliquo allij & nullo modo allium siluestre, ut hactenus magno errore crediderunt: nascitur in Saxonia quemadmodum & circa Nurembergam.

BVNIAS, id est, Napius: quid verò sit Napius dictum est in Diasatyrio Mesuae & antea etiam

MYRRHAE Troglodytica. Troglodyta populi sunt Arabibus vicini: apud quos optimi nascitur Myrrha.

OPOBALSAMO vero caremus, ideoque eius loco accipiendum est succedaneum aliquod veluti est oleum Garyophyllorum.

CROCI Cilicij, id est, in Cilicia Asia regio

venat.

nati. & idem est quod Crocus Orientalis.

R H A P O N T I C U M hoc loco significat habarbarum. nam magna illa radix quã habet Rhaponticum vocant, falsò hoc nomẽ habet.

C O M A E sunt folia & flores plantarum.

P I P E R I S longi. Andromachus senior hoc habet P I P E R nigrum: Iunior verò Andromachus, id est, Senioris filius, ordinem nigri & longi piperis innertit, quem in hac compositione sequimur: paulo post etiam Senioris Theiacen adscripturi.

D I C T A M N U S Creticus folia habet alba, anugine obducta, gustu acris ut Thymus: affertur rursum ex Creta insula ad nos.

C A S I A fistula hoc loco significat Casiam ligneam veram, qua iam iterum affertur, estq; Cinnamomo similis.

P O L I U M montanum duplex est: unũ pluribus surculis fruticosum, ac humi sparsum; alterum candidius & rectius se attollens. Maius nascitur apud nos: minus affertur ex monte Pessulano, & ha sunt veri Põlij species, & totam hiemem virent, ut Lauendula aut Thymus. Vulgò non habuerunt verum Polium Pharmacopola usque ad hoc tempus.

S T Y R A X, id est, Storax calamita: accipienda au-

da autem est hoc loco purissima eius resina
micas concreta.

SESELI, id est, Sileris montani. dicitur au-
tem Massiliense, à prouincia Massiliensi, in qua
prouenit optimum.

THLASPI est species agrestis Nasturti,
qua passim nascitur secus vias, semine rufo. sa-
pore acri & glutinoso: quod ut habeant diligen-
ter curent Pharmacopola. vocatur Germanice
Voegecressen.

CHAMAEPITYS vera est Iua: herba est
tenuibus foliis, floribus paruis & luteis: nasci-
tur copiosè ad Rhenum in Franconia in vineis
& agris quiescentibus, praesertim Spira, Vvor-
macia, & Vvurtzburgi, & aliis locis.

MALOBATHRVM est foliū Indū, cuius
succedaneū est Spica tam Indica, quàm Celtica.

MEV, seu potius Meum non habemus: loco
eius sumimus Sefeli Creticū, id est, Beruvurtz,
aut potius Sison hoc loco: inferius enim sequitur
Daucus Creticus.

SIGILLVM Lemnium, id est, terra Sigil-
lata, qua signatur in Lemno insula, in qua cffo-
ditur hec terra, in cuius defectu sumatur bolus
Armenus Leuanticus.

CHALCITIS hodie non à quouis cognosci-
tur:

est autem vitrioli nativi species. hac qui ca-
 t, accipere possant vitriolū viride optimum;
 ile est Goslarianum in Saxonia. Porro An-
 machus mihi videtur Chalcitida Theriaca
 cuisse, nigri coloris gratia: qui color ab omni-
 in Theriaca requiritur sine aliqua ratione.
 hi itaque videtur non necessariò eam addi.
 am horribili & aruginoso sapore totam com-
 itionem inficit. At cum ego aliquando in
 eriacæ compositionē non adiecissem Chalciti-
 sapore gratiorē acquisivit hoc medicamentū.
 nsulantur igitur hac de re Doctores Medici.
 A M O M O vero caremus: eius loco accipimus
 rpesium aut Acorum verum, id est, nostrum
 laxum aromaticum.

A C O R V S verus, est illa radix quam hodie
 sò vocant Calamum aromaticum.

A C A C I A, succus est fructus ex arbore, è qua
 illat gummi Arabicum, loco eius accipimus
 uestrium Prunellorum succum inspissatum.

G V M M I vermiculati, id est, Arabici gum-
 , quod concretū est in grumos vermiū figura.

D A V O I Cretici vice accipere licet Seseli Cre-
 ū, id est Beruvurtz, videlicet radicem eius.

S A G A P E N V M hodie vocant Serapi-
 m, quod in Perside optimum provenit: Senior
 Andro-

Andromachus Sagapeni habet 3 iiij.

Iunior verò tantum 3 ij.

ARISTOLOCHIA tenuis, id est, Aristolochia nostra longa vulgaris.

P. C. SCHOL.

A Abrotoni.] hanc dictionem, in Aëtio à Corneliano verso, non reperio.

B Rhaponticum.] Idipsum à Rhabarbaro differre alibi diximus. Radix autem illa magna qua Rhapontici nomine in officinis passim prodest, Centaurium magnum Dioscoridis est.

Chalcitis.] Chalcitida commodè ac necessario semper Theriaca immiscenda esse, unà cum L. Fuchsi, & Franc. Apolline censesmus. Simulque somniū esse, aruginosum & horridum eius saporem in Theriaca præ ceteris persentiri, ut imaginantur nonnulli, scimus & dicimus. rationibus autē hac aliāq; quæ scholiis profero confirmare compendij egestas cum nō permittat, in nostrum opus, si fauerint Superi, ea omnia asseruatur.

Theriaca in omnibus antidotis ob multiplicem vsum potiores partes obtinet. Est enim famosa & salubris cōtra genera ægritudinū plurima, valet enim ad grauissimas passiones totius corporis humani: Epilepticis, catalepticis, apoplecticis, cephalalgicis, stomachicis, hemiplegicis.

cranicis prodest. Ad raucedinem vocis, & contractionē pectoris optima est: arteriacis, inflammaticis, hæmoptoicis, ictericis, hydropicis, pncipue pneumonicis; iliosis, & vñlnera in intestinis habentibus. Nephriticis, calculosis & colicis subuenit: mēstrua educit, & fœtū mortuum expellit: lepras, & variolas, & frigus periodicum, & cæteras passiones inueteratas emēdat. præcipuè contra omnia venena & serpentium morsus & reptilium valet. Sed diuersa est eius vis pro quantitate & qualitate vniuscuiusq. passionis. Omnem defectionem sensuū releuat. Cor, cerebrū, hepar, stomachū confortat, & vñlnerum corpus incorruptum ducit & custodit.

Theriaca Andromachi Senioris, è carmine eiusdem elegiaco translata.

. Trochiscorum Scylliticorum ℥ xlvij.
Trochiscorum Theriacorum Piperis longi
liquoris Papauerini [*id est, Opij.*]
Magmatis Hedychroi ana ℥ xxiiij.
Oliorum Rosarum siccarum
Indis Illyricæ [*id est, Ircos.*]
cyanæ Glycyrrhizæ
seminis Buniadis [*id est, Napi, vulgò Beyerische rublein*]

Scordij

Scordij (lorum.
 Liqueoris Balsami [loco cuius oleū Garyophyl
 Cinnamomi Agarici ana ʒ ii
 Myrrhæ Costi Croci Coricij
 Casiæ [id est, Casia lignea vera, aut succedanei
 Nardi Indicæ (eius.
 Iunci Arabici [id est, Schœnanthi.
 Thuris [videlicet masculi & electi]
 Piperis candidi Piperis nigri
 Comarum Dictamni [id est, foliorum & flo
 rum Dictamni Cretici veri.]
 Marrubij
 Rhei [.i. quod hodie vocatur Rhabarbarum.
 Stœchadis
 Petroselinii [id est, seminis eius.]
 Calaminthæ [.i. Calaminthi montani tenuifo
 Lachrymæ terebinthi Libystiadis (lij.
 Zingiberis
 Quinque folij [.i. radicum eius.] ana ʒ vi
 Polij [videlicet montani & albi, quod è Lugdu
 no affertur.]
 Chamæpityos
 Styracis [.i. Styracis calamita sincera & electa.
 Mei [quod vulgò Meu vocatur.]
 Amomi racemosi [aut succedanei eius vt su
 Nardi Galaticæ [id est, Celtica.] (præ.
 Rubri

lubricæ Lemniæ [*id est, terra sigillata vera,*
aut Boli Armeni, *ut supra.*]

nu Pontici

hamedryadis Creticæ [*.i. Chamadryos vera.*]

oliorū Malobathri [*eius loco ponatur Macis.*]

halcitidis tostæ

adiciis Gentiadis [*id est, Gentiana.*]

nisi

Succi Hypocistidis

uctus Balsami [*id est, Carpobalsami, pro quo*

etiam succedaneum sumatur, sicut supra fa-
cta est mentio.]

ummi splendidi

Seminis fœniculi

ardamomi Indici [*id est, minoris.*]

eselios tenuis

Lachrymæ nigræ spinæ

halasprios

Hyperici

Ammios

agapeni

ana

3

iiij.

astorei

Aristolochiæ tenuis

seminis Dauci

Bituminis

liquoris panacis [*id est, Opopanacis.*]

centaurij. [*videlicet minoris.*]

halbanidis pinguis [*id est, Galbani recentis*

& puri.]

ana

3

ij.

onfice cum vino & melle. Hactenus An-

dromachus.

ini autem tantum accipias, quantū liquori-

us & succis dissoluendis satis fore conieccheris,

I

vt

ut proximè dictum est. Mellis verò optimi
accipe ꝑ xiiij. ꝑ iiij. ita detrahis Mellis ꝑ iiij.
de priori Theriaca, quia huic defunt Abroto-
ni & Acori ana. ꝑ iiij.

Confice autē & hāc Theriacā ut proximam
Andromachus Neronis medicus, primū e-
didit medicamentū hoc, eiꝯ declarationē heroi-
cis carminibus descriptā nuncupavit. Sed Gale-
nus mutata forma, cōpositionē reddidit meliorē

TROCHISCI Theriaci, sunt Trochisci de
vipera siue de Thiro, ut hodie vocant.

MAGMA hedychroi. i. Trochisci hedychroi
quos *Auicenna* vocat *Alinda rācaron*: quorū
compositionē in tractatū de Trochiscis inquire

CYANEAE, id est, Carulea vel nigra Gly-
cyrrhiza, seu, ut hodie vocant, Liquiritia, quā
nigrum colorem habet. Intelligit autem *Andro-*
machus succum Glycyrrhizae.

CROCVS Coricius, id est, in Corico Sicili-
monte nati, hoc est, Croci Orientalis.

LACHRYMAE Terebinthi Libyftiadis.
Resina Terebinthina Libyca, in Libya Aphrica
regione nata. eius loco nos accipere possumus La-
ricis resinam, qua ubique in Germania Tere-
binthina improprie vocatur.

MEI loco, quo caremus, possumus accipere
Sesel

Seseli Creticum, id est, Beruvurtz, aut semen
grum & odoratum, quod hodie vocant impro-
prie Amomum, veteres autem Sison.

PHV Ponticum, non est Valeriana vulgaris,
sed ea herba que in Hestia vocatur Theriac-
raut, vel Gartenseliunck.

MALOBATHRVM nō habemus: eius loco
accipe Spica Romana radículas, vel Spica Ro-
mana & Macis ana partes aequales, vt Arabes
recipiunt, vel Casiam ligneam veram.

RADICIS Gentiadis, id est, Gentiana, à
Gentio Illyrici rege sic appellata, qui eam pri-
mū inuenisse creditur.

GUMMI splendidi, i. mundi, sinceri & trans-
lucidi, videlicet Gummi Arabici cognominati.

NIGRA vel carulea spina, est arbor qua
aliās dicitur spina Ægyptia: ex qua manat
Gummi Arabicū. Per lachrymā verò etiam Andro-
nachus intelligit succum eius, qui Acacia vo-
catur, & fit ex fructu siliquacis huius spinae eius.
Hoc accipimus succum Prunellorum agrestium.

SESELI tenue, est Seseli Creticum, quod ex
manibus speciebus Seselios minimum & tenuis-
simum est. Germanicè vocatur Beruvurtz. po-
test tamen etiam vulgare intelligi.

DAUCVS, id est, Daucus Creticus. hoc loco

eius vice accipe semen Pimpinella nostratis, aut
radices Seselios Cretici: nihil enim refert, quod
his accipiatur in hac compositione, est autē Seseli
Creticū, quod Germanicē vocatur Beruvurtz.

ARISTOLOCHIA tenuis, est illa quae
apud nos nascitur, longa cognomento, cuius ra-
dices gracilitate sua & longitudine imitantur
sarmenta vitium.

Theriaca Diatessaron D. Mesuae.

℞. Gentianæ Baccarum lauri Myrrhae
Aristolochiae rotundae ana ℥ ij.
Mellis despumati optimi ℞ ij. id est, ℥ xxiiij.

DIATESSARON, hoc est, ex quatuor
simplicibus composita.

ARISTOLOCHIA rotunda, non est illa
radix quam nos Holuvurtz vocamus: sed alia
multo maior & tuberosa, intus solida, colore
buxi flauo, odore & sapore similis Aristolochia
longae nostrati. Affertur ex Italia & Heluetia.

THERIACA antidotus Diatessaron ad
affectus frigidos, tum cerebri, ut epilepsiam,
paralysem, spasmus cynicum: tum ventri-
culi, ut inflationem, & ab ea dolorem, tardam
coctionem: tum denique hepatis, ut hydro-
pem, cachexiam, obstructionem. Præterea
mor-

orsui Scorpionis, & potioni veneni conferr.

Hybridatum ex Damocratis Græco carmine in Latinam linguam translatum.

Myrrhæ Arabicæ Troglodytidis

roci Agarici Zingiberis

cinnamomi Spicæ Nardī

huris [videlicet electi.]

hlaſprios ana ʒ x.

eselios

Opobalsami [aut oleum Garyophyllorum.]

chœni [id est, Squinanthi, ut hodie vocant.]

cœchadis Terebinthinæ Chalbanae

Costi [videlicet veri & aromatici]

ipetis longi Castorei Pontici

ucci Hypotistidis Syracis bonæ

Opopanacis

olij Malebathi recētis [aut succedanei eius]

ana ʒ viij.

Cassia nigræ [lignea aut succedanei eius.]

olij Piperis albi Scordij

seminis Dauci Cretici

roctus Balsami [aut succedanei eius.]

Cypheos

Idellij ana ʒ vij.

Nardi Celticæ purgatæ Gummi

I ʒ Petro-

Petroselini [*id est, seminis eius.*]

Opii papaueracei

Cardamomi

Seminis Fœniculi

Gentianæ

Foliorum Rosarum

Dictamni Cretici ana ꝓ v. boni ponderis.

Anisi

Arij

Acori [*sine Galami aromatici.*]

Phu

Sagapeni ana ꝓ iij.

Mei Athamantici

Acaciæ

Ventris Scinci [*videlicet veri.*]

Fructus Hyperici [*id est, summitatum eius.*]

ana ꝓ ij.

Vini quantum sufficit

Mellis mensuram convenientem.

VINI quantum sufficit, id est, quantum satis est succis & liquoribus dissoluendis.

MELLIS mensurā convenientē. in Græco est *εὐπυρεξ*, quod idem significat. sint autē mellis optimi odorati & despumati ℥ ix. ꝓ viij. ꝓ ij.

CYPHI sunt Trochisci qui ad odorem suffiuntur. eius compositio habetur in tractatu de Trochiscis.

NARDVS Celtica, est Spica Romana. Pur-gata id est, à paleis, terra & sordibus mundata. Radices eius tantum debent accipi.

ARI, in Græco est *ἄρι*, id est, *ἄριον*, quod nomen

men apud nullū alium auctore in Mithrida-
o scriptū inuenitur. Intelligit autē Democra-
s per Arion, siue Arium, Aron, id est, Arum,
quantum ego ratiocinari possum: nam Aron
regiam facit contra venenata medicinam.

ACACIA vera caremus: accipe ergo loco eius
succū Prunellorū siluestrium; diligenter spissa-
um, aut aliū quendā, quē Doctores substituent.
Nos inferius ponemus Acaciam succedaneam.

P. C. SCHOL.

Ari.] Asari potius legendum esse, ex Græcis
nonnullis exemplaribus, existimo.

MITHRIDATICVM proximum est
in qualitate & virtute Theriacæ, & parum dif-
ferant: nisi fortē quod Theriaca est parum ca-
lidior & potentior contra venena serpentum.
Curat omnes passionēs capitis virorū vel mu-
lierū, si fuerint ex frigidityte, & maximē me-
lancholicis & timidis, epilepticis & hemicra-
nicis confert, & dolorē supercilij patientibus,
& lachrymaribus oculis, & ad omnia capitis
vitia vel aurium subuenit. Dentium dolori-
bus & palato, & omnibus viriis oris & maxilla-
rum medetur, si super locū dolentem ponatur,
& itidem ad modū emplastri ponatur in tem-
poribus, vnde fit discursio. Synanchen soluit.

I 4

Apo-

Apoplecticis, tussientibus, asthmaticis, hæmoptoicis, peripneumonicis, & omnibus doloribus qui intra corpus humanū fiunt, succurrit: Iliacis, dysentericis, & lientericis cōfert, si datur cū decoctione balaustiorū. Extensionē humerorū, tetanos siue spasmos patientes, & paralyticos sine mora sanat: Diaphragmati & hypochondriis subuenit. Renibus & vesicæ opitulatur. Calculos frangit. Menstrua prouocat, * omniaq. viria matricis excludit: Arthriticam atq. Ischiasim patientibus, & podagricis singulare præfidiū est. Præcipuè datur contra venena omnia. Venenatos morsus siue rabidi canis, seu cuiuscunq. reptilis impositū siue bibitum, cū magna admiratione emēdat. Quotidianariis & quartanariis etiā ante horā accessionis cum vino tepido datū mirificè prodest.

Mithridatium aliud, vt ex Cleopatro & Antipatro, Galenus & Aëtius exscripserunt.

℞. Myrrhæ	3	vij.	β.	∞	iiij.
Nardi tantundem.					
Croci	3	vij.	∞		iiij.
Opij	3	iiij.	∞		ij. β.
Styracis	3	v.			

Cinna

namomi 3 vij. s. iij.
 corei 3 vj. s. j.
 ij 3 vj. s. iij.
 ardij 3 vij. s. iij.
 giberis tantundem.
 sti 3 vj. s. iij.
 meris albi 3 v. s. ij.
 meris longi 3 vj. s. iij.
 elios 3 v. s. ij.
 rotoni tantundem
 troselini [*videlicet seminis.*] 3 iij.
 luci seminis 3 vj. s. iij.
 hæ 3 v. s. iij.
 auris 3 vj. s. ij.
 cci Hypocistidis 3 vj. s. ij. β.
 ardi Gallicæ 3 iij.
 eniculi seminis 3 iij.
 ardi Indicæ 3 iij. A
 ori [*aut Calami aromatici.*]
 u Pontici Sagapeni
 uctus balsami [*aut succedanei eius.*]
 yperici
 idis Illyricæ [*id est, Ireos.*] ana 3 ij.
 ubricæ Lemniæ [*loco eius Bolus lenanticus.*]
 umborum Scinci [*videlicet veri.*] (3 vj.
 ypheos, ana tantundem, i. 3 vj.
 I s Acaciæ

Acaciæ Gummi Cardamomi

Pelecini ana ℥ ij.

Thlaspios ℥ vj. ℥ iiij.

Gentianæ ℥ iiij.

Anisi ℥ iiij.

Rosarum siccarum ℥ iiij.

Mei Athamantici tantundem

Schoeni [id est, Squinanthi.] ℥ vj. ℥ iiij.

Opopanacis ℥ vj.

Galbani ℥ vj. ℥ iiij.

Opobalsami tantundem [cuius loco, ut supra
oleum Garyophyllorum.]

Aristolochiæ [videlicet rotunda vera.] ℥ ij.

Hyssopi ℥ iiij.

Marrubij ℥ j.

Chamæpityos ℥ iiij.

Libanotidis ℥ v.

Terebinthinæ ℥ vj. ℥ iiij.

Mellis Attici quod sufficit. (tipater)

Vinū ne addas. Haftenus Cleopantus & An.

Mellis autē despumati optimi & odorati su-
me ad totam confectiōē ℥ vj. ℥ vj. ℥ vj.
vinū ne addatur præcepit Cleopantus, idē
in aceto sunt dissoluendi liquores concreti, ut
Sagapenum, Opopanax & Galbanum : Con-
fice secundum artem.

MEL-

VELLIS Attici nobis copia non fit: ideoque
id, quod optimam fuerit, recipiendum erit.

Compositio hac est valde mendosa in ponde-
re apud Aëtium, apud Galenum verò est
mendatior. Rursum simplicium numero aliqua
sunt apud Galenum, quae ex Aëtio confectioni
hic restitui. Aëtius hunc Auctorem vocat Cleo-
phantem, Galenus verò Cleophantem.

Hic character significat obolum: est au-
tem obolus pondus γ β . scrupuli videlicet dimi-
nium: itaque vi. oboli faciunt γ i.

NARDVS Indica hoc loco non significat Spi-
rum nardi Indicam, sed Malobathrum, id est,
Indum, quod nardi est species, & in In-
dia gignitur. Aëtius propterea hoc loco pro
Indica habet Phyllon, id est folium In-
dum, cuius loco accipe Casiam ligneam veram,
quae Cinnamomo est similis, aut Macis & radi-
cem Spicae Romanae ana γ ij.

ACORI, id est, radice quae nunc improprie
vocatur Calamus aromaticus.

PELECINI, seminis eius: in eius panuria
accipe semen Nigellae agrestis & cornuta: est au-
tem omnino similis vera Nigellae nascitur in agris.

LIBANOTIS hic non significat Rosmari-
num, sed Angelicam siluestrem minorem. Nam
plures

plures sunt Libanotidis species. Semen autē eius accipi debet, quod Cachrys vocatur.

P. C. SCHOL.

A Nardi Indicæ.] Galenus & Aëtius hic non Nardi Indica, sed Fol. Malobathri legunt.

Mithridatium D. Andromachi.

R. Glycyrrhizæ	℥	vij.	℞	℥	iiij.
Opij	℥	iiij.	℞	℥	ij.
Castorei	℥	vj.			
Polij	℥	v.	℞	℥	ij.
Costi	℥	v.	℞	℥	ij.
Nardi spicæ	℥	vj.	℞	℥	ij.
Cassiæ [videlicet vera.]	℥	v.	℞	℥	ij.
Thuris	℥	vj.			
Seselios	℥	v.	℞	℥	ij.
Succi Hypocistidis	℥	vj.			
Acori [id est, Calami aromatici.]	℥	ij.			
Scordij [videlicet veri.]	℥	vj.	℞	℥	ij.
Folij [loco eius sumatur Macis.]	℥	iiij.			
Gallij	℥	v.	℞	℥	iiij.
Oypheos	℥	vj.	℞	℥	ij.
Myrrhæ	℥	vj.			
Croci	℥	vij.	℞	℥	ij.
Cinnamomi	℥	vij.	℞	℥	ij.
* Styracis [videlicet optima.]	℥	v.	℞	℥	iiij.
					Dauci

Nucis seminis 3 vj. s. iij.
 Angiberis. 3 vij. s. ij.
 Au Pontici 3 ij.
 Troscelini [*videlicet seminis.*] 3 iij. s. iij.
 Cardii Gallicæ 3 iij.
 Ceniculi seminis 3 iij.
 Cardii Indicæ 3 iij.
 Hyperici 3 ij.
 Caciae 3 ij.
 Mentianæ 3 iij.
 Nisi 3 iij.
 Hlaspios 3 vj. s. iij.
 Cici Athamantici 3 iij.
 Rosarum siccarum 3 iij.
 Gummi [*videlicet Arabici.*] 3 ij.
 Cardamomi 3 iij.
 Chœni [*id est, Squinanthi.*] 3 vj. s. ij.
 Popanacis 3 vi. s. ij.
 Pobalsami [*sive olei Garyophyllorum.*] 3 vj.
 s. iij.
 Galbani 3 vij.
 Cinci [*videlicet veri.*] 3 ij. s. ij.
 Cerebinthinæ 3 vj. s. ij.
 Vinii Chij quod sufficit.
 Mellis Attici cocti quod sufficit, hoc est, l. vj.
 3 iij. 3 ij.

FOLIUM

FOLIUM duas res significat: folium Nardi
videlicet, aut Malobathrum, quod hic recipien-
dum est.

GALLION herba est multis minimis
floribus, luteis & odoratis. est autem speciei
Aspergula: Germanicè vocatur Ranritzen.

NARDVS Indica hoc loco nō significat Ma-
lobathrum, id est, folium; sed radicem Indici
nardi: nam nardi partes tres olim in usu fue-
runt, videlicet radix, folium & spica. antea ve-
rò praecepit in hanc compositionem sumenda
esse Spicam nardi, & Folium, id est, Maloba-
thrum. idèò necessariò hoc loco per Indicam nar-
dum intelligit radicem Indici nardi.

Esdra antidotus ex Aërio.

Rx. Amomi	℥ xij.
Florū iurci odorati [id est, florum Schoenanthi earū loco sume summitates Schoenanthi.]	℥ ix.
Pyrethri	℥ vj.
Croci	℥ xxxvj.
Cinnamomi	℥ vj.
Myrrhæ troglodyticae	℥ xij.
Styracis calamitæ	℥ xvij.
Petroselinī	℥ iij.
Seminis Dauci	℥ iij.
	Traga-

gacanthæ	Θ vi.
ci Hypocistidis	Θ ix.
lis Illyricæ [<i>id est, Ireos.</i>]	Θ xv.
minis fœniculi	Θ vj.
bellij	Θ ix.
turis	Θ i.
phuris viui	Θ vj.
minis Hyoscyami albi	Θ xxvij.
fiæ lignæ [<i>aut succedanei eius.</i>]	Θ ix.
minis papaueris	Θ xxx.
icæ Nardi	Θ xij.
minis Rutæ	Θ iij.
minis Ocimi	Θ iij.
nois Culinarij	Θ lv.
minis Anethi	Θ vj.
fari [<i>id est, radicum eius.</i>]	Θ i.
minis Cardamomi	Θ vj.
pij	Θ xxvij.
phorbij	Θ vj.
iperis nigri	Θ xxx.
osarum siccarum	Θ ix.
hylli [<i>id est, Folij.</i>]	Θ xij.
pobalsanii [<i>sive olei Garyophyllorum.</i>]	Θ xxiiij.
entris mergi	Θ vj.
accæ	Θ xij.
	Lycij

Lycij Indici	⊖ xij.
Garyophylli	⊖ xij.
Stercoris reperti in aluo mergi	⊖ vj.
Rheu Pontici [.i. <i>Rhabarbari.</i>]	⊖ xij.
Mei Athamantici	⊖ vj.
Floris Nerij	⊖ iiij. <i>℥</i>
Terræ Cimoliæ	⊖ xij.
Succi Artemisiæ	⊖ xx.
Foliorum Seridis [.i. <i>Cichorea.</i>]	⊖ ix.
Spicæ Celticæ	⊖ xij.
Castorei	⊖ iiij.
Costi	⊖ xij.
Gentianæ	⊖ xij.
Confectionis Hedychroi	⊖ ix.
Anisi	⊖ vj.
Sisonis	⊖ xviiij.
Thymiamatis ammoniaci	⊖ xij.
Foliorum citri	⊖ xij.

Vini veteris odorati quantū satis fuerit succis & liquoribus resoluendis. Mellis despumati optimi, vt Aëtius scribit interpretare Cornario, libras v. aut vj. Sed nos singulis specierum vnciis ternas vncias mellis adiiciemus. itaque sume mellis despumati odorati quàm optimi ℥ vj. ℥ vij. ℥ ij. *℥*

Adida omnia minutissimè contundito.

Opium

ium verò & Myrrham, Hypocistidē, Bdel-
 n, Lycium, Ammoniacum in vino dissol-
 o. Tragacantham deinde seorsum per se
 o vino dissoluto. Deinde omnia simul
 ceto, addendo etiam despumatum Arte-
 siæ succum. In vniuersum hanc confectio-
 nem eodem modo conficies, quo Theriacam,
 eodem modo dimittenda est vt efferuescat,
 in omnino repleto vase.

NICOLAUS Alexandrinus duas habet Esdra
 positiones, alteram Magna, alteram verò
 spaniensis cognomento: sed quia confusa &
 digesta tantum sunt moles, & numerosis,
 nulla harmonia coeuntibus simplicibus con-
 t, ideo nolimus eas hic ascribere, his duabus
 receptis paulò exactius compositis contenti.
 RHODIS Culinarij, id est, Sumach, videlicet
 alpa eius sine osseis seminibus.

PHYLLI, id est, Folij, cuius loco pene Spica
 mana, Macis ana Ḑ vj .

TERRA Cimolia, eius loco accipe Bolum
 rum praparatum.

SISON est semen illud nigrum quod apio si-
 le est, & vocatur improprie Amomi semen.

THYMIAMA Hammoniacum, i. Gummi
 ammoniacum, quod vocant Ammoniacum.

K

VEN-

VENTRIS Mergi, id est, Stomachi au-
Mergi. Germanicè vocatur ein Taxcher.

NERION. i. arbor Oleander, pro cuius flo-
ribus accipe radices Vincetoxici. Legitur etiam
in Aëtio rosarū Rhododaphnis; sed idē est quo
flos Nerij: idē alterū tantū eorum posuimus.

Mirificè contra lethalia venena prodes-
aliosq. vsus multos habet, quos apud Aëtium li-
bro 13. cap. 101. Paulum libro 7. cap. 11
Actuar. in libro De composit. medica. reperie-

Esdra Antidotus ex Actuario.

Rx. Mameæ	℥	j.
Amomi [eius loco sumas nostrum Calamum aromaticum.]	℥	ij.
Iunci odorati [id est, Squinanthi.]	℥	℞.
Pyrethri	℥	vii.
Croci	℥	j.
Myrrhæ	℥	iiij.
* Styracis	℥	℞. ℥ ij.
Petroselinij	℥	iiij.
Tragacanthæ	℥	j.
Succi Hypocistidis	℥	iiij.
Ireos	℥	℞. ℥ ij.
Seminis fœniculi	℥	j.
Folij [aut succedanei eius.]	℥	iiij.
		Radic

Radices Ponticæ [*id est, Rhabarbari.*]

Colarum siccarum Glycyrrhizæ

Malorum siluestris Punica

Cinnamomi ana ℥ iiij.

Cardi Celricæ ℥ j.

Mellis despumati ℞ vi. ℥ ix. ℥ viij.

Myrrham & Hypocistidem in vino dissolue modico; Tragacantham verò per se etiam dissolue, & confice secundum artem. Actuarius monet absurdum conficiendi modum, quem non sequimur.

Mamera loco sume Doronicum Romanum.

Malorum siluestris Punica, i. florū Balaustiorum,

C O N D I T A.

Caro Citri Cortices Citri Flores Citri

Arantia integra Cortices Arantiorum

Flores Arantiorum Limones

Limones cōditi frequēter pro Chebulis cōditis vendūtur. Sed facile deprehenditur dolus. Nam chebuli unū tantū magnum & lignosum habent nucleum: Limones verò multa semina, &c.

Chebuli Myrobalani Bellerici Myrobalani

Emblici Myrobalani Citrini Myrobalani

Indi Myrobalani

K 2

Omnes

Omnes quinque Myrobalanorum species in
afferuntur ex India condita. (11)

Nuces moschatę integrę vt ex India afferu

Iuglandes Citonia Mespyla

Pyra moschatella Cerasa

Pruna siluestria Garyophylli

Piper in racemis vt ex India affertur.

Calamus aromaticus [id est, verus Acorus

Galanga Zingiber Enula campan

Secacul [id est, Sifer: Germanicè Gritzeln
ren, Clingelmoren.]

Eringium

Pimpinella [nostra.]

Crethami [agrestis radix.]

CRETHAMVS agrestis herba est Erin
propemodũ foliis: Germanicè vocatur Sichel
ren & Sichelkraut: nascitur in agris pingui

Omnia diligenter Saccharo clarificato co
diantur secundum artem.

CONSERVÆ.

Anthos [id est, flos Rosmarini.]

Boraginis Buglossi

Cichorij Fumi terrę Lauendulę

Maioranę Melissę Menthę

Nyr

Nymphææ seu Nenupharis

Primulæ veris. *Primula veris, idem est quod herba paralyfis.*

Boraginarum

Pæoniæ

Violarum

Cardui benedicti

Malviorum conuallium

Florum tilia

Euphrasiæ

Sambuci

Hyssopti

Acetosæ

Betonicæ

Scabiosæ

Salviæ

Flores minutissimè incidantur, & singulis libris florum addantur Sacchari albissimi libræ duæ, videlicet qui humidi & mucilaginosi fuerint, vt Boraginis, Buglossi, &c. Siccioribus verò, quales sunt Anthos, Lauendulæ, Maioranæ, Melissæ, Salviæ, Mèthæ & similibus, addantur Sacchari albissimi libræ duæ & semis.

Diacitonium simplex.

℞. Carnium Citoniorum vapore aquæ dulcis coctorum, & ad spissitudinem coctorum.

Sacchari albissimi despumati, & ad spissitudinem iustam cocti ana ℥ viij.

Coquantur ad solidam consistentiam, & extendantur in tabulam feruens massa, refrigerata in partes incidatur. Quidam octo ℥ carniū Citoniorum, addunt sex ℥ Sacchari clarificati.

K

;

Poteris

Poteris etiam ita facere.

℞. Citoniorum excorticatorum & ab interioribus mundatorum ℥ viij. Sacchari clarificati ℥ iiij. Coque Citonia super vaporem aquae dulcis: deinde vnā cum Saccharo ad iustam spissitudinem coque.

Peculiare remediū est fluxus, vel vomitus quoniam sipticat & corroborat membra collapsa, debilia. Confortat stomachū, virtutem retentiuam & digestiuam: & summo opere excitat gustum. Sed ad fluxum datur ante cibum, & ad vomitum compescendum post cibum.

Diacitonium compositum D. Nicolai.

℞. Carnium Citoniorum comminutarum & coctura inspissatarum ℥ iiij.

Mellis despumati ℥ iiij.

Coquantur simul ad iustam consistentiam, & postquam ab igne deposueris antequam refrigerentur, insperge subsequentes species in tenuissimum puluerem contritas:

Cinnamomi ℥ j. β.

Zingiberis ℥ j.

Piperis

Galangæ ana ℥ β.

Garyophyllorum

Nucis

ancis moschatae ana ʒ iij.

icae Nardi

gni aloës

Macis

ardamomi

ana ʒ ij.

edoariae

ʒ j.

Extendatur tota massa in tabula marmorea
ius rosacea aqua inuncta, in qua aliquid
loschi dissolutum fuerit.

Et quando ut alium soluat conficere volueris,
antequam in tabula marmorea extendatur,
in vnamquamque lib. adde Scammoneæ
ß. quæ bene trita subigatur composito.

M E L habet Nicolaus, ego potius consulerem
ut Saccharum loco mellis adderetur.

Quadam exemplaria habent Mellis lib. iij.
Ned Nicolai exemplar, quod ad meas manus per-
uenit, habet lib. iij. Nam necesse est etiam, ut
species suum conseruatium habeant.

Hoc est calidius & melius ad ea quæ diximus,
resoluit vëtositates, remouet fœtorë corporis,
restituit pristinū colorem & magis restaurat.

Diacitonium è succo Citoniorum.

Re. Succu Citoniorum despumati ʒ xij.

Mellis optimi despumati

Sacchari albisimi clarificati ana ʒ ij.

masibet

K 4

Coquan-

Coquantur simul ad iustam spissitudinem:
deinde ab igne remotis & adhuc tepentibus
insperge subsequantium specierum pulveres
minutissimè tritos, & per cribrum excussos.

℞. Cinnamomi

Nucis moschatæ ana ℥ iiij.

Garyophyllorum Zingiberis

Galangæ ana ℥ ij.

Radicularum nardi Celticæ

Piperis nigri Ligni aloës

Macis Zedoariæ Cubebarum

Cardamomi ana ℥ j.

Confice secundum artem.

S Y R U P I.

Syrupus de Duabus radicibus.

℞. Radicum Petroselini

Radicum Fœniculi ana ℥ iiij.

Aquæ quantum sufficit

Sacchari clarificati ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

* VISCERA obstructione laborantia reseruat.

Syrupus de Quinque radicibus.

℞. Radicum Apij Radicum Fœniculi

Radicum Petroselini Radicum Rutæ

Radicum

Radicum Asparagi ana ℥ iiij. A

Aquæ quantum sufficit.

Sacchari ℞ iiij.

Coquantur secundum artem.

CONFERT febribus pituitosis & biliosis, & iis incipientibus.

P. C. SCHOL.

Ana ℥ iiij.] Sacchari quod in hunc Syru- A
 bum recipitur, perpensa quâtitate, nimiam non
 esse hic radicum cuiusque unciarum quatuor
 assumptionem industriè Cordus existimauit;
 Euchsio quamquam secus videatur.

*Syrupus acetosus simplex, ex descri-
 ptione Mesua.*

℞. Aceti vini ℞ iiij.

Sacchari clarificati in aqua ℞ v.

Coquantur secundum artem.

EST communis ad omnē materiam, digerit
 choleram, phlegma & melancholiam, ratione-
 que aceti attenuat crassos humores; incîdit
 viscosos, duros mollit, ineptos euellit, vbiq̃
 penetrat, oppilationes aperit, prouocat vri-
 nam, putredini resistit, & corrigit malitiam
 humorum: idcirco in febribus pestiferis iuuat:
 sed ratione remissæ frigiditatis, tenues & sub-

K 5

riles

riles humorum partes inspissat, adæquat calorem, refrigerat, viscera lenit, & sitim sedat.

Syrupus Acetosus compositus,

D. Mesue.

℞. Radicum Fœniculi Radicum Apij
Radicum Endiuixæ ana ℥ iij.
Seminis Anisi Seminis Fœniculi
Seminis Apij ana ℥ j.
Seminis Endiuixæ ℥ iij.
Aquæ quantum sufficit.
• Sacchari optimi ℥ iij.
• Aceti acerrimi ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

BILEM crassam & anulsu difficilem, ac pituitam incidit, terget obstrueta hepatis, lienis, renum, aperit.

Syrupus acetositatis Citri.

℞. Acetositatis mali Citeri per pannum destillatæ ℥ vj.
Sacchari albißimi ℥ iij.
Coquantur secundum artem.

R A R O habent Pharmacopola Syrupū acetositatis Citri verum nam plerumque venditur pro eo Syrupus Citreorum conditorum. Porro cum quis bene conficere voluerit, oportet ut per
filtrum

filtrum aut pannum destilletur acetositas Citreorum, sine ulla vi aut expressione, alioquin coagulatur, cum refrixerit, Syrupus.

P. C. SCHOL.

R. Acetos. mali Citrei ℥vj. &c.] ℥ vij. Fuch- A
sius, & Sacch. lib. 3. legi vult. Verum cum Cor-
dus in hac Syrupi descriptione Mesuem non se-
quatur, ut conferenti liquebit, sed suo Marte
eandem descripserit; frustra conqueritur Fuch-
sius. Mesues autem nomen inscriptioni additum
fuisse, ut & Syrupode Agrestæ; scriptoris vitio
id factum fuisse hinc liquet; quare utrobique
id ipsum à me deletum est.

Æ s t v m ac feruorem bilis flauæ, febrium-
que ardentium & pestilentialium mitigat, Cu-
tim quoque vehementem restringit.

Syrupus acetositatis Limonum.

R. Acetositatis Limonum maturorum per fil-
trum destillatæ ℥ vi.

Sacchari albissimi ℥ iij.

Coquantur secundum artem.

V E H E M E N T I V S infrigidat & penetrat,
quàm Syrupus acetositatis Citri, & valet con-
tra putrefactionem, contra vermes, vehemen-
tiam caloris febris, & alios crudos humores.

Syrupus

Syrupus Aranciorum acetosorum.

Rx. Succi Aranciorum acetosorū per pannum
aut filtrum destillati P vj.

Sacchari albiſſimi P iij.

Coquantur secundum artem.

*Ad hunc modum potest etiam fieri ex succo
Aranciorum dulcium.*

Syrupus de Agrestæ.

Rx. Agrestæ P v.

* Sacchari clarificati P iij.

Coquantur secundum artem.

AGRESTA est succus uuarum immatu-
rarum, qui Gracè vocatur Omphacium, & in-
spissatus seruatur: hoc autem loco recipienda est
Agrestæ nondum ad spissitudinem decocta.

*Agrestæ exprimi debet ex generosissimis uuis,
apud nos paulò ante maturitatem.*

IN magnis æstibus ad sitim restinguendam
mirificè cōfert: Vomitū & alui profluuium bi-
liosum sistit: Febribus biliosis succurrit: Gra-
uidarum vomitum etiā reprimat, ac ventricu-
lum earundem firmat: Venenisq. aduersatur.

Syrupus de Pomis D. Mesue.

Rx. Succi pomorum dulcium

Succi pomorum acetosorum ana P v.

Coquan-

Coquantur, despumantur & colentur: deinde adde

Sacchari ℞ iij.

Coquantur secundum artem.

Succus exprimendus est ex optimis pomis siue nalis, qualia sunt quæ Vveynlingē siue vveynerulen vocantur. in acetosorum genere ex dulcibus etiam sapidissima sunt eligenda.

C O R iam becillum roborat, ob id syncopen & cordis tremorem sanat.

Syrupus Granatorum dulcium

D. Mesua.

℞. Succi Granatorum dulcium ℞ v.

Sacchari albißimi ℞ iij.

Coquantur secundum artem.

M A L E hodie faciunt Syrapū Granatorum, indifferenter cum dulcibus acetosa Granata miscentes. oportet enim utrumque Syrupum tam acetosorum quàm dulcium granatorum seorsum conficere: nam diuersis morbis, morborumq; accidentibus medentur.

S I T I M, tussim, & pleuritidem iuuat.

Syrupus Granatorum acetosorum D. Mesua.

℞. Succi Granatorum acetosorum ℞ v.

Sacchari albißimi ℞ iij.

Coquan-

Coquantur secundum artem.

FEBRES biliosas, & quæ ex pituitosis
flammam multam inuehunt, iuuat.

*Syrupus Dinarij, siue Byzantinus
simplex D. Mesua.*

℞. Succi Endiuia Succi Apij ana ℞ ij.
Succi Lupuli

Succi Buglossæ domesticæ aut siluestris ana ℞ j.
Succidepurentur & despumentur dum ma-
neant ℞ iiij.

Sacchari optimi ℞ ij. ℞.

Coquatur cū facilitate, donec fiat Syrupus.

Q V I D A M differentiam faciunt inter Sy-
rupum Dinarij & Byzantinum seu de Byzan-
tiis, alterum simplicem, alterum compositum
vocantes. Sed nos simplicis & compositi nomine
distinguiamus, utrumque Dinarij siue Byzanti-
num appellantes.

H V M O R E S crassos & lentos incidit atque
extenuat, obstructions aufert, morboque re-
gio succurrit.

Syrupus Byzantinus compositus

D. Mesua.

℞. Succi Endiuia veræ

Succi Apij ana ℞ ij.

-anapa.

Succi

Succi Lupuli

Succi Buglossę domesticę aut siluestris ana ℥ j.

In succis decoquantur

Florum rosarum ℥ ij.

Glycyrrhizę ℥ iiij.

Seminis Anisi Seminis Fœniculi

Seminis Apij ana ℥ iiij.

Spicę nardi Indicę ℥ ij.

Colaturę adde Aceti ℥ ij.

Sacchari albissimi ℥ ij. β.

Coquantur secundum artem diligenter.

S Y R U P U S Byzantinus compositus, est ef-
ficacior simplici.

Syrupus de Artemisia D. Ioan.

Matthęi de Gradi.

℞. Artemisię M. ij.

Pulegij Calaminthę

Origani Melissę

Dictamni Cretici Persicarię

Sabinę [*id est, Sauina.*]

Amaraci [*hic accipe Maioranam.*]

Chamædryos

Perforatę [*id est, Hyperici.*]

Chamæpityos [*id est, Ina arthritica.*]

Comarum Matricarię Centaurę minoris

Rutę

Rutæ	Betonicæ
Buglossæ	Radicum Fœniculi
Radicum Apij	Radicum Petroselini
Radicum Asparagi	Radicum Brusci
Radicum Saxifragiæ	[<i>eius loco accipiantur ra-</i> <i>dices Pimpinella.</i>]
Radicū Enula campanæ	Radicum Cyperi
Radicum Rubeæ tinctorum	Radicū Ireos
Radicum Pæoniæ	ana M j.
Baccarum Iuniperi	Seminis Ligustici
Seminis Petroselini	Seminis Apij
Seminis Anisi	Seminis Nigellæ
Carpobalsami	[<i>aut succedanei eius.</i>]
Costi	Radicum Alari
Radicum Pyrethri	Cassia lignæ aromaticæ
• Cordumeni	Calami aromatici
Phu [<i>id est, radicis eius.</i>]	ana ℥ β.
Aquæ quantum sufficit	Sacchari P iij.

Coquatur omnia magna diligētia secundum
artē, ne plusquān necesse sit aromata bulliāt.

*Pro vulgari & falso Dictamnō hic debet po-
ni Dictamnus Creticus, qui singulariter facit
ad ea ad quæ Syrupus hic est compositus.*

SAXIFRAGIAM Itali vocant eam her-
bam quam nos Pimpinellam appellamus, & hu-
ius radix hic debet accipi.

M E D E.

M E D E T V R passionibus matricis, & reti-
net eam in proprio loco: resoluit frigiditates,
ventositates, & dolores: corroborat nervos,
aperit poros, sanguinem corrigit, menstruis
imperat & prouocat.

Syrupus de Absinthio maior D. Mesue.

℞. Absinthij Romani p β.
Rosarum rubearum ℥ ij.
Spicæ Indicæ ℥ iij.
Vini clari veteris & optimi ℥ lxx.
Succi Cydoniorum ana r ij. β.
Macerentur in vase marmoreo aut fictili
denso per noctem vnam, deinde decoquantur.
Colaturæ adde Sacchari r ij.

Confice secundum artem.

A B S I N T H I V M Romanum, id est, Absin-
thium Ponticū gustu adstringens, & aromati-
cum: vulgare autē dicitur rusticū Absinthium.

V E N T R I C V L V M roborat & iecur, alia-
que instrumenta nutritionis, appetentiamque
excitat, contra regium morbum prodest, fla-
tus discutit, humoresque per vrinam pellit.

Syrupus Infusionis rosarum.

℞. Infusionis rosarum p v.
Sacchari clarificati p iij.
L Coquan.

Coquantur cum facilitate.

Est conueniens ad extinguendam sitim in febribus acutis, & ad remittendū excessum caliditatis in eis, confortans stomachum relaxatum, & hepar supercalefactum, & cor, resistens putredini, conueniens tempore pestilentia, & resistens venenositati.

Syrupus Infusionis Violarum.

Rx. Infusionis violarum p. v.

Sacchari clarificati r. iiij.

Coquantur cum facilitate.

FEBRIBVS acutis, iecinoris & cordis caloribus, asperitati gutturis, morbo laterali, tussiq. aridæ succurrit, sitim restinguit, aluumque emollit.

Infusio Rosarum Mesue.

Rx. Foliorum rosarum p. j. ponantur in vrceo angustiori, & infunde illis aque calidæ lib. iiij. aut quantum sufficit, vt madeant. Macerentur per horas viij, aut xij. obstructo fictilis orificio: deinde exprime leuiter, & excola infusionem, abiectis rosis, & iterum inde recentes rosas, & infusionem excolatam calefac, & infunde rosis, ac obstructo orificio vrcei in calido loco dimitte per horas viij. vel xij. postea rursum

sum excola, & colaturam infunde aliis recentibus rosis, & tertio dimitte: & si efficaciorē facere volueris, etiam quarto recentes rosas in eodem diluto recalefacto macera, ac postremo addito saccharo, Syrupum facito.

Porro quidā tundunt Rosas, quidam verò integras ponunt: & tusa quidē celerius vim suam & colorem in aquam deponūt, ac minorē locum occupant. At viola cū tunduntur, aliquā herbaceam & radiosam acrimoniam acquirūt, hoc est, sy crygen einen gruselnden geschmack im mund. quare consulantur hac de re Doctores medici.

Hæc infusio dicitur alio nomine Mucharus, & Mucharum, siue ex Violis siue Rosis fiat.

Mesue tantum bis iubet rosas infundi: melius verò est ut sæpius recentes abiectis substituātur.

Infusio Violarum.

Infusio Violarum eodem modo fit quo Rosarum infusio.

Syrupus de Succo Fumi terra maior

D. Mesue.

R. Myrobalanorum Citrinorum

Myrobal. Chebulorum ana ʒ xx.

Florum Boraginis Florum Buglossæ

Florum Violarum Absinthij

L 2

Cuscutæ

Cuscutæ ana ℥ j.
 Glycyrrhizæ Rosarum ana ℥ iij.
 Epirhymi Polypodij ana ℥ vij.
 * Prunorum enucleatorum
 Passularum enucleatarum ana ℞ β.
 Tamarindorum
 Pulpæ Casiæ fistulæ ana ℥ ij.
 Aquæ ℞ x.

Coquantur secundum artem ad tertias, deinde cola, & colaturæ adde

Succi Fumi terræ depurati

Sacchari albißimi ana ℞ iij.

Coquantur lento igne ad iustam consistentiam, & reponc.

Meum exemplar manu scriptum habet Prunorum ℞ β. quemadmodum passula.

Syrupus fumaricæ maior ventriculū & hepar roborat, obstructions aperit, cutis morbos, præcipuè ab humore falso vel vîstonatos, vîpsoram, leprâ, impetiginē, serpiginem curat.

Syrupus de Mentha maior D. Mesuæ.

℞. Succi Cytoniorum mazorum
 Succi Cytoniorum dulcium
 Succi Granatorum acerosorum
 Succi Granatorum dulcium

Succi

Succi Granatorum muzorum ana ℞ j. β.

In succis macerentur per horas xxiiij.

Menthæ siccae ℞ j. β.

Rosarum rubearum ℥ ij.

Coquantur deinde cum facilitate vsque ad medietatis consumptionem: colentur, & colaturæ adde

Mellis vel Sacchari ℞ ij.

Coquantur ad perfectionē: & cum reponis, aromatiza cū Gallia moschata vera trita, & in sindone ligata, atq. ex orificio vasis suspensa.

MUZORVM, id est, in vini sapore acescentium: nam muzus sapor de dulcedine & aceto- sitate aliquid habet.

Notandum est, si quis cum melle velit hunc Syrupum conficere, ut accipiat mel odoratum aromaticum, quale è Dantisco aduehitur: vel tale aliud, ut est quod vocant virginicum mel, & Saxones Kruthonich, quasi aromaticū mel, & non illud vulgare flatuosum.

Ventriculum frigidum roborat, ob id nau- seam, vomitum, singultū, fluorem alui sedat.

Syrupus de Mentha minor D. Mesua.

℞. Succi Menthæ depurati ℞ j.

Succi Granatorum dulcium

L 3

Succi

Succi Granatorum acerosorum, ad medietatem coctorum.

Sacchari vel Mellis ana ℞ j.

Coquantur sensim secundum artem.

In hoc quoque Syrupo notandum est, quod in proximo Syrupo de Mētha maiore diximus de melle.

Eandem ferè cum superiore facultatē habet.

Syrupus de Calamintha D. Mesuae.

℞. Calaminthæ domesticæ

Calaminthæ silvestris ana ℥ ij.

Ligustici [seminis scilicet.]

Dauci [videlicet seminis eius.]

Schoenanthi ana ℥ v.

Passularum enucleatarum ℞ ℥.

Mellis ℞ ij.

Aquæ quantum sufficit.

Coquantur secundum artem.

MEL cum additur huic Syrupo, tunc oportet esse optimum & aromaticū mel, ut antè etiam dixi, idque in omnibus Syrupis & Oxymellibus obseruandum est.

POTEST etiam cum Saccharo fieri hic Syrupus, quia pauci optimum & aromaticum mel emere & expetere consueuerunt.

DOMESTICA Calamintha, est qua in agris

*agris & cultis locis nascitur: & vulgò vocatur
Korumintze.*

*SILVESTRIS autem Calamintha, est
qua in incultis locis & montibus prouenit, &
appellatur Calamintha montana.*

*LIENOSIS plurimum confert, quibus
durus est lien & pænè irresolubilis, & his qui
frigida viscera habent, & asthmate laborant,
præsertim in senibus, & in habentibus anti-
quas tussès: si quis enim vel pectus, vel ventri-
culū, vel intestina crassa tenaci & irresolubi-
li materia plena habeat, hoc Syrupo sanatur.*

Syrupus de succo Endiuia simplex.

R. Succi Endiuia depurati . P. viij.

Sacchari Tabarzeth . P. v. ℞.

Coquantur secundum artem.

*ENDIVIA vera, est herba satiuæ, cauli-
bus, folijsq; Cichorea similibus, maioribus ta-
men pinguioribusq; flores etiam similes sunt
Cichorea. allatum est semen eius ex Italia, &
iam multis in locis apud nos feritur.*

*Valet principaliter ad omnes supercale-
factiones hepatis, & aliorum membrorum
nutritiuorum, & in morbo laterali maxime
conuenit.*

Syrupus de Endiuiā compositus.

℞. Endiuiæ recentis Boraginis Scariolæ
 Hepaticæ Melissæ Buglossæ Lactucæ
 Eupatorij ana m j.

Seminum frigid. maiorum ana ℥ j.
 Santali albi Santali rubri ana ℥ j.
 Florum cordialium ana ℥ iij.

Coquatur secundū artē, in sufficienti quan-
 titate aquæ: deinde cola, & colaturæ adde

Succi Endiuiæ depurati ℥ j.
 Vini Granatorum ℥ iij.
 Sacchari albi ℥ iij.

Fiat Syrupus secundum artem.

V A L E T præcipuè ad supercalefactiones
 hepatis cordis, & aliorum membrorum nutri-
 tiuorum: & generaliter confert cuilibet com-
 plexioni calidæ, & est aperitiuus oppilatio-
 num, & confortatiuus membrorum debilita-
 torum à mala complexione calida: est etiā di-
 gestiuus materiarum cholericarum acutarum.

Syrupus de Cichorio cum Rhabarbaro

Nicolai Florentini.

℞. Endiuiæ domesticæ
 Endiuiæ siluestris Cichorij
 Taraxaci ana m ij.

Cicerbitæ

Dicerbitæ Heparicæ Scariolæ Lactucæ

umi terræ Lupulorum ana m. j.

Hordei non excorticati ℥ ij.

Vesicariæ [*id est, Alkekengi.*]

Glycyrrhizæ Capillorum Veneris

Ceterach [*id est, Asplenij.*]

Polytrichi Adiantos ana ℥ vj.

Radicum Fœniculi Radicum Apij

Radicum Asparagi ana ℥ ij.

Coquatur in aqua sufficiente, & percoletur, *
deinde cū Sacchari albi ℥ iij. Fiat Syrupus.

Pro cuius vnaquaque libra inter coquen- A
dum adiiciantur

Rhabbarbari optimi ℥ iij.

Spicæ nardi ʒ ij.

Colligato in linteolo raro quod sæpe expri- B
matur, dū Syrupus consistentiā iustā nancisca-
tur.

P. C. SCHOL.

℥ iij.] Hanc Sacchari quantitatem huic Sy- A
rupō esse indendam, eamq; abunde satis esse dici-
mus & censemus: quamquam Commentatorum
nullus, quod sciam, huic multi vsus Syrupō pon-
dus vllum exprimat, Colonienſium Dispensato-
riolo excepto: quod cum ℥ v. & ℥ viij. sumendas
putat, medicamentū nimis imbecille tanta copia
reddit, argente & malum, quod Manipulos vi-
ridium

L 5

*ridium herbarū (quales hic requirūtur) semun-
siales tantum, ut sunt puerorum, constituat.*

B *Caterum Spica ꝑ ij. hic quoq. sufficere debent.*

VALET contra omnem materiam veneno-
sam in alterando & mundificando eā, & pro-
priè in anthrace & similibus: valet & in febre
pestilentiali. Confortat cor & nutritiva, mun-
dificat materias per urinam & secessum, & fa-
cit appetere cibum, ac inducit somnum.

*Syrupi è Cichoreo Nicolai Florentini, emen-
data descriptio M. De Lobel.*

ET SI quorundam popularium medicantium, pharma-
cantium, ac medicastorum fatalis infestia fallere solita, nulla
monita in dignoscendo non contemnenda utilitatis, Seridis siue
Intubacei generis cunctis familiis, audierit; ut nō tantum Me-
dicos doctiss., & pharmacopaeos probos eluserit, sed etiam mul-
tis ansam dederit in hunc usque diem magno agrotantium
dispendio, parandi Syrupum è Cichoreo D. N. Florentini cum
Rhabarbato è solo succo Cichorei sativi, vel aliquot horum
refrigerantibus temperatis herbis, quae sanè instituto Nicolai
Florentini minime respondebunt (praescribitur enim eius
Syrupus non modò ad refrigerandū hepar & visce-
ra; sed etiam tum ad hepatis, stomachi, splenis, alio-
rumque viscerum aestuaciones ac inflammationes,
tum ad referendas obstructions in febribus biliosis
& ad somnum conciliandum) verumtamen amicis
quorundam petitionibus, (quia multi & quotidiani usus hic
utilissimus Syrupus) neglectis herbarum confusis, ambagibus, &
barbaris

in barbari nominibus, eius, secundum intensionem Nicolai, descriptionem sic castigamus, sicuti ordinis seriem Rondelletij:

1. * Hordei integri ℥ iiij. A
 Radicum Asparagi
 Fœniculi
 Paludapij [.i. apij palustris.] ana ℥ ij. B
 Glycyrrhizæ ℥ j.
 Intybi domestici vel sativi [id est, Endivia C
 vulgarissima, latifolia, officinis vulgò Scar-
 riola vocata.]
 Intybi sylvestris [.i. Endivia sylvestris officina-
 rum, perperā recentioribus Lactuca sylvest.]
 Cichorei
 Taraxaci [.i. Dentis leonis.] ana M. ij.
 Cicerbitæ siue Sonchi lenis.
 Hepaticæ siue Lichenis. Lactucæ sativæ
 Lactucæ sylvestris soporiferæ Fumi terræ D
 Lupulorum ana m j.
 Adianthi [siue Capillorum Veneris.]
 Polytrichi
 Asplenis [siue Ceterach.]
 Cassithæ ana ℥ vj.
 Seminis Halicacabi [siue Alkekengi.] ℥ iiij.
 si recens fuerit; alioqui sufficiet media
 quantitas.
 Coquantur in aquæ & succi Cichorei æquis
 parti-

partibus in balneo aperto; deinde exprimantur, clarificentur, & syrupizentur in eodē balneo & vase lapideo aut vitreo, additis lib. iiij. paulo plus, minus, sacchari albi.

Sub finē ebullitionis adduntur Rhabarbari electi ℥ iiij. & Spicæ Nardi ℥ iiij. nodulo exceptorum & ligatorum.

* *Preponuntur quæ diutius coquenda.*

A ℥ iiij.] *ex veteri exemplari cū Rondel legimus.*

B Palud.] *magis aperit quàm Apium hortense.*

C Intubi dom.] *omnia exemplaria inserunt Scariolam; quæ tamen eadem est cum Endivia aut Intubo domestica.*

D Lactuc. sil.] *Lactucam agrestē officina Belgica Antuerpiæ facile sibi procurabunt; ubi semel sata maximo & importuno proventu luxuriat; potissimum in hortis nostris & optimorum pharmacopœorum Ioannis Coene, Oliuerij Driesch, & pia memoria P. Coudebergi.*

Oxysacchara simplex D. Nicolai.

℞. Sacchari albi P j.

Succi malorum Granatorū acerosorum ℥ viij.

Aceti ℥ iiij.

Coquantur cum facilitate ad ignem in vase stanneo, dum Syrupi crassamentum adsciscat.

Digerit

Digerit materias cholicas phlegmaticas, quæ grauant stomachum & præcordia, & ciunt tertianas duplas inordinatas, quas vocant erraticas, & similes quartanis duplis.

*Oxysacchara composita D. Nicolai
Præpositi.*

2. Capillorum Veneris

linguæ ceruinæ [*id est, Phyllitidis.*]

colopendriæ [*id est, Asplenij.*]

polytrichi Hepaticæ Violarum

Radicum Fœniculi Radicum Rusci

Radicum Asparagi

Radicum Graminis ana ʒ j.

Hoc modo confice: In succo malorum gratorum, herbas & radices triduum macerato, quarto die parū bullire finito, cū forti expressione percolato: postremo cum Sacchari P ij, x arte, ad iustam crassitiem concoquito.

Concalescēta corpora potum iuuat: longis febribus, quas sanguis aut bilis creauit, & calori iecinoris auxilio est, & lienis obstructions tollit.

Syrupus de Iuinibis D. Mesua.

2. Iuinibarum numero .l x.

Violarum

Semi-

Seminis Maluæ ana ℥ v.
 Capilli Veneris Hordei mundati
 Glycyrrhizæ ana ℥ j.
 Seminis Cytoniorum
 Seminis Papaveris albi
 Seminis Melonum
 Seminis Lactucæ
 Tragacanthæ ana ℥ iij.
 Aquæ fontis ℞ iij. aut q. s.
 Sacchari ℞ ij.

Coquantur secundum artem.

S Y R V P V S iste confert raucitati, tussi & pleuritidi.

Syrupus Violarum D. Mesua.

℞. Violarum ℥ ij.
 Seminis Cytoniorum
 * Seminis Maluæ ana ℥ vij.
 Iaiubarum
 Sebesten ana numero xx.
 Aquæ Cucurbitæ quantum sufficit.
 Sacchari ℞ j. β.

Coquantur secundum artem.

CUCURBITA debet destillari cum adhuc est tenera, antequam indurescere incipiat.

Prodest pleuritidi & tussi à causa calida.

Syrupus

Syrupus de Succo Violarum.

℞. Violarum recentium lamiam lectarum
quantitatem satis magnam, & decerpe ab iis
purpurea foliola, & ab iis virides eorum cau-
culos, quoniam herbaceam habent acrimo-
niam, & floridum colorem hebetant. Contun-
de deinde decerpta violarum folia in morta-
rio marmoreo & exprime. mox

℞. Expressi succi ℥ ij.

Sacchari ℥ iiij.

SACCHARVM prius clarificetur, & ad
iustam consistentiam coquatur: amoto deinde
ab igne Saccharo, tepesieri finito, & succum
infundito, & rursus lento igne ad spissitudi-
nem coquito, & emicantem in coquendo spu-
mam continuo auferto.

Quidam spumam non auferunt, ne color pereat.
Sed citò corrumpitur cum spuma repositus.

Hic Violarum Syrupus in Misnia fit, praesertim
Lipsia, ubi eum vocant Succum Violarum.

BILIS acrimoniam obtundit, ac ob len-
torem thoracis vitiiis est aptum.

Syrupus de Prassio D. Mesua.

℞. Prassij ℥ ij.

Capilli Veneris

Hyssoi

- Hyssopi ℥ ij.
 * Calaminthæ Anisi Radicum Apij
 Radicum Fœniculi ana ℥ v.
 Seminis Maluæ
 Seminis Fœnogræci
 Radicis Ireos ana ℥ iij.
 Seminis Lini
 Seminis Cytoniorum ana ℥ ij.
 Passularum enucleatarum ℥ ij.
 * Ficuum siccarum pinguium, numero xv.
 * Penidiarum ℥ j.
 Mellis ℥ ij.

Aquæ quantum sufficit.

Coquantur secundum artem.

MEL oportet esse aromaticum & optimum: potest tamen etiam cum Saccharo fieri.

Vitiis thoracis & pulmonis diuturnis, & à frigido renacique humore excitatis, atque eradicatione difficilibus succurrit: hinc est quod senibus & asthmaticis plurimum conducatur.

Syrupus de Glycyrrhiza D. Mesue.

- R. Glycyrrhizæ rasæ ℥ ij.
 Capilli Veneris ℥ j.
 Hyssopi ℥ ss.
 Aquæ ℥ iij.

Mace.

Macerentur horis xxiiij. Deinde coquantur
ad dimidias: colaturæ adde

Mellis optimi Penidiarum

Sacchari ana ℥ viij.

Aquæ rosarum ℥ vj.

Fiat Syrupus secundum artem.

Thoracem & pulmonem expurgat, ideo-
que diuturnæ tussi & pleuritidi auxiliatur.

Syrupus de Hyssopo D. Mesuæ.

℞. Hyssopi aridi Radicum Apij

Radicum Fœniculi Radicum Petroselini

Glycyrrhizæ ana ℥ x.

Hordei mundati ℥ iiij.

Seminis Maluæ Seminis Cytoniorum

Tragacanthæ ana ℥ iiij.

Capilli Veneris ℥ vj.

Iuiubarum

Sebesten ana num. xxx.

Passularū magnarū enucleatarum ℥ j. ℥ iiij.

Ficum ficcarum

Dactylorum pinguium ana num. x.

Penidiarum albarum ℥ ij.

Confice secundum artem.

Ad vitiathoracis & pulmonis efficax est, hu-
moresq. exscreata difficiles extenuat & edu-
cit.

M

Syrupus

Syrupus de Eupatorio D. Mesue.

℞. Radicum Fœniculi Radicum Apij
 Radicum Endiuæ ana ℥ ij.
 Glycyrrhizæ Schœnanthi
 Cuscutæ Absinthij
 Rosarum ana ℥ vj.
 Capilli Veneris Bedeguaris Suchahæ
 Florum aut radicum Buglossæ
 Anisi Fœniculi
 Eupatorij ana ℥ v.
 Raues Seni [*id est, Rhabarbari Orientalis.*]
 Mastiches ana ℥ iij.
 Spicæ nardi Indicæ Afari
 Folij [*pro Folio pone Spicā Romanā.*] ana ℥ ij.
 Aquæ quantum sufficit, aut ℥ viij.
 Succi Apij
 Succi Endiuæ ana ℥ ij.
 Sacchari ℥ iij.

Coquantur secundum artem.

Pro Bedeguare & Suchaha, quæ hodie nō cognoscuntur, licet accipere Carduū Benedictum, & Carolinam, id est, Cardopacia radicem.

Eupatorium, quod Mesue semper intelligit, est Gratiola, ut antè etiam dictum fuit aliquoties.

Frigidis iecinoris vitiis, ac eiusdem obstructioni.

Etionibus, aquæ intercutem maloque corporis
habitui succurrit: humores enim crassos exte-
nuat, roburque iecinori adjicit. Urinas mouet,
& hypochondriorum tensionem demolitur.

Syrupus de Stœchade simplex.

℞. Florum Stœchadis ℥ xxx.

Thymi Calaminthæ

Origani ana ℥ x.

Anisi ℥ vi.

Passularum enucleatarum ℥ iiij.

Aquæ quantum sufficit: coquantur secundum
artem. Colaturæ adde

Mellis optimi ℥ iij. β.

Condiatur cum

Cinamomi Calami aromatici

Zingiberis ana ℥ i. β.

Ligetur in sindone, & in Syrupo suspendatur.

Syrupus de Stœchade compositus D. Mesuæ.

℞. Florum Stœchadis ℥ xxx.

Thymi Calaminthæ

Origani ana ℥ x.

Anisi Pyrethri ana ℥ vijs.

Piperis longi ℥ iij.

Zingiberis ℥ ij.

Passularum enucleatarum ℥ iiij.

M 2

Aquæ

Aquæ quantum sufficit

Mellis optimi ℞ v.

Coquantur secundum artem lento igne, co-
latura adde mellis prædictas ℞ v. & cum re-
ponis, tunc condies sequentibus speciebus in
sindone rara & munda suspensis.

℞. Cinnamomi Calami aromatici

Spicæ nardi Indicæ

Croci Zingiberis Piperis nigri

Piperis longi ana ℥ j. ℞.

Contundantur grosso modo.

*Ego in condiendo Syrupo de Stæchade utro-
que, pro Calamo aromatico mallem imponere
Schœnanthum aut Galangam, nam vero Ca-
lamo aromatico iam caremus.*

Inuat omnes affectus frigidos cerebri &
neruorū, ut paralyſim, epilepsiā, spasmū, spasmum
cynicū, tremorem, ac ventriculū firmat.

Syrupus de Epithymo D. Mesuæ.

℞. Epithymi ℥ xx.

Myrobalanorum Citrinorum

Myrobalan. Indorum ana ℥ xv.

Cuscutæ

Fumiterræ ana ℥ i.

Thymi

Buglossæ Galaminthæ

Embli-

Emblicorum Bellericorum Glycyrrhizæ
 Polypodij Agarici
 Stœchados ana ℥ vj.
 Rosarum Fœniculi
 Anisi ana ℥ ij. β.
 Prunorum num. lxx.
 Passularum enucleatarum ℥ iiij.
 Tamarindorum ℥ ij. β.
 Aquæ quantum sufficit.
 Sacchari p. iiij.
 Sapæ p. ij.

Coquantur secundum artem.

SAPA est mustū optimū ad tertias decoctum.

ATRAM bilem, & alios humores vstos vacuat, ob id morbos ex his nascentes, elephantiam, cancrum, vlcera maligna, fistulosa, pforam, lepram præcanet, curatque.

Syrupus de Nymphaea D. Francisci

Pedemontani.

℞. Florum Nymphææ ℥ ij.
 Florum vagulæ Caballinæ aquaticæ
 Psyllij integri
 Acetosæ ana ℥ j.
 Seminis Cucurbitæ Seminis Citrulli
 Seminis Cucumeris

M 3

Seminis

Seminis Melonis ana ℥ iiij.

Seminis Lactucæ Seminis Endiuiæ

Seminis Scariolæ

Seminis Portulacæ ana ℥ ij.

Radicum Fœniculi ℥ j.

Aquæ Hordei quantum sufficit.

Saccharini ℥ j.

Aceti albi

Succi Granatorum acetosorum ana ℥ ij.

Coquantur secundum artem: deinde aro-

matizentur cum

Santali Citrini

* Spicæ nardi Indicæ ana ℥ j.

A - *Due sunt Nymphææ species, altera cæcidum, altera luteum florem habet, & utriusque flores hunc Syrupum ingrediuntur. Nam Auctor huius Syrupi eam speciem qua albos habet flores, vocat Nenuphar, alteram verò qua luteos fert flores, appellat ungulam Caballinam aquaticam, à foliorum figura, & florum colore.*

SCARIOLA est species Endiuiæ, quam nos in Germania vocamus Endiuia, valgò Gensdistel, & habet spinulas in dorso foliorum.

P. C. SCHOL.

Ungula Caballina aquatica.] De Tussilagine hanc in propria sua significatione intelligi posse

posse Euchsus dextrè monet: apud aquas enim
aut humentia loca plerumque nascitur.

B I L I S flauæ feruorem extinguit, ideoque
mirificè in ardentibus aliisque acutis febribus
auxiliatur: somnum quoque conciliat.

Syrupus de Papauere simplex D. Mesue. *

℞. Capita Papaueris albi recentia
Capita Papaueris nigri recentia ana ℥ lx.
Aquæ pluuiialis ℞ iiij.

Coquantur vsquequò remaneat tantum
aquæ ℞ j. ℞. Colaturæ adde
Sacchari

Penidiarum ana ℥ vj.

Fiat Syrupus secundum artem. (niæ.

Valet ad catarrhū & tussim, causam iniom-

Syrupus de Papauere compositus D. Mesue.

℞. Papaueris albi

Papaueris nigri ana ℥ l.

Capillorum Veneris ℥ xv.

Glycyrrhizæ ℥ v.

Iuiubæ numero xxx.

Seminis Lactuæ ℥ xl.

Seminis Maluæ

Seminis Cytoniorum ana ℥ vj.

Coquatur in ℞ iiij. aquæ vsq. ad duas & cum

M 4

Sacchari

Sacchari &
Penidiarum ana ℥ viij.

Fiat Syrupus secundum artem.

VALET ad tussim siccam, phthisin, catar-
rhum, insomnij causam.

Syrupus de succo Myrtillorum.

A ℞. Succi Myrtillorum depurati ℞ viij.

Sacchari clarificati ℞ iiij.

Coquantur secundum artem.

*Curandum est ut adferatur ex Italia, aut
Narbonensi Gallia Myrtillorum succus, si quis
volet hunc Syrupum conficere.*

P. C. SCHOL.

A ℞ viij.] *Cum hic Syrupus à Mesues, cui er-
roneè à Cordo adscribebatur, diuersus sit: atque
à Cordo ipso forsitan concinnatus; malè legi hic
℞ viij. Fuchsius temerè scribit.*

SYRUPVS Myrtillorum ventriculum &
viscera roborat, ob id fluorem alui antiqua-
tum sistit & tussim mitigat.

Syrupus Myrtinus compositus.

℞. Myrtillorum ℥ xx.

* Rosarum

Santali albi

A Sumach

Balaustiorum

* Berberis

ana ℥ xv.

Mespy-

Mespylorum 3 L. *

Succi Granatorum acidorum vel muzorum *

Succi Pomorum agrestium ana p ij.

Omnia in dictis succis & aqua q. s. coquantur, & fiat Syrupus cum

Sacchari p iij. secundum artem. *

P. C. SCHOL.

Rosarum.] Rosas Fuchsius rectè addit à Cordo neglectas, simulq; ana 3 xv. legendum & 3 L. atque Sacchari p iij. dextrè ait, ubi Cordus 3 xxx. & 3 C. ac Sach. p v. nimis scriberat. Interim in aqua p viij. coquit Fuchsius, & succi Granatorum ac Cytoniorum ana p β. tantum addit.

Hic Syrupus sistit ventris fluorem, etiam antiquum, & creatum sanguinis.

Syrupus de succo Acetosæ D. Mesuæ.

℞. Succi Acetosæ depurati p iij.

Sacchari clarificati p ij.

Coquantur secundum artem.

FEBRIBVS biliosis & pestilentialibus salubere est, cordis & ventriculi flammeum colorem extinguit, ipsaque roborat.

Syrupus de Succo Boraginis.

℞. Succi Boraginis depurati p viij.

M s

Florum

Metal.

Florum Boraginis recentium ℞ j.

Quàmmodicè efferueant, aut potius horis aliquot in succo clarificato ac calido macerentur: dein colentur, cumque Sacchari ℞ iiij. fiat Syrupus.

S U C C U S Boraginis prius est clarificandus cum albuminibus ouorum, alioquin plus satis mucilaginosus fieret Syrupus.

P. C. S C H O L.

Stolidos cùm hic descripsisset Cordus huius & sequentis Syrupi conficiendi modos, ego eisdem suo nitori ex arte reddidi. Fecissem id quidem & aliis locis quamplurimis, nisi saltem in alterius messum indere penitus, minimè consultum visum fuisset.

C O R iplum roborat, eiusque tremorem & syncopen sanat, maniacos & melancholicos iuuat.

Syrupus de Succo Buglossæ.

℞. Succu Buglossæ depurati ℞ viij.

• Florum Buglossæ recentium ℞ j.

• Sacchari ℞ iiij.

• Fiat eodem modo quo præcedens.

Intelligo hic eam Buglossam quæ vulgò in usu est, non illam Italicam maiorem.

Succus

Succus Buglossa difficulter exprimitur: nam fit mucilago, dum tunditur Buglossa, idè tusa dimittenda est per noctem in frigido loco, & post die exprimens succus, atque cum albuminibus ovorum clarificandus.

C o r confortat, lætitiāque generat.

Syrupus de Lupulo.

Rx. Succī Lupuli depurati P ij. *

Succi fumi terræ depurati P j. *

Sacchari P ij. *

Coquantur secundum artem.

Potest etiā hic Syrupus fieri è solo Lupuli succo, ut Mesua placet in capite De speciebus Volubilis. Exprimeudas autē est Succus Lupuli cum adhuc tenera sunt eius viticula & asparagi.

Refrigerat, & collectionem impetus lenit. Bilem regio morbo laborantibus detrahit, pilitam in aqua inter cutem exigit per aluum.

Iuleb Rosatum.

Rx. Aquæ rosarū P ij. *

Sacchari clarificati P ij.

Fiat cum diligentia secundum artem.

F E B R I V M, thoracis, & ventriculi incensium, caloremque flammeum extinguit, sitim nexpletam sedat.

Iuleb

Iuleb Violatum.

* R^x. Aquæ violarum ℞ iij.

Sacchari clarificati ℞ ij.

Coque vt Iuleb Rosarum.

Febres, phlegmonas, pleuritidem, asperitatem gutturis & thoracis, ac tussim mitigat.

Miua Cytoniorum simplex D. Mesue.

R^x. Succi Cytoniorum depurati ℞ xij.

Coquantur ad medietatem, & affunde

A Vini veteris optimi ℞ v.

* Sacchari ℞ iij.

Coquantur secundum artem.

P. C. SCHOL.

A Vini ℞ v. Sacch. ℞ iij.] *Cordum hic Vini*
℞ viij. Sac. ℞ xij. perperam legentem, & Fuch-
sius quoque animaduertit. quare veram utro-
bique lectionem reposui.

VENTRICULUM roborat, & cibum in eo continet.

* *Miua Cytoniorum aromatica D. Mesue.*

R^x. Succi Cytoniorum acetosorum ℞ xx.

Vini veteris optimi ℞ x.

Mellis despumati optimi ℞ vj.

Potest tamen etiam cum Saccharo fieri.

Coquantur ad perfectionem, & aromati-
 zentur

zentur in sindone ligatis, cum

Cinnamomi electi

Cardamomi minoris ana ʒ iij.

Garyophyllorum ʒ ij.

Zingiberis

Mastiches ana ʒ j. β.

Croci ʒ ij.

Xyloaloës

Macis ana ʒ j. β.

Moschi ʒ j.

Galliae moschatae verae ʒ ij. *

Fiat secundum artem.

Mellis loco Saccharum sumi potest. *

VENTRICULUM, hepar, & cetera viscera roborat, appetentiam excitat, coctionem iuuat, vomitum & lyenteriam sedat.

Mel Rosarum D. Mesuae.

℞. Rosarum rubearum nondū penitus apertarum p ij.

Mellis optimi p vj.

Coquantur lento igne secundum artem.

STOMACHUM confortat & mundificat, & est digestium materialium phlegmaticarum in stomacho & meseraicis contentarum.

Mel

Mel Rosatum aliud efficacius.

℞. Foliorum rosarum rubearum nondum ex-
plicitarum contusorum P ij.

Coquantur in aquæ cælestis P iiij.

Colaturæ fortiter expressæ adde

Succi rosarum rubearum depurati

Mellis optimi despumati ana P iiij.

Coquantur secundum artem.

Oxymel simplex D. Mesuæ.

℞. Mellis optimi despumati P iiij.

Aceti vini acerrimi

Aquæ clarissimæ ana P ij.

Melcum aqua despumetur iterum diligen-
ter, & cum aqua fuerit consumpta, tunc adde
acerum, & coque secundum artem.

HUMORES crassos, lentos ac puitosos
incidit, extenuat, & abstergit, atque adeo ob-
structiones auferit, sputum educit, spiritumque
faciliorem reddit.

Oxymel compositum.

℞. Radicum Fœniculi

Radicum Apij ana ℥ iiij.

Radicum Petroselini Radicum Ruscæ

Radicum Asparagi Seminis Apij

Seminis Fœniculi ana ℥ j.

Coquan-

Coquantur in aqua clara ꝑ vj. aut quantum sufficit. Colaturæ adde

Aceti acerrimi ꝑ j.

Mellis optimi despumati ꝑ ij.

Coquantur secundum artem.

HUMORES crassos & pituitosos incidit, extenuat & abstergit: obstructions tollit icterici, lienis ac renum: urinam mouet, sudoremque euocat.

Oxymel Scylliticum simplex D. Mesua.

℞. Mellis despumati ꝑ iij.

Aceti scyllitici ꝑ ij.

Coquantur secundum artem.

HUMORES crassos, lentos, aulso contumaces separat: ob id confert ventriculi & aliorum viscerum affectibus hos humores sequentibus: rictum acidum sanat, & vesicæ mollificationem, seu urinæ incontinentiam.

Oxymel Scylliticum compositum.

℞. Radicum Apij

Radicum Fœniculi ana ℥ iij.

Radicum Petroselinii Radicum Rusci

Radicum Asparagi Seminis Apij

Seminis Fœniculi ana ℥ j.

Coquantur in aqua ꝑ vj. aut quantum sufficit.

Cola-

Colaturæ adde
 Aceti Scyllitici ℞ j.
 Mellis optimi despumati ℞ ij.
 Fiat secundum artem.

Id potentius multo incidit, tenuat, terget, obstructa aperit in diuturnis quartanis & quotidianis, quàm Oxymel compositum de radicibus.

Mel Anacardinum Azarauj.

℞. Anacardos recentes, terantur, & in aqua coquantur, donec melliginem quādam in rubeo colore fuscā emittant, eam aquæ innatantem auferto, & reponito.

Mel Emblicorum.

Mel Emblicorum, est mel in quo Emblici Myrobalani sunt conditi.

Alij verò vocant Emblicorum decoctum ad mellis consistentiam inspissatum.

Mel Passularum.

℞. Vuarum passarum ℞ iiij. Infundantur eis aquæ ℞ xij. aut q. s. & macerentur horis xxiiij. deinde coquātur ad remauentiam tertiæ partis. Colentur, & colatura decoquatur ad crassitudinem mellis, & reponatur. hoc decoctum vocatur Mel passularum.

193

S Y P V P I.

S Y R V P O R V M T R E S S E -
Q V E N T E S V A L E R I I C O R D I D E -
S C R I P T. H V I C E D I T I O N I N V N G
P R I M V M A C C E S S E R V N T.

Syrupus de Pyris Valerij Cordi.

Rx. Succi Pyrorum moschatellinorum
Succi Pyrorum Palatinorum
Sacchari clarificati ana p ij.

Coquantur secundum artem.

Et quoniam Pyra Moschatellina citius ma-
turefcunt, expressum eorum succum clarifica-
tum cum Saccharo decoctum repones, donec
etiam Palatina maturefcant. demum miscebis.

Syrupus de Cichorio Val. Cordi.

Rx. Rad. Fœniculi

Cichorij ana ℥ iiij.

Linguae cerninae Scolopendrij.

Capillorum Veneris

Trichomanes ana m j.

Aquæ Cichorij

Succi eiusdem ana p iiij.

Coquantur omnia secundum artem.

Colaturæ adde Sacchari clarificati p iiij.

Et species sequentes perix illigatas suspen-
de in Syrupo:

N

Rx. Rha-

R. Rhabarbari ℥ ij.
 Rad. Spicæ Romanæ ℥ j.
 Fiat Syrupus.

Syrupus Refectiuus Val. Cordi.

R. Dactylorum enucleatorum
 Ficum siccarum pinguium
 Xyloceratiorem enucleatorum
 Vuarum Cubebarum passarum
 Vuarum passerū vulgariū maiorū & minorum
 Tamarindorum enucleatorum ana ℥ iij.
 Musti generosi recentis
 Succu Cydoniorum ana ℥ vj.

Incidentur fructus in partes, Passulæ minores & Xyloceratia modicè contendantur, vnumquodque per se. Deinde misceantur omnia, & in fictili denso affundatur eis succus & mustum, macerenturque horis xxiiij. Postea coquantur lento igne ad consumptionem tertiæ partis aut amplius.

Colaturæ affunde lactis Amygd. cum aqua rosea ℥ ij. ex vna libra Amygdalarum dulcium tritarum expressi.

Clarificetur deinde cum albuminibus onorum xij.

Huic decocto clarificato adde Sacchari clarificati ℥ ij. Coquan-

Coquantur ad perfectionem: & cum reponis, tam suspende in Syrupo sequentes species crassiusculè tritas, & in sindone ligatas.

℞. Cinnamomi interioris optimi

Macis Nucis moschatæ Cardamomi

Zingiberis Galangæ Zedoariæ

Garyophyllorum ana ʒ ʒj.

Ligni aloës ʒ iiij.

Huiusmodi dilutū vel decoctū fructuū horum, vel alicuius eorū vocant Arabes Nabuch, quo utuntur pro vino & melle in calidis regionibus.

H v n c Syrupum composui diuitibus quibusdam in chronicis morbis, omnem cibum & potum auersantibus, & comperi mirum in modum vires reficere, alere, & iam desperatos, & focillatis viribus sanitati restituere.

R O B.

Rob de Ribes simplex.

℞. Succu ribes ʒ viij.

Coquatur per se ad spissitudinem mellis, & reponatur.

Rob de Ribes compositum.

℞. Succu Ribes ʒ iiij.

Sacchari optimi ʒ ij.

N 2

Coquan-

Coquantur secundum artem.

VENTRICULUM firmat, vomitum biliosum reprimat, sitim restinguit, aliasque excretiones biliosas sistit.

Rob de Berberis simplex.

Rx. Succī Berberis P viij.

Coquatur per se vsq. ad mellis spissitudinē.

Rob de Berberis compositum.

Rx. Succī Berberis P iiij.

Sacchari optimi P ij.

Coquantur secundum artem.

R O B ex Oxyacantha seu de Berberis, easdem quas præcedens facultates obtinet.

Rob Nucum D. Mesue.

Rx. Succī Corticum viridiū iuglandium P iiij.

Mellis optimi P ij.

Coquantur secundum artem.

Destillationi tenuium humorum à capite, & inflammationem excitantium confert.

Diamorum, descriptione Nicolai.

Rx. Succī Mororum Celsi P β.

Succī Mororum rubri P j.

Mellis optimi despumati P j.

Sapæ ℥ iiij.

Coquantur secundum artem.

Contra

Contra depascētia oris vlcera, ad dentium affectus & gingiuarum noxas, atq. ad omnia oris vitia gargarizatus proficit.

Diamoron aliud D. Val. Cordi.

℞. Succi Mororum rubi

Succi Mororum rubi Idæi

Succi Mororum Celsi siue de arbore

Succi Fragorum ana ℥ ij.

Mellis despumati optimi ℥ iij.

Coquantur lento igne secundum artem.

MORORVM omnium succus exprimendus est antequam perueniant ad maturitatem Porro Mora rubi Idæi & Fraga citius maturescūt, quàm alia: ideo oportet ut horum Succus colligatur, & cum Saccharo decoctus reponatur, donec alij maturescant. Sint autem succi vniuscuiusque ℥ ij. Sacchari ℥ j. ad quamvis eorum, id est, Sacchari ℥ ij.

RVBVS Idæus est ille rubus, quem nos vocamus Himpen: eius mora siue fructus vocantur Himpeer.

Medulla siue pulpa seu Rob Cerasorum.

℞. Cerasorum acetosorum quantum volueris, coque per se, sine humore aliquo, & per cribrum seracem manibus exprime, & ad spissitudi-

N 3

tudi-

tudinem iustam coque, ac sine Saccharo reponne, vt medullam Prunorum. Poterit qui volet etiam cum Saccharo conficere.

Diamarenatum simplex.

℞. Amarena Cerasa quantum libuerit, & cum medico vino coque, coctas per cribrum manibus exprime, expressam deinde pulpā ad spissitudinem coque, & deinde

℞. Inspissata pulpæ ℥ xij.

Sacchari clarificati & inspissati ℥ viij.

Confice secundum artem.

AMARENAE sunt magna Cerasa gustu vinosa, quae Germanicè vocantur Amarellen, Ammerlinghe, & Amelber.

Diamarenatum compositum.

℞. Diamarenati simplicis iam confecti, & adhuc calidi ℥ iiij.

Cui insperge sequentes species in minutissimum puluerem tritas:

℞. Cinnamomi

Nucis moschatae ana ℥ i

Zingiberis

Galangae ana ℥ iiij.

Cardamomi Caryophyllorum Macis

Ligni aloës ana ℥ ij.

Confice

Confice secundum artem.

Ad hunc modum potes etiam facere confectio-
nes ex Cynosbatis & Cornis, hoc est,
Corni fructibus.

L O H O C H.

Lohoch sanum & expertum D. Mesua.

℞. Cinnamomi Hyssopi
Glycyrrhizæ ana ʒ iiij.
Iniubarum
Sebesten ana numero xxx.
Passularum enucleatarum
Ficuum siccarum
Dactylorum pinguium ana ʒ ij.
Fœnogræci ʒ v.
Capilli Veneris m j.
Anisi Fœniculi Ireos Seminis Lini
Calaminthæ ana ʒ iiij.

Coquantur secundum artem in aquæ cla-
rissimæ ℥ iiij. ad consumptionem ℥ ij.

Colaturæ expressæ adde

Penidiarum ℥ ij.

Coquantur ad perfectionem, postea insper-
ge subsequentiâ minutissimè incisa & tusa.

℞. Piacearum mundatarum ʒ v.
N 4 Amygda-

Amygdalorum dulcium mundatorum

* Glycyrrhizæ Tragacanthæ Gūmi Arabici

* Amyli ana ʒ iiij.

Ireos ʒ ij.

Agitentur omnia simul celerrimè, donec albescat.

T v s s r vocisq̃ asperitati à frigiditate natæ auxilio est, crassos in thorace & pulmone humores extenuat.

Lohoch de Pino D. Mesua.

* R. Pincarum ʒ xx.

Amygdalorū dulcium Auellanaŕū assatarum

Tragacanthæ Gummi Arabici Glycyrrhizæ

* Succi Glycyrrhizæ

Amyli Capilli Veneris

* Ireos ana ʒ iiij.

Carnium dactylorum ʒ xxxv.

A Amygdalorum amarorum ʒ iiij.

Mellis passularum Butyri recentis

Sacchari Tabarzeth ana ʒ iiij.

Mellis Tabarzeth p. iiij. ʒ j. ʒ iiij.

Conterenda cōrundantur, & incidenda inciduntur minutissimè, & cum melle excipiātur.

MEL Tabarzeth est optimū, sincerissimū atq. odoratissimum mel, quale ex Dantisco affertur.

P. C.

Amygd. am. ʒ iiij.] *Cum Cordus hic peruer-* A
se ʒ iiij. posuisset, ʒ iiij. tantum legendas esse,
Euchfio quoque astipulante, dico.

T v s s i diuturnæ, difficultati spiritus, &
 asthmari succurrit: humores in thorace crassos
 incidit, & extenuat.

Loboch de Papauere D. Mesue.

℞. Papaueris albi	ʒ xxv.
Amygdalorum dulcium	Pinearum
Gummi Arabici	Tragacanthæ
Succi Glycyrrhizæ	ana ʒ x.
Amyli	ʒ iiij.
Seminis Portulacæ	Seminis Lactucæ
Seminis Cytoniorum	ana ʒ iiij.
Croci	ʒ j.
Penidiarum albarum	ʒ iiij.
Syrupi de Papauere	℞ iiij.

Omnia contundantur & incidantur atque
 cum Syrupo excipiantur, secundum artem. Por-
 ro iste Syrupus de Papauere sic fieri debet.

℞. Capitum Papaueris albi recentium	
Capitum Papaueris nigri recentium	ana ʒ vj.
Seminis Lactucæ	
Florum Violarum	ana ʒ j.
N s	Aquæ

Aquæ quantum sufficit, aut ꝑ viij.

Coquantur, & colaturæ adde
Sacchari ꝑ iiij.

Coquantur ad spissitudinem.

*Hoc Lohoch de Papanere appellatur etiam
alio nomine Diapapaner.*

Iuuat tussim, & gutturis asperitatē à catar-
rho calido, tenui (quem sputū liquidum indi-
cat) cum enim coquit, & crassat. Cōfert etiam
febris ardentibus, dolēti thoraci, pleuritidi.

Lohoch de Scylla D. Mesue.

Rx. Succī Scyllæ

Mellis despumati ana ꝑ j.

Coquantur secundum artem.

SCYLLA propriè succum non habet, sed mu-
cilaginē, quæ sic est colligenda:

Rx. Scyllas crudas tres aut quatuor, eius lami-
nas puriores, plenas & nitidas, in partes incidi-
to cultello eburneo: deinde in pila siue mortario
fctili aut lapideo siue marmorea atterito cum
agitaculo ex ligno Guaiaco siue sancto facto, &
deinde exprime & utere.

E C L E G M A de Scylla, materiam cras-
sam, lentam, coctū difficilem in partibus re-
spiratoriis, expelli facilem strenuè reddit, &
natam

natam inde spirandi difficultatem, & thoracis dolorem leuat.

Loboch de Pulmone vulpis D. Mesua.

℞. Pulmonis vulpini ficcati

Succi Glycyrrhizæ

Seminis Anisi

Seminis Fœniculi

Capilli Veneris ana ℥ j.

Sacchari clarificati ℥ xv.

Conterantur omnia tenuissimè, & cum Saccharo excipiantur.

ABSTERGIT & consolidat vlcera pectoris & pulmonis, & præferendum est aliis remediis in phthisi.

Loboch ad Asthma D. Mesua.

℞. Scyllæ aslatæ ℥ iij.

Radicum Ireos ℥ ij.

Hyslopi

Prassij ana ℥ j.

Myrrhæ rubæ

Croci ana ℥ β.

Cū mellis quantitate sufficenti fiat Loboch.

Ad asthma & tussim antiquam valet: humorem enim crassum tenuat.

LENI-

L E N I T I V A.

ET SOLVTIVA.

FLORES CASIAE FISTV-
LAE SOLVTIVAE.

℞. Cannas seu siliquas Casiae ponderosas, & quæ non resonant cõcussæ, aperi eas & contentam in eis pulpam seu medullam cum laminis & seminibus suis diligenter euacua, exempta proiice super inuersum & angustum cribrum setis equinis contextum. Cribrum deinde pone supra bullientis aquæ vaporem, & auerso cochlearis conuexo Medullam Casiae hinc & inde ducito, vt per cribrum paulatim excernatur, & si quid excretum est, aut penetrauerit, confestim subinde auferto, ne plus quàm necesse est de vapore imbibat: idque tamdiu facito, donec quantum voles, collegeris. Porro cùm necessitas requirit, semper recentes exprime Casiae flores: repositæ enim acescunt.

Si quis Casie flores siue pulpam magis solutiuam reddere voler, in bullientem aquam proiciat folia Persici, aut flores Persici, & Prunellorum siluestriũ, aut omnia hæc simul: horum

ūenim vapor & destillata aqua soluit aluum.

Mundificat sanguinē, & compescit omnem
cuitarem, & sedat sitim, & propriē cum succo
Endiuia aut Taraxici, depurato secundum ar-
tem. Mundificat stomachum, & educit cho-
leram & phlegma, sine nocumento & excessu;
pareret enim mordicatione. Et lenit pectus &
guttur, ac resoluit apostemata acuta in eis. Et
confert calefactioni renum sumpta cum diu-
reticis & infusione Glycyrrhizæ, & prohibet
generationem lapidis in eis, & confert febris-
ous calidis.

Diacasia cum Manna.

℞. Prunorum Damascenorum ℥ ij.

Florum Violarum m. j. β.

Aquæ fontanæ ℥ xvij.

Bulliant secundū artem vsq. ad medietatis
consumptionem: Cola, & in colatura dissolue

Pulpæ Casiæ ℥ vj.

Pulpæ Tamarindorum ℥ j.

Mannæ optimæ Calabrinæ ℥ ij.

Syrupi Violarum ℥ iiij.

Sacchari Candi

Sacchari Penidij ana ℥ j.

Sacchari Violati ℥ iiij.

Confice

Confice secundum artem.

*Pulpa Tamarindorum fit ut Pulpa Casia, si-
ne flores Casia.*

Est pro delicatis qui habent stipticū ven-
trem: non enim est ingrati saporis, nec mole-
sta, sed salubris: lenit viscera, subducit aluum,
purgat choleram, & mitigat febres.

Casia extracta sine foliis Sena.

- ℞. Prunorum numero xij.
 Violarum m j.
 Hordei mundi Anisi Polypodij
 Seminis Cartami ana ℥ v.
 Capillorum Veneris Thymi
 Epithymi ana m ℞.
 * Passularum exacinatarum ℥ ℞.
 Fœniculi seminis ℥ ij.
 Seminis Portulacæ
 Seminis Maluæ ana ℥ iiij.
 Glycyrrhizæ ℥ iiij.
 Fiat horum decoctio in sufficienti quanti-
 te aquæ: colentur, in colatura dissolue
 Pulpæ Casiæ ℞ ij.
 * Pulpæ Tamarindorum ℥ j.
 * Cinnamomi ℥ iiij.
 Sacchari optimi ℞ j.

Coquantur.

Coquantur ad perfectionē secundū artem.

Casia extracta cum foliis Senæ.

℞. Confectionis Casiæ extractæ sine foliis
Senæ ℞ ij.

Pulueris foliorum Senæ ℥ ij.

Misce secundum artem.

FACILE soluit, lenit asperitatem intesti-
norum, remouet stipticitatem, & ventris
onus subducit, & morbis cholericis & melan-
cholicis auxilia præbet.

Casia extracta pro clysteribus.

℞. Violarum [id est, florum Violarum.]

Violariæ [id est, foliorum violarum.]

Maluæ Mercurialis Betæ

Parietaræ ana m j.

Fiat horum decoctio in sufficienti aqua, cu-
jus beneficio Casia extrahatur, & cannæ eius
interius lauentur. Deinde

℞. Pulpæ Casiæ cum hac decoctione extractæ
& ad spissitudinem coctæ ℞ j.

Sacchari ℞ j. β.

Coque ad perfectionem secundum artem.

Quidam addūt Diacridiū sine Scammoneam.

Sed hoc nemo faciat insciis Doctoribus Me-
dicis.

P A R I E-

P A R I E T A R I A E, videlicet vera, quæ circa macerias & muros nascitur sub stillicidiis tectorum, & non siluestris istius herba luteis floribus, quæ dicitur Germanicè Tag und nacht.

E s t lenitiua ventris & lenis, & est medicina pro delicatis, carens acuitate & mordicatione, & omni excessu lædente.

Electuarium Lenitiuum.

℞. Passularum enucleatarum	℥	ij.
Adianti nigri	Violarum	
Hordei mundi	ana	m. j.
Iuiubarum	Sebesten	ana num. xx.
Glycyrrhizæ	℥	℞
Prunorum enucleatorum		
Tamarindorum	ana	℥ vj.
Senæ	Polypodij	ana ℥ ij.
Mercurialis	m.	j. ℞.

Decoquantur secundum artem in sufficienti aqua: cola, & in colatura dissolue

Pulpæ Casiæ	Pulpæ Tamarindorum
Pulpæ Prunorum	Sacchari optimi
Sacchari violati	ana ℥ vj.
Pulueris Senæ	℥ iij. ℥ iij. ℞.

Confice secundum artem.

A D I A N T U M nigrum, est Capillus Veneris verus qui à Lugduno affertur.

V s v s

Vsvs eius est in febribus humoralibus & pleuresi; lenit enim & mollit intestina, & delet eorum stipticitatem: facillè soluit sine molestia & læsione choleram phlegmaticam & melancholicam.

Electuarium Lenitium de Manna
Nicolai Alexandrini.

℞. Capillorum Veneris
Scolopendriæ [*hoc est, Ceterach vocata.*]
Hepaticæ [*hoc est, Lichenis.*] ana ℥ iij. *
Seminis Cucurbitæ Seminis Citrulli
Seminis Melonis Seminis Cucumeris
Violarum ana ℥ j.
Prunorum Damascenorum num. xx.

Coquatur in aqua ad dimidias, deinde percolentur cū expressione, in colato dissoluantur

Mannæ optimæ puræ
Sacchari violacei
Pulpæ Casiæ recens extractæ ana ℥ iiij. *
Tamarindorum
Sacchari rosacei ana ℥ j. *

Sacchari albissimi ℞ iij.

Concoquantur ad mellis consistentiam: postremò species sequentes iniiciantur,

Nucleorum seminis Melonis
O Seminis

- | | |
|---------------------|-------------------|
| Seminis Cucumeris | Seminis Cucurbitæ |
| Seminis Citrulli | Florum Violarum |
| Florum Nymphæ | Seminis Lactucæ |
| Seminis Scariolæ | |
| * Seminis Portulacæ | ana ℥ j. |
| Rhabarbari electi | |
| * Foliorum Senæ | ana ℥ j. ℥ j. |

His accuratè commistis & subactis, conficiatur electuarium.

Utile est ad purgandum sanguinem, ad choleram reprimendam & melancholiam: valet etiam ad hepar calefactum, & corpus uniuersum perpurgat.

Electuarium de Sebeste D. Bartholomæi Montagnana.

- ℞. Sebesten sine nucleis
 Prunorum siccorum enucleatorum
 Tamarindorum ana ℥ v.
 Aquæ Violarum ℥ j.
 Aquæ Ireos
 A Aquæ Angutiæ ana ℥ vj.
 Succu Mercurialis depurati ℥ iij.
 Penidiarum ℥ iij.
 Diapruni simplicis ℥ j. β.
 Nucleorum seminis Cucurbitæ

Cucu-

Cucumeris Melonis

Citrulli ana ℥ j.

Diagridi ℥ iij. β.

Caro siue pulpa Sebesten, Prunorum & Tamarindorum minutissimè teratur, & cū aquis extrahatur. Semina verò minutissimè incendantur, & reliquis misceantur, & fiat secundum artem Electuarium.

ANGURIA est Melon magnus, viridis, alio nomine vocatur Albateca, siue Batega, & Melon Indus. Quidam per aquam Anguria intelligunt succum eius, & non male: nam hic magis aluum lenit.

P. C. SCHOL.

Aquæ Anguriæ.] Anguriam esse Melonem A seu fructum magnum, ex viridi & subpallido foris interstinctum, siue variegatum anguis modo, unde illi nomen; oblongum, insipidum cum laure, semine maiusculo, rubro, una cum Francisc. Alexandrini Apolline existimo, & falli Fuchsum dico.

CONFERT febribus cholericis interpositis, & continuis puris, & sedat acuitatem febrilem, sitim & vigilias, & etiam amaritudinem remouendo, & educit materias acutas à viis vrinalibus & vesica.

O 2.

Medulla

Medulla siue Pulpa Prunorum.

℞. Prunorum magnorū acetosorum & vinosorum quantitatem, quam volueris, & exemptis nucleis in fictili vitreato magno coquito, deinde per cribrum setaceum exprimito, expressam pulpam iterum lento igne ad perfectam & instam spissitudinem coquito, & sine Saccharo reponito.

Porro si medullam Prunorum laxatiuam requiris, ex dulcibus prunis, aut prunis Hungaricis magnis exiccatis conficito.

Medulla Prunorum vinosorum, calorem & sitim in febribus mitigat, & melius est vt conseruetur sine Saccharo, Cerasorum modo inspissata.

Diaprunum compositum non laxatiuum

D. Nicolai.

℞. Prunorum Damascenorum electorū num. centum.

Coquantur in modica aqua, donec emolliantur: excola, deinde decoctum eorum priuatim reponens, ipsa verò pruna super inuersum & vasi impositum cribrum ponantur, & manibus hinc & inde ducantur, & premanantur, donec omnis eorum pulpa penetrauerit, &

& cutis cum nucleis tantum remaneat. Colle-
ctam deinde pulpam, & excolatum eorum de-
coctum in quo bullierint, violarum ℥ ℞. lento
igne ad spissitudinem coquito. Melius esset, si
Prunorum pulpa per se inspissaretur, & si cum
decocto prunorum & violarum pulpa Tama-
rindorum extraheretur.

Deinde cum inspissaueris,

℞. Pulpæ inspissatæ ℞ j.

Sacchari clarificati ℞ ij.

Pulpæ Tamarindorum

Pulpæ Cassiæ ana ℥ j.

Agita omnia simul supra ignem: deinde in-
sperge sub sequentium specierum puluerem.

℞. Santali albi Santali rubri

Spodij Rhabarbari

Cinnamomi ana ℥ iij.

Rosarum Violarum

Seminis Portulacæ Seminis Scariole

Seminis Berberis Succu Glycyrrhizæ

Tragacanthæ ana ℥ ij.

Seminis Cucurbitæ

Seminis Cucumeris

Seminis Citrulli

Seminis Melonis ana ℥ j.

Confice secundum artem.

O 3

Dicitur

Dicitur etiam hæc confectio Diadamasce-
num, à prunis Damascenis, quæ capit.

Quidam ponunt prunorum non numero
centum, sed $\text{℥} \text{ij}$. verum malè: nam ex Nicolao
Alexandrino omnes alij hanc compositionem
desumpserunt.

Quædam exemplaria non habent Cinna-
momum: sed Nicolaus Alexandrinus id ipsum
ponit: & nisi ingrederetur Cinnamomi pon-
dus, confectio hæc esset manca: nam Nico-
laus Alexandrinus scribit totam confectio-
nem habere $\text{℥} \text{ij}$. & β . & sic est. Impressi ta-
men codices mendosi sunt, habent enim $\text{℥} \text{ij}$.
& β . Ita pro ciphra 3. posuerunt 2. facili
errore, non tamen condonando.

*Nicolaus Alexandrinus nō ponit semen Cu-
cumeris: nam si posuisset, dixisset confectio-
nem habere $\text{℥} \text{ij}$. & β . & $\gamma \text{ j}$. Itaque $\gamma \text{ j}$. seminis
Cucumeris, adiecta est à posterioribus, nihil
tamen refert, cum potius conducatur.*

*Per semina Cucurbitæ, Cucumeris, &c. debet
intelligi exempta eorum medulla. idq; semper in-
telligendum est, cum pulueres horum seminum
ingrediuntur in confectioes quasunque.*

P. C. SCHOL.

Cinnamomi.] Cinnamomum ex hoc medi-
camento

camento erroneè reiicit Fuchsius, cum vetera plurima exemplaria id contineant: quod rationibus etiam constare demonstrari posset.

DATUR acutas & peracutas patientibus, & maxime Causoni & Synocho in principio, in augmento & statu ægitudinis. Et sine Diacridio potest exhiberi in omni hora diei. Cum Diacridio verò, in aurora matutinali, & cum cautela, quoniam est solutivum forte.

Diaprunum compositum laxativum

D. Nicolai.

℞. Diapruni non laxativi adhuc recentis & calidi ℥ iiij.

Scammonæ præparatæ ℥ ij.

Misce & reponc.

Diacatholicon Nicolai.

℞. Pulpæ Casiæ fistulæ

Pulpæ Tamarindorum

Semæ mundatæ ana ℥ ij.

Rhabarbari Violarum Polypodij

Anisi ana ℥ j.

Penidiarum

Sacchari Candi ana ℥ j.

Glycyrrhizæ Seminis Cucurbitæ

Seminis Citrulli Seminis Cucumeris

℥ 4

Seminis

Seminis Melonis ana ʒ ij.

Conterenda cōterantur, & seminū quatuor
maiorum nuclei incidantur: postea omnia si-
mul conficiantur, cum subsequenti syrupo:

* R. Polypodij ʒ iiij.

Coquatur in aqua celesti q. s. addendo
Sacchari optimi ℞ ij.

*Nicolaus Alexandrinus hāc confectiōē vo-
cat Catholicū, è quo desumpta est: is paulò aliter
eā describit. sed quia impressum Nicolai exem-
plar in hac cōfectiōe valde mendosum est, ma-
lui ex concordia aliorū traditione hāc adscribere.*

C O N F E R T acutis & peracutis morbis:
emollit enim, alterat, roburq. addit iecinoro-
sis & lienosis.

Electuarium Indum maius D. Mesue.

R. Cinnamomi Garyophyllorum

Spicæ Indicæ Rosarum

Cassiae lignæ veræ [aut succedanei eius.]

Macis

Cyperij [videlicet rotundi.] ana ʒ iiij.

Santali Citrini ʒ ij. ℞.

Ligni aloës

Nucis moschatæ ana ʒ ij.

* Turbith optimi ʒ l. [.i. quinquaginta.]

Sacchari

Sacchari

Penidiarum ana ℥ xx.

Galangæ Cardamomi maioris

Cardamomi minoris Asari

Mastiches ana ℥ j. β.

Diagridij ℥ j. ℥ iiij.

Omnia terantur, & cum oleo Amygdalino
dulci fricentur, & cum subsequenti syrupo con-
ficiantur.

℞. Succi Cytoniorum

Succi Granatorum Succi Apij

Succi Fœniculi omniū depuratorum ana ℞ β.

Mellis despumati optimi ℞ iiij. ℥ iiij. A

Decoquantur succi cum melle ad spissitu-
dinem iustam secundum artem.

P. E. SCHOL.

℞ iiij. ℥ iiij.] Cum Mellis triplum ad reli- A
quorum pondera Cordus plerumque requirat,
hic Mellis ℞ iiij. β. posuerat, ingredientia Sac-
chara pulueribus ceteris cōnumerans, quod ali-
cubi tamen non effecit. Itaque num Sacchara
pulueribus sint annumerāda, ut ea ratione Mel
quoque triplicandum sit, nihil hic Fuchsius, ni-
hil Dessenius, nihil Apollo fatu dignum; ut
nec in Amygdala, Pineas. Dactylos recipien-
tibus medicamentis; cūm alioquin futilibus in-
cerdum

O s

terdum paginas repleant. Ceterum (*ut hic id obiter dicam*) huius iam narrati dubij, Diaphanicon admodum est controuersum.

EXCREMENTA humorū, maximè pituitosorum ac putridorum, ventriculo & aliis nutritoriis instrumentis educit, crassos in iis etiam flatus dissoluit, malaque hinc nata sanat: verbi gratia, inflationem ventriculi, colicos & renum dolores.

Electuarium Indum minus D. Mesue.

A ℞. Turbith optimi ℥ vj.
 Sacchari tantundem Macis
 Garyophyllorum Piperis Zingiberis
 Cinnamomi electi Cardamomi maioris
 Nucis moschatae ana ℥ vij.
 Scammoneae correctae ℥ xij.
 Mellis optimi despumati triplum, hoc est ℞ ij.
 * ℥ j. ℥ j.

P. C. SCHOL.

A Turbith ℥ vj.] Mihi, Dessennio, aliisque videtur Cordus hic mutilus, Turbith tantum sex drachmas huic medicamento indens, centum drachmas in Mesue scriptum fuisse dicentibus multis. Ego verò cū nulla ratione centū drachmas admittere queam, medicamento in scriptio-
 nis

is ratione habita, qua Indum minus appella-
tur, vix quinquaginta drachmas admittendas
esse cōcedere possum, ut in Indo maiori: ni in am-
abus idem Scammonij pondus citra controuer-
siam cerneretur. De decem tantum drachmis
aut duodecim, deq; viginti quinque drachmis le-
gentibus quibusdam exemplaribus nunc nihil
alio. Tanta est hoc in pondere hic varietas.

Interim si Turbith pondus prater Cordimen-
tem augetur, augenda quoque erit pro triplici-
tatis ratione mellis quantitas.

HABET intentionem maioris.

Confectio Hamech maior D. Mesua.

℥. Myrobal. Citrinorum	℥	iiij.
Chebulorum	Indorum	
Rhabarbari	ana	℥ ij.
Agarici	Colocynthidis	
Polypodij quercini	ana	℥ xvij.
Abinthij	Thymi	
Senæ	ana	℥ vj.
Violarum	℥	xij.
Epithymi	℥	ij.
Anisi	Fœniculi	
Rosarum	ana	℥ vj.
Succi fumi terræ	℥	j.

Pruno.

Prunorum numero LX.

Passularum maiorum enucleatarum ℥ vi.

Infundantur omnia in feri quantitate suffi-
cienti, & ponantur in vitreato vase angusti
orificij bene obturato, & dimittantur per dies
quinque. Postea ad ignem ferueant vna at-
que altera ebullitione: deinde colentur: in
parte colaturæ dissolue

Pulpæ Casiæ ℥ iiij.

* Pulpæ Tamarindorum ℥ v.

Mannæ ℥ ij.

Agitentur simul, & adiciatur

* Sacchari in altera colaturæ parte clarificati
℥ j. β.

Coquantur simul ad mellis spissitudinē: de-
inde aspergatur subscriptarū specierū puluis:

* Scammoneæ bonæ ℥ j. β.

Myrobal. Citrinorum

Chebulorum

Indorum ana ℥ β.

Bellericorum

Emblicorum

Rhabarbari

Seminis fumi terræ ana ℥ iiij.

Spicæ nardi Indicæ

Anisi ana ℥ ij.

Confice

Confice secundum artem.

MORBIS omnibus ex flaua bile & pituita salsa natis, nempe impetigini, scabiei, elephantiae & cancro succurrit. In summa, omni forditati cutis à biliosis, & adustis humoribus procreatae conuenit.

Confectio Hamech minor D. Mesua.

℞. Myrob. nigrorum [*id est, Indorum.*]

Chebulorum

Epithymi ana ℥ i.

Fumi terræ

Absinthij ana ℥ xx.

Thymi Calaminthæ Polypodij quercini

Agarici Glycyrrhizæ

Buglossæ ana ℥ x.

Stæchados Arabicæ

Chamædryos [*videlicet vera.*]

Chamæpityos [*id est, Ina moschata.*]

Bedeguaris [*eius loco sume Carduū benedictū.*]

Anisi ana ℥ v.

Prunorum Iuinbarum

Sebesten ana num. lxx.

Passularum enucleatarum ℞ j.

Decoquātur in aqua sufficienti vsq. ad tertias: Colētur, & colaturæ addantur Sapæ ℞ ij.

Mellis

Mellis despumati ℞ j.

• Scammoneæ correctæ ℥ ij.

Coquantur lento igne vsque ad mellis spissitudinem.

P V R G A T Melancholiam, & vltos humores alios: ob id confert mania, melancholia, vertigini, obliuioni, & vitiis cutis, qualia sunt pfora, id est, scabies, morphæa, cancer, elephantia, imperigo.

Diaphœnicon D. Mesuæ.

℞. Dactylorum Hieron enucleatorū, ac tribus diebus in aceto maceratorum ℥ ij. ℥ ij.

Penidiarum ℥ j. ℥ j.

Amygdalorum ℥ v.

• Turbith ℥ v. ℥ ij. β.

• Scāmoneæ [.i. Diagridij.] ℥ ij. aliis ℥ iij. ℥ ij.

Zingiberis Piperis longi Foliorum Rutæ

Cinoamomi Macis Ligni aloës.

Anisi Fœniculi Dauci

Galangæ ana ℥ j. ḡ v.

Mellis despumati triplum, hoc est, ℞ j.

℥ iij. ℥ vj.

Fiat secundum artem electuarium.

P. C. SCHOL.

• Mirum est in hoc tam frequentis vsus, tamq̃ dubiosa

subiosa atq. difficilis compositionis medicamen-
to, adeo ut etiā à duobus Pharmacopœis vix eo-
dem concinnetur modo; mirum inquā hic silere,
nihilq. ferj dicere (vt Euchsij sileam) Francisc.
Apollinem, eundemq. tam insipidū esse, vt quid
per Amygdala absolutē hic posita, intelligen-
dum quantum Scammonij (nam admodum di-
uersa est lectio) quantum Mellis, in quo hoc loca
grandior, quā in quouis alio medicamēto, car-
lo versari deberet. sumendum sit, nihil Apolline
lignum proferat, aut ridicula indicet atq. scri-
bat: cum tamen plurimis locis, verborum ac vo-
caminum multas myriades temerē ac futili-
ter effundat Quoniam verò (quantum ad Mel-
lis quantitatem attinet) se neque hic uniuersali
regula abuti velle dicat Franciscus (per quam s.
Mellis triplum intelligat) nōne libra. nouem.
Mellis hic sumenda erunt admodū à tribus pro-
cul? Num igitur ad auctoris mentē compositio-
nem hanc se restituisse, vt inquit, gloriari debet?
Hunc itaque, hunc Apollinem consulat Phar-
macopœus oportet, vt radius eiusdem illumina-
tus (nam undique ferē est sibi similis) unde qua-
que etiam cecutiat atque exorbitet.

Febribuscōpositis & diuturnis auxiliatur,
Bilem enim flauam & pituitam ducit. Colicis
cruc-

cruciatibus mirificè cōfert: itē doloribus ven-
tricoli, & aliis malis ex crudo humore ortis.

Diaphœnicon in forma solida.

℞. Dactylorum infusorum in aceto tribus die-
bus ac noctibus numero vj.

Seminis Ligustici ʒ ij.

Pineorum nucleorum

Amygdalorum dulcium ana ʒ xv.

Turbith ʒ xij.

Diagridij ʒ xj.

Sacchari Candi ʒ ij.

Piperis longi Zingiberis Foliorum Rutæ

Cinnamomi Macis Fœniculi

Anisi Dauci Galangæ

Ligni aloës ana ʒ j.

A Sacchari ℞ j.

Fiat confectio in rotulis, secundum artem.

*Ista confectio solida Diaphœnicum plerisque
medicis est vsu.*

P. C. SCHOL.

A ℞ j.] *Mutilum in hac Sacchari quantitate
esse Cordū, si ad precedentis Diaphœnici, aliā-
ne cum Saccharo paratorum medicamentorum
rationes contuleris, necesse est; Typographi for-
san vitio. In eandem nihilominus nassam satis
impru-*

imprudenter, immò pueriliter cecidere Fuchs.
 & nonnulli alij: ita tacus caco duce labitur.

Diasena D. Nicolai.

℞. Senæ ℥ iij.
 Auellanaꝝ tostataꝝ num. x.
 Stictici tosti ℥ ij.
 Lapidis Armeni loti ℥ j.
 Lapidis Lazuli loti ℥ ij.
 Sacchari ℥ vi.
 Cinnamomi ℥ j.
 Garyophyllorum Galangæ Piperis
 Spicæ nardi Indicæ Ocymij
 Foliorum Garyophyllorum Cardamomi
 Croci Zingiberis Zedoariæ
 Florum Rosismarini
 Macropiperis ana ℥ ij.
 Mellis despumati ℥ ij.

LAPIS Armenus est similis lapidi Lazuli,
 sed nō est tantopere caruleus, sed magis viridis.

FOLIA Garyophyllorum sunt similia foliis
 Lauri, & odorem atq. saporem habent Garyo-
 phyllorum: eorum loco sume Garyophyllos ipsos.

Succurrit melancholicis, mania vexatis, &
 quartana tristitiaq. affectis, lienosis, & omni-
 bus malis ex atra bile procreatis.

P.

Bene.

*Benedicta laxativa D. Nicolai.*R². Turbith electi

Sacchari ana ʒ

A Diagridij Esulæ Hermodaetylorum

Rosarum ana ʒ

Garyophyllorum Spicæ nardi Indicæ

Zingiberis Croci Saxifragiæ Macropiperis

Amomi [sumatur Acorus verus eius loco, vel
Calamus aromaticus.]

Cardamomi minoris Seminis Apij

Salis Gemmei Galangæ Macis

Carui Fœniculi Seminis Asparagi

Seminis Rusci [id est, Brusci.]

Granorum folis [id est, Mili folis.] ana ʒj.

Mellis despumati optimi tripulum, hoc est ʒj.

* ʒ v. ʒ v.
Confice secundum artem.*Per semina Asparagi & Rusci intellige car-
nem & pulpam eius: reiectis nucleis ossibus.*

P. C. SCHOL.

A Esulæ.] Nullo pacto placent Fuchsii alio-
rumq; sententia, hic Esulæ ʒx. esse sumendas ar-
bitrantes: etenim cum Cordo ʒv. sufficere bona
ratione dico Brevis undique esse cogor.

H Y M O R E S pituitosos, potissimum ad

articu-

articulos decumbentes, elicit. A renibus quoque & vesica purgat.

Electuarium Eleschhof siue Episcopi

D. Mesue.

2. Scammoneæ Antiochenæ
 Turbith optimi ana ʒ vj.
 Garyophyllorum Cinnamomi Zingiberis
 Myrobal. Emblicorum Nucis moschatae
 Polypodij ana ʒ ij. ʒ.
 Sacchari ʒ vj.
 Mellis despumati triplum, id est ʒ x. ʒ j.

P. C. SCHOL.

Sacchari ʒ vj.] *Præter exempla ex Mesue, præterq[ue] rationes, Fuchsius & Frācisus Alexand. hic ʒ vj. legunt.*

BILEM flauam & pituitā elicit, flatus quoque expellit, doloribus articulorum, laterisque prodest, itemque colicis cruciatibus, ad renes etiā & vesicā decumbētes humores expurgat.

Electuarium de Psyllio D. Mesue.

2. Succi Buglossæ domesticæ
 Succi Buglossæ agrestis Succi Endiuie
 Succi Apij, omnium coctorum & despumatorum ana P ij.
 Succij fumi terræ ʒ iiij.

P 2

In qui-

In quibus macerentur per xxiiij. horas sub
 frequentia:

℞. Cuscutæ Anisi Senæ ana ℥ j.
 Capilli Veneris m. j.

A Afari ℥ iiij.

Spicæ nardi Indicæ ℥ ij.

Bulliant aliquantulum, adiiciendo

Violarum ℥ iiij.

Epithymi ℥ ij.

Hæc postquam modicè bulhierint, colen-
 tur, & colaturæ iniiciantur

Psyllij seminis integri ℥ iiij.

Macerentur per xxiiij. horas, singulis horis
 agitando: deinde sume expressæ à Psyllio mu-
 cilaginis ℞ iiij.

Sacchari albissimi ℞ ij. β.

Coquantur lento igne ad perfectionem
 addendo pulueris

Trochiscorum Diarhodon

* de Spodio

de Rhabarbaro ana ℥ j.

de Berberis ℥ β.

* Scammonij in Cytonio malo cocti ℥ ii

Confice secundum artem.

*Per Buglossam domesticā potes intelligere Bo-
 raginem, vel magnā illam Italicam Buglossam*

℞. c

Asari ℥ iiij.] *Sic legendum esse, ritè quoque Euchsus monet. Cordus enim Asari, Spica ana ℥ ij. perperam hic legebat.*

FLAVAM bilem euocat, febribus ardentibus & curatu difficilibus auxiliatur, dolori capitis & vertigini à biliosorum humorum evaporationibus procreatis, morbo regio, & ictero supra modum calefacto.

Electuarium Rosarum D Mesue.

Rx. Succi rosarum rubearū perfectarum ℞ iiij.

Sacchari Tabarzeth [*id est, albi.*] ℞ j. β.

Mannæ puræ & recentis ℥ vj.

Scammoneæ Antiochenæ ℥ j. β.

Coquatur sensim ad ignem molliusculum, dum ad mellis consistentiam vsq. densescant: deinde insperge

Trochiscorum de Spodio ℥ j.

Trochiscorum de Berberis ℥ iiij.

Galliæ moschatæ veræ

Croci ana ℥ ij.

Reponatur in vase vitreo.

Est cholagogum clemens, ob id salubre biliosis affectibus, arthritidi calidæ, cephalalgia calidæ, vertigini, oculorum dolori, ictero.

P 3

Ele-

Electuarium de Succo Rosarum D. Nicolai

℞. Succo Rosarum rubrarum

Sacchari albissimi ana ℥ j. ℥ iiij.

Diagridij ℥ j. ℥ iiij.

Santali rubri Santali albi

Santali Citrini ana ℥ vj.

Spodij de Ebore ℥ iiij.

Caphuræ ℥ j.

Succus Rosarum cum Saccharo ad iustam consistentiam coquatur, deinde tritæ species adiciantur.

Hæc cōpositio potest fieri in forma solida.

Expellit flauam bilem citra molestiam: ad morbos articularum ex biliosis & calidis humoribus natos, ad febresque tertianas confert.

*Diatarbith cum Rharbarbaro**D. Montagnana.*

℞. Turbith optimi

Hermodactylorum ana ℥ j.

Rhabarbari ℥ x.

Diagridij ℥ iiij.

Santali albi Santali rubri Violarum

Zingiberis ana ℥ j. ℥.

Mastiches Anisi Cinnamomi

Croci ana ℥ ℥.

Sacchari

Sacchari albiſſimi triplum, hoc eſt ʒ ij. ʒ ij.

ʒ ij.

Poteſt fieri in liquida & ſolida ſubſtantia.

Eſt Cholagogum, Phlegmagogum, & Melanogogum.

Diaturbith maius D. Petri de

Tuſignano.

℞. Turbith optimi ʒ ij.

Diagridij

Zingiberis ana ʒ iiij.

Cinnamomi

Garyophyllorum ana ʒ ij.

Galangæ

Piperis longi

Macis ana ʒ i.

Sacchari albiſſimi ʒ viij. ʒ v.

Ducit phlegmaticos humores, & purgat, & calefacit.

Diaturbith minus Zezaris, ex Meſue

cap. de Turbith.

℞. Turbith albi & gummoſi ʒ x.

Zingiberis ʒ v.

Maſſiches ʒ iiij.

Sacchari albiſſimi ʒ vi. ʒ vj.

Levitæ purgat phlegma à ſtomacho.

P 4

Disse

A *Diacarthamum* D. Arnoldi de Villanova.

- ℞. Specierum Diatragacanthi frigidi ʒ β.
 Pulpæ Cytoniorum ʒ i.
 Medullæ seminis Carthami ʒ iiij.
 Zingiberis albi ʒ ij.
 * Diagridij ʒ iiij.
 Turbith ʒ vj.
 B Mannæ granatæ ʒ ij.
 * Mellis rosati colati ʒ j.
 * Hermodactylorum ʒ iiij.
 Sacchari albissimi ʒ x. ʒ iiij.

Fiat in liquida substantia.

Cum autem species reservare volueris, mel rosatum non convenit addere.

P V L P A siue caro Cytoniorum hic requiritur exsiccata.

P. C. SCHOL.

A *Diacarthamum*.] Cum apud diversos auctores diversimodè legatur *Diacarthami* descriptio, atq. hanc quoq. ab Arnoldi variare dicat Franc. Alexander, Arnoldo tamē hāc acceptam feremus, tantisper dum eiusdē genuinam descriptionem Franc. Apollo in Arnoldi nobis libris comonstraverit. Interea quoniā hanc utilem repererint multi, eam conficere Officina possunt.

Mannæ

Mannæ ʒ ii.] ʒ ij. hic legi debere. vel B
 pueri animaduertent. ita ut à tot tantisq; vi-
 ris (qui alioquin se satis emuncta naris esse pu-
 tant) id non esse olfactum, stupeſcam. Sed innu-
 mera huiusmodi hocce in libello reſtituta con-
 ſpicias, ab aliis ne cogitata quidem, quorum ra-
 tiones in aliud tempus ſeruamus.

P R O D E S T in euacuatione cholerae &
 phlegmatis.

Hiera Picra ſimplex D. Galeni. A

℞. Cinnamomi
 Xylobaſami [aut ſuccedanei eius.]
 Aſari Spicae nardi Indicae Croci
 Maſtiches China ana ʒ vi.
 Aloës non lota ʒ c.
 Mellis deſpumati ꝑ iiij. ʒ iiij.

Cum hæc confectio magis confortatiua
 quàm ſolutiua eſſe debeat, cum aloë lota con-
 ficienda eſt.

P. C. SCHOL.

Vt ex ipſiſſima Galeni mente confectio hæc pa- A
 retur, qualiq; modo à peritis medicis hodie confi-
 ci iubetur: Croci ʒ v. & Aloës ʒ xc. tantum
 imponenda ſunt.

C O N T R A ilioſos, putres, marcidosq; hu-
 mores,

P 5

mores, qui ori ventriculi insederunt, remedio est; item iis quorum faciem pallor decolorauit: iis quoque quorum oculis obiecta culicum aut pilorum imagines obuersantur, alui recrementa mediocriter mouet, ad iecur vsq. progressus: laedit quibus iecur calidius exhibet negotium, & stomachum iuuat.

Hiera Picra cum Agarico.

℞. Specierum Hieræ simplicis sine aloë

Agarici Trochiscati ana ℥ iiij.

Aloës non lotæ ℥ i.

Mellis despumati ℥ vi.

Hiera Picra composita D. Nicolai.

℞. Cinnamomi

Spicæ nardi Indicæ

Croci Schoenanthi Asari

Xylocassia

Xylobalsami } quorum loco sumantur suc-

Carpobalsami } cedanea, ut supra.

Violarum Absinthij Epithymii Agarici

Rosarum Turbith Colocynthidis

℞ Mastiches ana ℥ ij.

Aloës non lotæ ℥ x. ℥ ij.

Mellis despumati ℥ viij.

P. C.

Ana ʒ ij.] *Fuchsius ana ʒ β. legi vult, Cordum reprehendens cum in idem recidat: concluduntur enim simplicia omnia unico ana: Aloës ad pondus omnium legunt Nicolai exemplaria. Inanis itaque est Fuchsii reprehensio.*

F A C I T ad diuersas capitis, & aurium, & oculorum distemperantias, stomachum quoque optimè purgat, affectiones hepatis emendat, splenis duritiem & densitatem emollit & extenuat. Renibus & vesicæ prodest, & matricis distemperantiam emendat.

*Hieralogodium, seu potius Hiera Logadij
D. Nicolai.*

℞. Pulpæ Colocyntidis
Polypodij ana ʒ ij.
Euphorbij Polij montani minoris
Cocci Gnidij ana ʒ j. β. ʒ vj.
Absinthij
Myrrhæ Troglodyticæ ana ʒ j. ʒ xij.
Centaureæ minoris Agarici Hammoniæ
Folij [aut succedanei eius.]
Spicæ nardi Indicæ Scyllæ assatæ
Diacridij ana ʒ j.
Aloës Comarum Thymi
Cassia

Casia lignea Chamædryos Bdellij
 A Prassii ana \mathfrak{z} ij. \mathfrak{G} xiiij.
 Cinnamomi Opopanacis Castorei
 Aristolochia longæ Leucopiperis
 Macropiperis Melanopiperis Croci
 Petroselini Macedonici
 Sagapeni ana \mathfrak{z} β .
 Hellebri nigri
 Hellebri albi ana \mathfrak{G} vj.
 * Mellis despumati triplum, hoc est \mathfrak{z} x. \mathfrak{z} iij.
 \mathfrak{z} j. \mathfrak{G} iij.

*Quadam exemplaria habent Colocynthidis
 \mathfrak{z} ij. sed maximo errore: nos itaque veram com-
 positionem Nicolai Alexandrini sequimur, qui
 habet hanc proportionem.*

COCCI Gnidij debent esse \mathfrak{z} j. β . \mathfrak{G} xij. si
 Alexandrinum Nicolaum sequi volumus im-
 pressum, qui habet \mathfrak{z} xvij. & hac cõpositio habet
 decimam partem Nicolai: itaque si \mathfrak{z} j. β . &
 \mathfrak{G} xij. multiplicantur per decem, erunt \mathfrak{z} xvij.

Nota \mathfrak{z} ij. & \mathfrak{G} xiiij. sunt decima pars drach-
 marum nouem: in Nicolao autem Alexandrino
 impresso non nouem, sed undecim legitur: sed hoc
 factum est vitio librariorum, xj. pro ix. ponen-
 tium, quamuis impressus codex pro xj. habeat
 II. id est undecim per ciphras scriptum. Quod
 autem

dissoluendos hos liquores accipies, de supra-
scripta quantitate sumito, nihil addendo.

*MALVM terra, id est, radix Aristolochia
rotunda vera.*

*Scribonius Largus mirum in modum effert hu-
ius Hieræ virtutes, quemadmodum etiam Mar-
cellus. Itaque non ab re fuerit tutò ea uti, cum
& nos eius efficaciam aliquoties experti sumus.*

*✱ hac nota significat Romanis scriptoribus
denarium. Est autem denarius pondus Roma-
num drachma paulò grauius. Nam drachma
octo faciunt unciam, cum denarij septem consti-
tuant unciam: non rarè tamen indifferenter pro
drachma accipitur, sed malè.*

Compositio hæc sanat morbo comitiali
correptos, furiosos, scotomaticos, cephalalgî-
cos, facit ad deprauatam in vtramlibet par-
tem. Ad Tetanum, & Cynicum spasmus, præ-
cipuè verò ad pectoris & lateris dolores pro-
dest, ex qualibet causa factos siue latente &
occulta, siue manifesta. Præterea neruorum
tensionibus mirificè conuenit: Prodest ad arti-
cularium morbum, ad spinæ totius & lumbo-
rum dolorem. Duritias in manibus mulie-
rum cum dolore cōsistentes, ex toto interdum
sanat. Ad stomachicos euidenter conuenit.

Reine-

Remediat enim eos quibus frequenter accescit
cibus, aut assidue nauseant, aut saliva abundat
præcipue vero Melancholicis benefacit, &c.

Catharticum Imperiale D. Nicolai

Alexandrini.

℞. Diagridij
Sacchari ana ℥ viij.
Cinnamomi Nardi Saxifraga
Polypodij ana ℥ iiij.
Garyophyllorum Zingiberis
Celtica [*id est, Spica Celtica.*]
Macropiperis Melanopiperis Cardamomi
Amomi [*eius vice sume nostrum Calamum
aromaticum.*] ana ℥ iiij.
Mellis despumati ℥ j. ℥ iiij. ℥. viij.

SAXIFRAGA, quam Græci describunt,
mediam habet figuram, & magnitudinem in-
ter Pulegium & Thymum. Germanicè vocatur
Stinplei.

C A P I T optime purgat, os bene olens red-
dit, ex stomacho & toto corpore utramque bi-
lem deducit.

Pulvis medicaminis Turbith D. Anicenna.

℞. Zingiberis albi
Mastiches ana ℥ x.

Turbith

Turbith subtiliff. puluerizati ʒ x.

Sacchari Tabarzeth quantum eorum est.

Commisceantur.

PURGAT humores phlegmaticos, datur
pueris, mulieribus, senibus, & humidis, deli-
catis & otiosis.

Pulus Senæ preparata D. Montagnana.

℞. Senæ ʒ xij.

Zingiberis

Macis ana ʒ iiij.

Cinnamomi

Tartari ana ʒ j. β.

Hæc in puluerem redacta commisceantur.

Dosis ʒ j. ante coenam.

PURGAT caput mirabiliter.

Pulus aut Tragea laxatiua.

℞. Turbith ʒ j.

Zingiberis Cinnamomi

Mastiches Galangæ

Cardamomi minoris Garyophyllorum

Anisi Hermodactylorum

Diagridij ana ʒ β.

oliorum Senæ ʒ ij.

acchari ʒ iiij.

Misceantur in puluerem contrita.

Q

PUR-

Purgat cholera, phlegma & melancholiam.

Pulvis Sternutatorius.

℞. Radicum Pyrethri ʒ j.

Castorei ʒ β.

Hellebori albi

Hellebori nigri ana ʒ j.

Maioranæ m j.

Misceantur, fiat pulvis lege artis.

Nasalia.

℞. Calaminthæ

Maioranæ

Seminis Nigellæ

Seminis Staphysagriæ

Hellebori a bi

Nucis moschatae

Euphorbij

Radicis Ireos

Castorei

ana ʒ j.

Pyrethri

Myrrhæ rubeæ

ana ʒ ij.

In pulvres singula conteratur, deinde cum
Ladani ʒ vj. & melle modico formentur nasalia.

SUPPOSITORIA.

Suppositoria simplicia cōficiuntur ex melle
& sale simul coctis ad debitam crassitiem.

*Species ad Glandes, aut Suppositoria
acuta conficienda.*

℞. Hellebori albi

Granorum Colocynthis

ana ʒ j. β.

Esulæ

Esulæ præparatæ

Hermodylorum ana ℥ j.

Specierum Hieræ picræ simplicis Galen. ℥ ij.

Misceantur puluerizata.

P I L V L A E.

Pilula Alephangina D. Mesue.

℞. Cinnamomi Cubebarum Ligni aloës

Calamiaromatici Macis Nucis moschatæ

Cardamomi Garyophyllorum Asari

Mastiches Schœnanthi Spicæ Indicæ

Carpobalsami [aut succedanei eius.] ana ℥ j.

Absinthij sicci

Rosarum ana ℥ v.

Conterantur grosso modo, & infundantur in aquæ ꝑ duodecim, & coquantur lento igne in duplici vase vsque ad consumptionem duarum partium, id est, ad remanentiam tertiæ partis: deinde exprimantur fortiter & co-
lentur. In colaturæ ꝑ duabus dissolue Aloës Succotrinæ multoties in vitreo vase lotę, cum aqua pluuiali, & iterum siccata ꝑ j. agrentur simul continuè in Sole: deinde addantur pul-
ueres Myrrhæ, Mastiches ana ℥ v. Croci ℥ iij. Deinde quod reliquum est colati decocti ex

Q 2

aroma-

aromatibus, etiam affundito, & exiccentur ad Solem vel in stufa, admiscendo subinde quod densatum est, liquido, & linceo puro vas obtegatur aduersus incidentium muscarum & sordium iniurias. Postremo reponatur massa, & fiant Pilulæ parvæ cum necessitas requirit.

P I L V L A E Alephangina composita sunt à Mesue, ut confortent potius stomachum & cerebrū, quàm ut aluū ducant. Propterea Aloë toties lotam requirit, & nullum solutiū medicamentū eis admiscet, sed confortantia omnia, nisi quis solum Asarum excipiendum esse cōtendat.

Istæ Pilulæ ubique sunt in frequenti usu, sed rarissimè, ut decebat, conficiuntur. nam detrahunt ponderi & numero aromatum, & augent pondus Aloës: quidā etiam impurissimam aloën admiscet: atque ipsius Aloës sordes. Porro miror cur Mesue iubeat ut decoquantur aromata, cum tamen omnia aromata tenuissimis constent virtutibus, quæ faciliè inter decoquendum resolvuntur. Adeo etiam, ut deinde ipsum decoctum aut celatura, prorsus non sapiat aromata quæ incocta fuerant. Sed quia ita preparari hæc massam voluit Mesue, in nulla re immutabimus eius placitum.

Quidam confectiōni huius massa Pilularum
Alephan-

Alephanginarum consulescentes, dimidiam aromatatum partem cum aqua decoquunt, & Aloën in colatura dissoluunt; alteram autem partem aromatatum in minutissimum puluerem redactam, inter exiccandum massa admiscunt, non absurda admodum ratione, si aromata decoctionem sustinerent.

VENTRICULUM, cerebrum, & sensoria humoribus crassis, putribus, pituitosis, purgāt, & inde natum dolorem dissipant, ventriculū roborant & concoctionem eius iuuant.

Pilula Assaieret D. Avicenna.

℞. Specierum Hieræ picræ, descriptione Galeni \mathfrak{z} i.

Mastiche

Myrobal. Citrinorum ana \mathfrak{z} β.

Aloës optimæ \mathfrak{z} iij.

Syrupi de Storchade q. s.

Fiat Massa.

BILEM flauam & pituitam sine molestia ē ventriculo potissimum vacuant. Quapropter iis qui caput ē ventriculo dolent, conueniunt.

Pilula Arabica D. Nicolai.

℞. Aloës optimæ \mathfrak{z} iij.

Radicis Bryonia

Q 3

Myro.

Myrobalanorum Citrinorum
 Myrobal. Chebulorum Myrobal. Indorum
 Myrobal. Bellericorum Myrobal. Emblicorum
 Mastiches Diacridij Asari
 Rosarum ana ℥ j.
 Castorei ℥ iiij.
 Croci ℥ j.
 Succ. Fœniculi q. s.
 Fiat Massa.

VALENT ad capitis dolorem, vertiginem, hemicraniamque. Lætitiâ generant, mentisque vigorem cōservant: Visum acuunt, auditumq. amissum reparant: Ac stomachum à vitiosis humoribus purgant.

Pilula Arthritica siue Arthetica

D. Nicolai.

℞. Hermodactylorum Turbith
 Agarici ana ℥ iiij.
 * Colocynthis Cassia lignæ veræ
 * Spica nardi Indicæ Garyophyllorum
 Xylobalsami [aut succedanei eius.]
 Carpobalsami [aut succedanei eius.]
 * Macis Galangæ
 * Zingiberis Mastiches
 * Ailæ foetidæ Fœniculi
 Anisi

Anisi Saxifraga Seminis Asparagi
 Seminis Rulci [*id est, Brusci*]
 Rosarum
 Granorum solis [*id est, Milij solis.*]
 Salis gemmei ana ℥ β.
 Scammonij ℥ ij.
 Aloës optimæ ad pondus omnium
 Succī Fœniculi q. l.

Fiat Massa.

*Ex Asparagi & Rusci seminibus tantum
 pulpa illa carnosæ accipi debet, abiectis corneis
 seminibus, idq; sæpe est observandum.*

VALENT ad podagram, aliosque articu-
 lorum dolores.

Pilule de Agarico D. Mesue.

℞. Agarici ℥ iij.
 Ireos
 Prassij ana ℥ j.
 Turbith ℥ v.
 Hieræ picræ ℥ iiij.
 Colocynthidis
 Sarcocollæ ana ℥ ij.
 Myrrhæ ℥ j.
 Sapæ quantum sufficit.
 Fiat Massa.

Q 4

Ego

Ego consulerem, ut Hierapicra nondū melle commista acciperetur, hoc est species eius aromatica cum Aloë tantum mista: intelligenda autem est Hierapicra simplex Galeni.

3 A P A est mustū optimū ad tertias decoctum.

Auxiliantur asthmaticis, & aliis thoracis vitiis à crassis & pituitosis humoribus natis.

Pilula Aurea D. Nicolai.

℞. Aloës
 Diacridij ana 3 v.
 Rosarum
 Seminis Apij ana 3 ij. β.
 Anisi Fœniculi
 Mastiches ana 3 j. β.
 Croci
 Pulpæ Colocynthidis ana 3 j.
 Mucilaginis Tragacanthæ q. s.
 Fiat Massa.

C A P V T expurgant, aciem oculorum exaccuant, flatus ventriculi & intestinorum dissolunt, ac citra molestiam aluum deliciunt.

Pilula Aggregativa D. Mesua.

℞. Myrobal. Citrinorum
 Raved Seni ana 3 iiij.
 Succu Eupatorij

Stucci

Succi Absinthij ana ℥ iij.

Diacridij ℥ vj.

Myrobal. Chebulorum

Myrobal. Indorum Agarici

Colocynthidis

Polypodij ana ℥ ij.

Turbith optimi

Aloës ana ℥ vij.

Mastiches Rosarum

Salis gemmei Epithymi

Anisi

Zingiberis ana ℥ j.

Electuarij de succo Rosarum Mesue q. s.

Fiat Massa.

RAVED Seni, idest, Rhabarbarum Orientale optimum.

Succi Eupatorii & Absinthij debent esse inspissati, ut Aloë.

Per Eupatorium hoc loco intelligendum est Eupatorium quod Mesue describit, quod idem est cum Gratiola. Germanicè vocatur Vveysaurin: copiosè nascitur ad Albin. igitur hic erit faciendus eius succus.

VALENT ad diuturnas febres, & vitia capitis, ventriculi & iecinoris. Humores item biliosos & pituitosos educunt.

Q s

Pilula

Pilula Benedictæ D. Nicolai.

℞. Specierum Benedictæ laxatiuæ ʒ vj.
 Mellis Rosati quantum sufficit
 Fiat Massa.

HUMORES pituitosos, potissimum ad
 articulos decumbentes eliciunt, à renibus quo-
 que & vesica purgant.

Pilula Cochia D. Rhasis 9. ad Almanforem.

℞. Specierum Hieræ picræ Rhasis ʒ x.
 Colocynthidis ʒ iij. ʒ i.
 Scammonæ ʒ ij. ʒ.

Turbith

Stœchadis ana ʒ v.

Syrupi de Stœchade quantum sufficit.

Fiat Massa.

STOECHAS cum simpliciter & indefinitè
 ponitur, semper est intelligenda Stœchas Arabica.

Cephalica rectius appellantur, quòd sci-
 licet caput magna efficacia expurgent, ex
 coque ac nervis humores crassos euacuent.

*Hiera picra Rhasis 9. ad Almanf. ad fa-
 ciendum Pilulas Cochias.*

℞. Rosarum rubearum
 Spicæ nardi Indicæ Mastiches
 Xylobalsami [aut succedanei eius.]

Car

Carpobalsami [ant succedanei eius.]

Cinnamomi

Xylocastæ veræ [id est, Castæ lignæ.]

Afari [videlicet radicis eius.] ana ʒ j. ʒvj.

Aloës ʒ vj. ʒ ij.

Fiat puluis.

Pilula de Colocynthide D. Mesua.

℞. Pulpæ Colocynthidis ʒ vj.

Myrobal. nigrorum [id est, Indorum.]

Myrobal. Citrinorum

Sagapeni Bdellij mollis

Sarcocollæ ana ʒ v.

Aloës ʒ vij.

Nigellæ Cymini Carmeni Origani Persici

Nasturtij albi Salis gemmei

Abinthij ana ʒ j.

Succi porri quantum sufficit.

Fiat Massa.

CYMINVM Carmenum, id est, Orientale,
ex Carmentis regione.

ORIGANVM Persicū, idem est quod Cre-
ticum Origanum, & est Majorana simile.

NASTURTIVM albū. i. Thlaspi, Germa-
nicè Vvegekressen: significat etiam Merretich.

VALENT ad affectus pituitosos & melan-
cholicos,

cholicos, vt alphas curatu difficiles, & iuncturarum dolores.

Pilula de Eupatorio maiores D. Mesua.

℞. Myrobalan. Citrinorum

Succi Eupatorii Mesuæ

Succi Absinthij ana ʒ iij.

Raued Seni [id est, Rhabarbari.] ʒ iij. ʒ.

Mastiches ʒ i.

Croci ʒ ʒ.

Aloës bonæ ʒ v.

Succi Endiuix quantum sufficit.

Fiat Massa.

MIRIFICE prosunt in febribus intermittentibus biliosis, morbo regio, iecinorisque obstructionibus.

Pilula de Euphorbio D. Mesua.

℞. Euphorbij

Colocynthis Agarici Bdellij mollis

Sagapeni ana ʒ ij.

Aloës ʒ v.

Succi porri quantum sufficit.

Fiat Massa.

Ad emittendā hydropicorū flauam aquam, & materiam tumoris discutiendam valent: Opem quoque afferunt lumborum doloribus,

bus, & podagræ humida causa concitatæ.

Pilula Fœtida maiores D. Mesua.

℞. Sagapeni Hammoniæ Opopanacis
Bdellij mollis Colocynthidis Seminis Rutæ
Aloës Epithymi ana ʒ v.

Hermodaetylorum

Esulæ minoris ana ʒ ij.

Scammoneæ ʒ iij.

Cinnamomi Spicæ nardi Indicæ Croci

Castorei ana ʒ j.

Turbith ʒ iij.

Zingiberis ʒ j. ʒ.

Euphorbij ʒ ij.

Succi porri quantum sufficit.

Fiat Massa.

VACVANT pituitam crassam, crudam: ob
id conferunt affectibus inde natis, arthritidi,
podagræ, gonagræ, dolori spinæ & aliarum
iuncturarum, ventriculi, colico, alphis, ele-
phantia, & albaras.

Pilula Fœtida D. Rhasis.

℞. Specierum Hieræ picæ Rhasis ʒ x.

Colocynthidis interioris ʒ v.

Euphorbij ʒ ij. ʒ.

Castorei Piperis Assæ fœtidæ

Sagapeni

Sagapeni Opopanacis Seitaragi

Sinapi ana 3 j.

Centaureæ minoris. Elaterij ana 3 v.

Gummi, siue lachrymæ & liquores omnes densati, in succo Rutæ q. s. dissoluantur: deinde admistis reliquis fiat Massa.

SEITARAGI, siue *Seytari Indū*, est herba similis *Thlaspi maiori*. i. Merretich: Latine vocatur *Lepidium maius*; Germanicè, *Roskressen*, *Pfefferwurtz*, Romischkressē & *Mauerkressen*: accipiendæ autem sunt radices eius aut semina.

ELATERIVM, id est, succus fructuum *Cucumeris asinini* exiccatus.

Pilula de Fumo terræ D. Auicennæ.

℞. Myrobal. Citrinorum

Myrobal. Chebulorum

Myrobal. nigrorū [id est, *Indorum*.] ana 3 v.

Aloes 3 vij.

Scammoneæ 3 v.

Succi fumi terræ clarificati quantū sufficit, ut formetur ter hæc massa: nā cum primò fuerit siccata massa, plus succi est addendū, & rursus exiccetur, idq. tertio est faciendū.

Educūt è corpore humores biliosos, acres & sallos: ideoq. aduersus omnia cutis vitia valēt.

Pilula

Pilula de Hermodactylis maiores D. Mesua.

℞. Hermodactylorū Myrobal. Citrinorum

Aloës Turbith Colocynthis

Bdellij mollis Sagapeni ana 3 vj.

Castorei Sarcocollæ Euphorbij

Opopanacis Seminis Rutæ

Seminis Apij ana 3 iij.

Croci 3 j. ꝑ.

Succi caulium quantum sufficit.

Fiat Massa.

Aduersus podagram & arthritin profunt.

Pilula Inde Haly D. Mesua.℞. Myrobal. nigrorum [*id est, Indorum.*]

Hellebori nigri

Polypodij ana 3 v.

Epithymi

Stœchados ana 3 vj.

Agarici

Lapidis Lazuli loti

Colocynthis

Salis Indi [*aut Salis gemmei.*] ana 3 iij. *

Succi Eupatorij inspissati

Spicæ Indicæ ana 3 ij.

Garyophyllorum 3 j.

Hieræ picræ simplicis Galeni 3 xij.

Succi Apij quantum sufficit.

Fiat

Fiat Massa.

VALENT ad affectus melancholicos, can-
crum, elephantiam, albos nigros curatu diffi-
ciles, melancholicum morbum, & inde ortum
tumorem & mærorem, quartanam, icterum,
spleneticum & splenis dolorem.

Pilula Hiera simplicis Galeni.

lib. 6. tuenda val.

A R. Aloës 3 L.

Cinnamomi

Xyloballami [aut succedanei eius.]

Alari Spicæ nardi Indicæ Croci

Mastiches Chiæ ana 3 iij.

Mellis rosati quantum sufficit.

Fiat Massa.

P. C. SCHOL.

A Pilulis his, ut ex Galeni ipsissima sententia
conficiantur, & veluti apud peritiores hodie
usus obtinuit, Aloës 3 xlv. & Croci 3 ij. tan-
tum hic indenda sunt.

ADVERSUS vitia ventriculi ex humori-
bus biliosis & pituitosis nata, profunt.

Pilula de Hiera composita D. Nicolai.

R. Cinnamomi

Spicæ nardi Indicæ Croci

Schœ-

Salis Indi, aut gemmei ana ʒ ij. β.

Agarici ʒ viij.

Garyophyllorum

* Anisi ana ʒ ij.

Specierum Hieræ simplicis Galen. ʒ xv.

Succi Endiuia quantum sufficit.

Fiat Massa.

VALENT ad affectus melancholicos, & bile vsta natos.

Pilula de lapide Armenio D. Mesua.

℞. Lapidis Armenij loti & præparati

Hieræ picræ ana ʒ v.

* Epithymi Agarici

Polypodij ana ʒ viij.

Scammonæ coctæ in Cytonio ʒ iij.

Garyophyllorum ʒ j.

Salis Indi [aut gemmei.] ʒ j. β.

Cum succo Endiuia conficiatur massa.

MELANCHOLIAM, & bilem vstam multiplicem vtramque clementer vacuant, ob id morbis inde natis conferunt.

Pilula de Mezereo D. Mesua.

℞. Foliorum Mezerei præparatorum ʒ v.

Myrobal. Citrinorum ʒ iij.

Myrobal. Chebulorum ʒ iij.

Confice

Confice cum Thereniabin vel Tamarindis
in aqua Endiuia dissolutis q. s.

THERENIABIN *sive Tereniabin, est*
Manna Orientalis, qua Græcis vocatur Droso-
meli & Aeromeli.

SEROSVM excrementum valenter pur-
gant, seu aquas, ob id hydropem iuuant.

Pilula Lucis maiores D. Mesue.

R. Rosarum	Violarum	Absinthij
Colocynthidis	Turbith	Cubebarum
Calami aromatici	Nucis moscharæ	
Spicæ nardi Indicæ	Epithymi	
Carpobalsami	[aut succedanei eius.]	
Xylobalsami	[aut succedanei eius.]	
Seselios	Seminis Rutæ	Schœnanthi Asari
Mastiches	Garyophyllorum	Cinnamomi
Anisi	Fœniculi	Apij
Cassie lignæ	[videlicet vera.]	
Croci	Macis	ana 3 ij.
Myrobal. Citrinorum		
Myrobal. Chebulorum	Myrobal. Indorum	
Myrob. Bellericorum	Myrob. Emblicorum	
Raued Seni	[hoc est, Rhabarbari.]	ana 3 iiij.
Agarici	Senæ	ana 3 v.
Euphragiæ	3 vij.	

R 2

Aloës

Aloës Succotrinæ ad pondus omnium, id est

* ℥ viij. & ℥ ij.

Succi Fœniculi quantum sufficit.

Fiat Massa.

EXCREMENTA capitis pituitosa educunt, visumque roborant.

Pilulæ Lucis minores D. Mesua.

℞. Xylobalsami [aut succedanei eius]

Carpobalsami [aut succedanei eius.] ana ℥ j.

Chelidoniæ [videlicet maioris radicis.] ℥ v.

Rosarum Violarum Absinthij

Euphrasiæ ana ℥ iiij.

Senæ Epithymi Myrobal. Citrinorum

Myrobal. Chebulorum Myrobal. Indorum

Myrob. Bellericorum Myrob. Emblicorum

Agarici Colocynthis Scheenanthi Lyci

Lapis Lazuli loti ana ℥ ij. ℞.

Aloës optimæ ad pondus omnium

Succi Fœniculi aut Chelidoniæ quantum suffi-

Fiat Massa. (cit.

Idem quod priora possunt, atram tamen bilem magis vacuant.

*Pilulæ Mastichinæ Petri de Ebano,
sive Consiliatoris.*

℞. Mastiches ℥ iiij.

Agarici

Agarici optimi ℥ iij.

Aloës electæ ℥ x.

Infundatur Agaricus in Aceto & Oxymelle simplici liquidiusculo per diē & noctē, & rursum exiccetur: deinde formetur Massā cū succo Artemisiæ, aut cum Syrupo de Stœchade.

P. C. SCHOL.

Eo quòd Cordus bis eandem pilularū harum A descriptionem posuerat, ponderibus tantum in altera quadruplicatis, nos unam earum tamquam frustraneam expunximus.

Præservant stomachū ab omni ægritudine, leniter purgant, & maximè confortant, & non permittunt humores corrūpi, & qui eis videntur, præservantur à doloribus stomachi, capitis, ventris, & matricis: conferunt tristibus & melancholicis, & vitia matricis corrigunt.

Pilula de Aloë & Mastiche D. Nicolai.

℞. Aloës ℥ j. Mastiches ℥ β.

Garyophyllorum

Rosarum rubearum ana ℥ j.

Croci Diacridij ana ℥ ij.

Conformetur Massā cum succo Fœniculi aut Absinthij.

Respiciunt virtutē naturalē: purgant inco-

R ; lumi-

lumiter stomachum à phlegmate & à cholera.

Pilula de Aloë lota.

℞. Aloës lotæ cum succo rosarum rubearum

℥ j.

Agarici Trochiscati ℥ iij.

Mastiches ℥ ij.

Specierum Diamoschi dulcis ℥ β.

Cum vino maluatico cogantur in massam.

VENTRICULUM, cerebrum, viscera reliqua, oculos, uterum putribus humoribus purgant, & roborant.

Pilula de Rhabarbaro D. Mesue.

℞. Raved Seni [id est, Rhabarbari.] ℥ iij

Succi Glycyrrhizæ

Succi Absinthij

Mastiches ana ℥ j.

• Myrobal. Citrinorum ℥ ij. β.

Seminis Apij

• Seminis Fœniculi ana ℥ β.

Trochiscorum diarhodon ℥ iij. β.

Hieræ picræ simplicis ℥ x.

Aquæ Fœniculi quantum sufficit.

• Fiat Massa.

IN febribus diuturnis, iecinoris obstructionibus, & aquæ inter cutem initiis conferunt.

Pilula

*Pilula Pestilenciales Ruffi, quæ aliter**De tribus vocantur.*

℞. Aloës electæ ʒ ij.

Myrrhæ optimæ ʒ j.

Croci sinceri ʒ β.

Confice cum vino aromatico.

MIRIFICE aduersus pestiferę Luis contagia populatim grassantia pollent. Humores etiam ventriculo immersos educunt.

Pilula de Sarcocolla Haly D. Mesue.

℞. Sarcocollæ ʒ iiij. Turbith ʒ iiij.

Colocynthidos Zingiberis ana ʒ j. β.

Salis gemmei ʒ j.

Aquæ Rosarum quantum sufficit.

Fiat Massa.

PITUITAM vacuant, ob id pituitosis affectibus commodant.

Pilula Sine quibus esse nolo, D. Nicolai.

℞. Aloës optimæ lotæ ʒ xiiij.

Myrobal. Citrinorum

Myrobal. Chebulorum

Myrobal. nigrorum [*id est, Indorum.*]

Myrobal. Bellericorum

Myrobal. Emblicorum

Rhabarbari Mastiches Absinthij

R 4

Rosa-

Rosarum Violarum Senæ Agarici
 Cuscutæ ana ℥ j.
 Scammoneæ præparatæ ℥ vi. β.

Dissoluatur Scammonea in succo Fœniculi sufficienti, & cum hac dissoluta Scammonea formetur massa.

Mirabiliter purgant choleram, phlegma & melancholiam: valent propriè ad cataractas, & obscuritates oculorum, visum custodientes: & aurium dolorem sanant, & iliosis conferunt.

* *Pilula Stomachicæ Alkindi D. Mesua.*

R. Myrobal. Citrinorum
 Myrobal. nigrorum
 Myrobal. Chebulorum ana ℥ iij.
 Rosarum Mastiches ana ℥ ij.
 Cardamomi Ligni aloës Santali Citrini
 Cubebarum Garyophyllorum Schœnanthi
 * Nucis moschatæ ana ℥ j.
 Raud Seni [id est, Rhabarbari.] ℥ β.
 Turbith ℥ vij.
 Aloës ad pondus omnium.

Fiat Massa.

Cerebrum, & ventriculum corruptis humoribus purgant, ventriculum roborant, concoctionem iuvant, appetentiam excitant.

Pilula

Pilula Stomachica D. Mesue.

Rz. Myrobal. Citrinorum Aloës

Turbethi ana ʒ x.

Rosarum Spicæ Indicæ

Mastiches ana ʒ ij. ʒ.

Anisi ʒ j. ʒ.

Salis Indi [aut Salis gemmei.]

Croci ana ʒ j.

Formetur massa cum succo Absinthij.

Biliosos & pituitosos vacuant humores, eos
potissimum qui caput & ventriculū obsident.*Pilula Imperiales Magistrales.*

Rz. Cinnamomi

Amomi [eius loco sumatur Acorus verus.]

Anisi Mastiches Cardamomi minoris

Zingiberis Zedoariæ Maccris

Nucis moschatæ Garyophyllorū Croci

Cubebæ Ligni Aloës Turbethi

Tereniabin [id est, Manna.]

Agarici Foliorum Senæ

Myrobal. Citrinorum Myrob. Chebulorum

Myrobal. Indorum Myrob. Bellericorum

Myrobal. Emblicorum ana ʒ j. *

Rhapontici veri [id est, Rhabarbari.] ad pon-
dus omnium

R ʒ

Aloës

Aloës quantum totum æquat.

Conficiantur cū Syrupo rosato aut violato.

M O D I C V M soluent, & plurimum cōfortant stomachum, & omnia intestina frigida: muniunt virtutes naturales, remouent frigiditatem, clarificant sanguinem & spiritum.

Pilula de Opopanace D. Mesuæ.

℞. Opopanacis Hermodactylorum
Sagapeni Bdellij mollis Aminoniaci
Colocynthidos ana ʒ v.
Crocī Castorei Myrrhæ rubræ Zingiberis
Piperis Macropiperis [id est, nigri.]
* Calfiæ lignæ Myrobal. Citrinorum
Myrobal. Bellericorum
Myrobal. Emblicorum ana ʒ j.
Scammoneæ ʒ ij.
Turbethi ʒ iiij. Aloës ʒ xij.

Cogantur in massam cum infusione gummi in aqua caulium.

VALENT ad paralyfim, spasmū cynicū, gonagram, podagram, & aliorum articulorū dolores, morbosq. partium neruolarū frigidos.

Pilula de Quinque generibus Myrobal.

D. Nicolai.

℞. Quinque genera Myrobalanorum
Agarici

Agarici Diacridij Colocynthidos

Senæ ana ℥ β.

Epithymi Turbethi Amifi

Marathri Mastiches

Lapidis Lazuli præparati ana ℥ ij.

Aloës ℥ j.

Formetur massa cum succo Absinthij.

P. C. SCHOL.

Ana ℥ β.] *Cum Cordus hic ana ℥ β. depra-* A
nate posuisset, Fuchsius aquè malè ℥ ij. β. legen-
dum putat.

EDUCUNT humorē choleriçū, phlegma-
ticū & melancholicū, & clarificāt sanguinem.

Pilula de Octo rebus, siue Optomere,

D. Nicolai.

R. Aloës Diacridij ana ℥ ij.

Interioris Colocynthidos Epithymi

Agarici Mastiches Dauci Cretici

Myrob. Chebulorum Absinthij ana ℥ j.

Cum succo Solani conformetur massa.

Purgant humores crassos à capite, visum
clarificant, & cataractas oculorum prohibēt.

Pilula de Serapino D. Mesue.

R. Sagapeni Ammoniacy Opopanacis

Bdellij ana ℥ ij. Seminis Apij Ammios.

Har.

Harmelæ [*id est, seminis. Ruta siluestris.*]

Anisi ana ʒ j.

Acori [*id est, Calami aromatici.*]

A Casiæ ligneæ veræ Calaminthæ

Centaurij [*minoris scilicet.*]

• Polij Costi Salis gemmei ana ʒ β.

Aloës ʒ vj. Colocynthidos ʒ v.

Cogantur in massam cum aqua aut succo
Matricariæ.

NOTATO: Ingreditur secundum Mesue
Seitaragum Indum. sed Clementius Clementi-
nus loco eius posuit Casiam ligneam.

P. C. SCHOL.

A Casiæ.] Seitaragi Indi (quod Lepidium hoc
loco interpretandum) apud Mesuem legi: rectè
olfecit Fuchsius, falliꝑ Cordum & Clementi-
num dextrè censet.

POLLENT ad Ischiadem, podagram, &
reliquarum iuncturarum dolorem, ac etiam
vteri, mensesque promouent.

Pilula de Bdellio maiores D. Mesue.

℞. Bdellij ʒ xij. Ammios ʒ iij.

Myrob. Chebulorum Myrob. Indorum

Myrob. Bellericorum Myrob. Emblicorum

• Conchularum venerearum adustarum

Succini

Succini aut Karabæ ana ℥ ij. β.

Maceretur Bdellium in succo foliorū Porri,
& conficiatur massa.

V A L E N T ad fluxum hæmorrhoidum &
ulcerum in eis, & ad menses immodicos.

Pilula de Cynoglossa D. Nicolai.

℞. Cynoglossæ rad. Opij *

Seminis Hyoscyami ana ℥ iiij.

Myrrhæ Troglodyticæ ℥ vj.

Thuris masculi ℥ v.

Garyophyllorum ℥ ij.

Cinnamomi Styracis rubei ana ℥ ij.

Cum aqua rosarum conficiatur massa.

Magnam vim obtinet in tenuibus sisten-
dis destillationibus, ac doloribus mitigandis.

Pilula Bechica. *

℞. Pincorum nucleorum

Amygdalarum ana ℥ j. β. *

Glycyrrhizæ ℥ vj.

Succi glycyrrhizæ ℥ iiij.

Cum aqua rosarum conformetur massa.

A D V E R S V S tussim veterem pollent, &
gutturis ac faucium asperitatem.

Pilula Alephangina D. Valerij Cordi.

℞. Myrobalan. Chebulorum

Myrobal.

Myrob. Citrinorum Myrobal. Indorum

Myrobal. Bellericorum

Myrobal. Emblicorum ana ℥ j.

Acori veri Galangæ Zedoariæ

Doronici Romani Radicularum Afari

Dictamni nostratis radicum Absinthij

Rosarum ana ℥ iiij.

Contundantur omnia crassiusculè, & Myrobalani per se macerentur prius in aquæ clarissimæ fontanæ ℞ iiij. per horas xxiiij. deinde coquantur, donec ferè tertia pars aquæ sit in vaporem resoluta: postea coque etiam radices, & aromata lento igne in duplici vase, cum aquæ clarissimæ ℞ vj. & affunde his antea coctas Myrobalanos cum suo iusculo: ultimo rosas adiiciendo, coquantur vsque ad tertias: coletur postea validè exprimendo: hinc in colatura dissolue,

Aloës optimæ & lotæ, ac rursus exiccatae ℞ iiij.

Ponantur omnia in vitrea patina ad solem aut in stufam, & agitentur sæpissimè, ut concresecens in margine Aloë liquidò commisceatur: cum verò mellis spissitudinem fuerint consecuta, tunc adde sequentium specierum puluerem minutissimè tritum.

℞. Galangæ Cyperi Zedoariæ Doronici
Ligni

Ligni aloës Cinnamomi Schœnanthi
 Nardi Celticæ radicalarū Nucis moschatæ
 Macis Cubebarum Cardamomi
 Garyophyllorum ana ℥ iiij.
 Mastiches
 Succini [*id est, Caraba.*] ana ℥ vj.
 Myrrhæ
 Croci ana ℥ iiij.

Agitentur optimè cum aloë species, & fiat
 massa cum diligentia.

MYROBALANI omnes hoc pondus de-
 bent habere, exemptis nucleis siue lignis.

P I L V L A E ista Alephangina sunt efficaces,
 imò efficaciores prioribus: relinquimus tamen
 unicuique liberum arbitrium, alterutram vel
 utramque componendi.

Hoc loco non debet poni Dictamnus Creti-
 cus, sed radices Diptamni, quæ vulgò in usu
 sunt, & propriè cortex radicum eius. Germani-
 cè vocatur Aschvvurtz, propterea quòd folia
 eius sunt similia Fraxino arbori: & hæc est vera
 Fraxinella, vulgò ab Italis dicta.

Aloën lauandi modus in postrema huius li-
 bri parte, qua est De præparatione simplicium
 medic. docebitur.

T R O.

T R O C H I S C I.

Trochisci de Vipera D. Andromachi.

℞. Carnis viperinæ cum anetho, sale & aqua
coctæ ℥ viij.

Panis tritici purissimi triti & cribrati ℥ ij.

Formentur trochisci cum iusculo, in quo decoctæ fuerint carnes Viperinæ, & inungantur cum Opobalsamo, aut oleo Macis aut Garyophyllorū, aut Nucis moschatae: sed oleum Garyophyllorum propius accedit ad naturam Balsami. Siccentur in loco vmbroso, libero, ventoque perflabili.

VIPERA est serpens, quem recentiores vocant Tirum, Itali verò Marassum & Scurzionem, ut scribit Nicolaus Leonicens. ingrediuntur autem hi Trochisci in Theriacam: apud nos verò nondum licuit videre hoc serpentum genus. Igitur ex Italia peti debent veri Trochisci de Vipera.

Trochisci Scyllitici Andromachi.

℞. Scyllæ assatæ p j.

Farinæ Orobi ℥ viij.

Formentur Trochisci secundum artem.

Tro-

Trochisci Hedychroi D. Aëtj.

℞. Mari [*sine Maiorana, aut loco eius Dictamni Cretici.*]

Asari

Sampsuchi

Aspalathi [*eius loco sumatur semē Agnicasti.*]

Opobalsami [*eius loco accipiatur olemm Garyophyllorum.*]

Schœnanthi

Calami aromatici [*eius loco sumatur Galāga.*]

Phu pontici ana ℥ j. ḡ xv.

Xylobalsami Cinnamomi

Costi ana ℥ j. β.

Myrrhæ Troglodyticæ

Folij [*aut succedanei eius.*]

Spicæ nardi Indicæ Croci

Cassia ana ℥ iiij. β. ḡ xv.

Amomi [*aut succedanei eius.*] ℥ ij. ḡ xiiij.

Mastiches ana ℥ β. ḡ vij. β.

Vini veteris odorati dulcis quantum sufficit, formentur Trochisci.

M A R V M herba est non dissimilis Maiorana, eius loco accipitur Dictamnus Creticus.

S A M P S V C H V S, id est, Maiorana, quidam habent Amaracum, quod idem est. Non enim debet hoc loco accipi Matricaria, aut Co-

S

tula

rula foetida, qua etiam vocatur Amaracus.

ASPALATHVS est cortex quidā odora-
tus, eius loco accipe lignū Aloës aut Santalum
Citrinum odoratissimum, aut semen Agni casti.

FOLIUM.] pro Folio sume Spica Romana
radicum, Macis, ana partes aequales.

HI Trochisci appellātur ab Arabibus Alin-
daracaron, à recētioribus verò, vt Nicolao, sunt
parum immutati, & vocantur Diacoralii.

Trochisci Hedychroi D. Galeni.

R. Corticum radicū Aspalathi [ipsius loco
sumatur semen Agni casti.]

Calami aromatici [sume eius loco Galangam.]

Costi Asari Xylobalsami Phu

Amaraci [hic significat Maioranam.]

Massiches ana ʒ vj.

Schoenanthi Cinnamomi ana ʒ xij.

* Amomi Casiæ

Rheu pontici [eius loco sume Rhabarbarum.]

ana ʒ xv.

Nardi Indicæ

* Folij ana ʒ xvj.

* Myrrhæ Croci ana ʒ xij.

Omnia subtilissimè trita cum vino Faler-
no, in Trochiscos formentur, qui in vmbra ex-
iccentur,

iccentur, & Opobalsamo aut oleo Garyophyllorum inuncti reponantur.

GALENVS in libello De Theriaca ad Pamphilianum scripto, ad hunc modum precipit conficiendos esse Hedychroos Trochiscos. Sunt enim proximis non ignauiores.

Pro Aspalatho, quo caremus, licet accipere semen Agnicasti, aut Lignum aloës, aut Santalum citrinum odoratum. Oportet etiam diligenter advertere, ne pro Aspalatho Asphaltum legatur aut accipiatur.

Pro Amomo vero, quo caremus, pone Carpesium, aut vocatum Calamum aromaticum.

Pro vino Falerno, accipe aliud quoduis vinum generosissimum.

P. C. SCHOL.

Troch. horum descriptionem in Cordo vitiatè positam, hic ex Andernaci versione restitui.

Trochisci Hedychroi alij, Galeni.

Rx. Mari	Amaraci [id est, Maiorana.]
Asari	Aspalathi ana 3 ij.
Schoeni [id est, Squinanthi.]	
Calami odorati	Phi pontici
Xylobalsami	[aut succedanei eius.]
Opobalsami	[aut succedanei eius.]

S 2

Cin.

Cinnamomi

Costi ana ʒ iiij.

Myrrhæ

Folij Malobathri [aut succedanei eius.]

Nardi Indicæ

Crocī

Casia ana ʒ vj.

Amomi [aut succedanei eius.] ʒ xij.

Mastiches Chia ʒ j.

Vini Falerni quantum sufficit.

Formētur Trochisci, & in vmbra exiccētur,
Opobalsamo aut oleo Garyophyllorū vncti.*Pro Maro, sume Dictamnū Creticū.**ASPALATHI loco sume lignū Aloës,
aut Santalum Citrinū, aut semen Agni casti,
ut Galenus de Succedaneis dicit.**Pro Calamo, sume Galangam.**Pro Opobalsamo, sume oleū Garyophyllorum.**Pro Malobathro, sume Spica Romana ra-
dices, aut Spica Romana Radicū, & Macis
ana partes aequales.**A CASIA, id est, Casia lignea aromatica simi-
lis Cinnamomo.**AMOMI loco sume vocatū Calamū aro-
maticū.**MASTICHE Chia, id est, Mastix è Chio
insula, qua est optima.**HAEC est genuina Hedychroi compositio, ut
Gale-*

Galenus dicit, & hac debet ingredi Theriacam
Andromachi senioris.

GALENVS primo libro de Antidotis ad
hunc modum carmine describit compositionem
Hedychroi magmatis, ubi Theriaca compo-
sitionem docet. Non tamen diligenter distinguit
pondera rerum. Nam omnia coniungit con-
iunctionibus copulatiuis, *ti & xxi*, hoc est,
QVE & BT.

Trochisci Cyphi D. Damocratis.

A

R. Carnium Vuae passæ albæ & pinguiissimæ
Terebinthinæ coctæ ana ʒ xxiiij.

Myrrhæ

Schœni [id est, Schœnanthi.] ana ʒ xij.

Calami vnguentarij ʒ ix.

Cinnamomi ʒ iiij.

Bdellij Onychis Nardi spicæ

B

Cassæ optimæ [quæ est similis Cinnamomo.]

Cyperij purgati

Arceuthidum maximarū & pinguiissimarum
ana ʒ iiij.

Aspalathi ʒ ij. β. Croci ʒ j.

Mellis optimi

Vini ana quantum satis est ad formandum &
incorporandum.

S ʒ

M L L

MELLIS & vini parum debet addi, ut tantum cum his conficiantur Trochisci.

CARNES Vuae passae atque Iuniperi baccas recentes & pingues minutissimè cōscindito tundoq̃, deinde Bdellium Myrrhamq̃ affuso vino diluito, postea reliqua omnia in tenuissimum puluerem redigito, ac demum adhibito modico mellis despumati optimi, Trochiscos formato.

Arabes hos Trochiscos vocant Cochion.

Per Vuas passas hic intellige eas quas vocant Vuas Cybibas, vulgò Cibebe.

TEREBINTHINAE cocta: quomodo coquatur Resina Terebinthina, ostendam inferius in tractatu De preparatione medicamentorum.

CALAMVS unguentarius, id est, aromaticus verus, pro quo sume Galangam, quia hodie caremus vero Calamo aromatico.

ONYCHIS, id est, Blatta Byzantiae electa.

CYPERVM purgatum praecipit accipiendum, quoniam plerumque fibris sordidis sunt obsita radices eius.

ARCEUTHIDES, sunt baccae Iuniperi. hic autem debent accipi Iuniperi magna grandes baccae: quoniam autem caremus ipsis, vulgaris & minoris Iuniperi baccas accipere licet.

Pro Aspalatho sumatur semen Agni casti,

ex

ex mente Galeni de Succedanēis.

P. C. SCHOL.

Troch. hi apud Galenū leguntur lib. 2. Antid. A Onychis, Bdellij.] Fuchsius unā cum Cordo B duas hic distinctas res legit, intelligit ac defendit mordicus. Matthiolus verò atque Franciscus contrā, unā cum Andernaco & Martiano Rota Galeni interpretibus pro unica eademq; re, ambas eas voces intelligendas esse strenuè contendunt, & unguim Bdellij tamquam Bdellium ungui simile, legendum esse sentiunt atque volunt.

Trochisci Ramich D. Mesua.

℞. Succī Acetosæ [aut loco eius succi Citiorum austerorum.] ℥ xvj.

Rosarum ℥ j. Granorum Myrti ℥ ij.

Bulliant parū & colentur, colaturæ addatur Gallarum iamiam tenuissimè tritarum ℥ iiij.

Coquantur denuò aliquantulum, deinde inspergatur sequentium specierum minutissimus & optimè commistus pulvis.

℞. Rosarum ℥ j.

Santali Machoziri ℥ j. ℥ ij.

Gummi Arabici ℥ j. ℥ iiij.

Carnium Sumach

S 4

Spodij

Spodij ana ℥ j.

- Succi Agræstæ ℥ vij.
- Succi granorū Myrti multū tritorum ℥ iiij.
- Ligni Aloës Garyophyllorum Mastichis Nucis moschata ana ℥ iiij.

Misceantur omnia optimè, deinde exiccantur, exiccata rursus in tenuissimum pulverem terantur, & formentur Trochisci subtiles cum Camphoræ aureo vno, & aqua rosarum quantum sufficit. Exiccantur in vmbra libera, exiccati reponantur.

VENTRIVLUM, cor, hepat, imbecilla firmant: & lubrica viscera ac intestina, chole-ram morbum sistunt, acrimoniam obtundunt, animum reddunt tranquillum, omnem hæ-morrhagiam cohibent, ob quam naribus sanguine fluentibus flando impellitur, aliis medicamentis miscetur.

A *Trochisci de Cappare D. Mesua.*

Rz. Corticum radicum Capparis

Seminis Agni casti ana ℥ vj.

Seminis Nigellæ veræ

Calaminthæ

Succi Eupatorii [*id est, Gratiola.*]

- Acori

Amygda-

Amygdalorum amarorum

Sem. Nasturtij Ammoniaci

Foliorum Rutæ

Radicis Aristolochiæ rotundæ verę ana ʒ ij.

Cyperī

Scolopendriæ ana ʒ j.

Formētur Trochisci cū Hammoniaco prædicto in aceto dissoluto, & exiecati reponantur.

SCOLOPENDRION est Ceterach, & non Lingua ceruina.

P. C. SCHOL.

Troch. de Capp.] Compositionem hanc apud A
Cordum mancam esse cūm Fuchsius meritò
conqueratur, nos eam hic ex vetustis partim ex-
emplaribus, partim ex Minoritarū in Mesuem
(ex quibus pleraque alia) restitutionibus, sua
integritati reposuimus. Qui inquam, Fratercu-
li hoc nomine hercle plurimum laudis ac præ-
mij merentur, quòd extra professionem etiam ea
in re plura præstiterint soli, quàm innumeri alij,
quamquam eos cæspitare quandoque, & iudicio
carere interdum satis sit in confesso: laborem in-
terim indefessum, quem in restituendo impen-
derunt, negotiūque ipsum tam ingens, tantiq;
commodi nobis præstitum haud exosculari, ma-
gnisq; efferre præconiis non debemus. Immeritò
S S itaque

itaque nimisq̃, quàm decent, à quibusdã exagitantur boni fratres.

Ad splenis duritiem & flatus eius dissipandos valent.

Trochisci de Eupatorio D. Mesua.

R. Tereniabin [*id est, Manna.*]

Succi Eupatorii ana ℥ j.

* Rosarum ℥ β. Spodij ℥ iiij. β.

Spicæ nardi Indicæ ℥ iiij.

Rhabbari Asari

Anisi ana ℥ ij. β.

Formentur Trochisci cum aqua Cuscutæ, & in vmbra libera ventoq̃ue perflata exiccati reponantur.

Pro Spodio sumatur Ebur combustum.

EUPATORIVM Mesua, intelligendum est Gratiola.

OBSTRUCTIONEM & tumorem præter naturam hepatis & lienis sanant, ac innatas febres antiquas, & harum rigorem, icterum, ac incipientem hydropem.

A Trochisci Diani, seu potius, Dianõ D. Nicolai.

R. Florum Violarum viridium ℥ v.

Amyli ℥ iiij.

Seminis papaveris albi ℥ ij. ʒ j.

Rha-

TROCHISCI.

283

Rhabbarbari 3 j. 3 ij.

Seminis plantaginis 3 j.

Balsami [loco eius oleum Garyophyllorū.] 3 j.

Rhodostagmatis quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

DIANI, vel DIAVI, aliàs vocantur hi Trochisci, sed corrupto nomine.

PER VIOLAS, hoc loco oportet intelligere B
Violas albas, quæ hodie vocantur Cheyri Citri-
ni, vulgò Gelbe Violen.

Per Balsamum intelligitur Opobalsamum.

RHODOSTAGMA, id est, aqua Rosarum.

P. C. SCHOL.

Troch. Diaui.] horū Troch. duas descriptio- A
nes in idem recidentes, alterius pondere tantum
triplicato, mēdoq; in Rhabarb. pondere sublato;
temerè Cordus posuerat. Mancè enim ibidē 3 j.
quod & Fuchsf. ritè animaduerterat, positus
erat, cūm 3 j. 3 ij. ut restitui, legendum sit.

Per Violas.] Malè id sentit Cordus, ut & B
Fuchsf. docet: nō enim Dialeucoion, hoc est, ex Vio-
lis albis, quas Cheyri vocamus, sed Diaion, hoc
est, ex Violis nigris seu Martiis dictis, appellan-
tur hi Trochisci. Viola itaque Martia virentes
hic intelligenda veniunt.

Excalfactiones mitigāt, aluumq; emolliūt.

Tro-

Trochisci de Lacca D. Mesue.

℞. Laccae mundatæ

Succi Glycyrrhizæ

Absinthij

Berberis

Succi Eupatorij [*id est, Gratiola.*]

Rhabarbari Aristolochiæ longæ Costi Afari

Amygdalorum amarorum

Rubræ Tinctorum

Anisi Apij Schoenanthi ana ʒ j.

Formentur Trochisci drachmæ pondere cum aqua Eupatorij.

Mesue intelligit suum Eupatorium, id est, Gratiolam.

- * Trochisci de Lacca valent ad obstructiones hepatis & lienis, & inde natas febres varias antiquas, & ascitem per vrinas mouent.

Trochisci Diarhodon D. Nicolai.

℞. Rosarum viridium ʒ iiij.

Spodij [*id est, Eboris combusti.*] ʒ ij.

Santali rubri ʒ j. β. ʒ vij.

Santali albi ʒ j. ʒ xij.

* Croci ʒ ij. ʒ viij.

* Camphoræ ʒ xij.

Aquæ Rosarum quantum sufficit, formantur Trochisci.

Ista

*Ista compositio debet administrari in magnis
confectionibus ipsius Nicolai.*

Trochisci de Rhabarbaro D. Mesue.

Rz. Raved boni [id est, Rhabarbari.] 3 x.

Succi Eupatorii [id est, Gratiola.] 3 iiij.

Rosarum 3 iiij.

Spicæ nardi Indicæ Anisi

Rubeæ tinctorum Seminis Apij

Absinthij Asari ana 3 j.

Amygdalarum amararum 3 iiij.

Formentur Trochisci aurei vnus pondere
cum aqua Cuscutæ.

VALENT ad hepatis obstructionem, do-
lorem, tumores præter naturam, affectus inue-
teratos eiusdem, & hydropem, & icterum, &
formæ corruptionem.

Trochisci de Berberis D. Mesue.

Rz. Berberis 3 ij.

Spodij Xyloaloës

Seminis Accrosæ Mastiches

Galliæ moschatæ veræ

Spicæ nardi Indicæ ana 3 j.

Rosarum 3 v.

Gummi Arabici 3 iiij.

Aquæ rosarum quantum sufficit.

For-

Formentur Trochisci.

TROCHISCI de Berberis seu Oxyacanthæ valent ad intemperiem calidam, fluorem alui, & hepatis dolorem.

Trochisci Gallie moschatae D. Mesuæ.

℞. Xyloaloes crudi ʒ v.
Ambra ʒ iij. Moschi ʒ j.

Mucilaginis Tragacanthæ cum aqua rosarum factæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci parui.

CEREBRVM, corque roborant, vomitum & alui profluuium sistunt, oris atque adeo corporis totius odorem commendant.

Trochisci Alyptæ Moschatae D. Nicolai.

* ℞. Ladani purissimi ʒ iij.
Styracis Calamitæ ʒ j. β.
Styracis rubrae ʒ j.
Ligni aloës ʒ ij. Ambra ʒ j.
Camphoræ ʒ j. β. Moschi ʒ j. β.

Aquæ rosarum quantum sufficit.

Formentur Trochisci secundum artem.

STYRAX rubra, hic non significat Thymiam, aridum illum & nigrum corticem: sed resinam Styracis qua subrufa aut flaua est, id est, optima Styrax.

V A-

VALENT pueris patientibus asthma & constrictionem pectoris, & etiam non valentibus lac retinere. Fit inde optimū fumigium & odoriferum, & assumuntur etiam ad preciosissimas medicinas.

*Trochisci de Agarico D. Mesuæ cap. de
Agarico ex Haly.*

℞. Agarici electi ℥ iij. Salis gemmei ℥ j.
Syrupi acetosi simplicis quantum sufficit.

Formentur Trochisci, & reponantur in calido siccoque loco.

Purgant ex cerebro & capite phlegma crassum cū cholera mistū. Et præcipue educunt ex pectore crassos humores, putridos & viscosos.

*Agaricus Trochiscatus D. Mesuæ, cap.
de Agarico ex Galeno.*

℞. Agarici electi ℥ iij.
Vini infusionis Zingiberis quantum sufficit.
Formentur Trochisci.

Trochisci de Charabe D. Mesuæ.

℞. Charabis aureos	vi.
Cornu cerui vsti	Gummi Arabici assati
Corallij rubri vsti	Tragacanthæ
Acatix	Hypocystidis
	Balau-

Balaustiorum florum Mastiches Laccæ
 Papaueris nigri assati ana aureos ij.
 Thuris Croci
 Opij ana aureum j. β.

Mucilaginis Psyllij quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

Fiunt & hi Trochisci sine Opio.

TROCHISCI de Charabe siue ex Succino, inuenti sunt ad restringendum sanguinem vndecumque fluentē, menstrua, sputum, fluxum sanguineum, & hæmorrhoidalem: & consolidant vlcera pectoris & pulmonis.

Trochisci de Myrrha D. Rhasis.

℞. Myrrhæ ʒ iij. Lupinorum ʒ v.
 Foliorum Rutæ Mentastri
 Pulegij ceruini Cymini
 Rubæ tinctorum Assæ foetidæ
 Sagapeni Opopanacis ana ʒ ij.
 Succu Arthemisiæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci secundum artem.

MENTASTRUM est siluestris Menta pilosis & hirsutis foliis.

PVLEGIUM Cerninum, id est, Dictamnus Creticus.

Prouocant menstrua, & sedant passiones quæ

quæ ex retentione menstruorum proveniunt.

Trochisci de Alkekengi D. Mesue.

℞. Fructuum Alkekengi ʒ iij.
 Seminis Citrulli Seminis Albatechæ
 Seminis Cucurbitæ ana ʒ iij. β.
 Boli Armeniaci Gummi Arabici Thuris *
 Sanguinis Draconis Papaveris albi
 Amygdalorum amarorum
 Succi Glycyrrhizæ Tragacanthæ Amyli
 Pinearum ana ʒ vj.
 Seminis Apij Charabis
 Boli [*aut eius loco Terra sigillata.*]
 Hyoscyami Opii ana ʒ ij.
 Succi Alkekengi quantum satis fuerit ad for-
 mandum Trochiscos.

Fiunt & hi Trochisci sine Opio.

ALBATECHA siue Batega, est Melon
 magnus Indus, viridis & subniger.

TROCHISCI Alkekengi seu Halica-
 cabi valent ad renū & vesicæ vlcera, & natam
 inde dysuriam.

Trochisci de Rosis D. Rhasis.

℞. Rosarum ʒ iij. *
 Ligni aloës *
 Spicæ nardi Indicæ Mastiches *
 T Casia

Cassia lignea [aut succedanei eius.]

Florum Squinanthi Cinnamomi

Absinthij ana ℥ j.

Vini veteris quantum ad formandum Trochiscos satisfuerit.

Sunt efficaces ad multos affectus, præsertim ad ventriculi dolorē, malam coctionem, febres antiquas, hydropem incipientem, & illos maximè quibus forma corrumpitur.

Trochisci de Camphora Mesua.

℞. Rosarum ℥ iiij.

Spodij Glycyrrhizæ ana ℥ ij.

Seminis Cucurbitæ Seminis Citrulli

Seminis Cucumeris Seminis Melonis

Tragacanthæ Croci Gummi Arabici

Spicæ nardi Indicæ ana ℥ j.

Santali citrini ℥ ij. ꝑ.

Ligni aloes Cardamomi Amyli

Camphoræ ana ℥ ij.

Sacchari Tabarzeth

Terebinthina [id est, Manna] ana ℥ iiij.

Mucilaginis Psyllij cum aqua rosacea factæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

TROCHISCI Camphoræ cōferunt ad febres

febres ardentes, bilis & sanguinis feruorem,
ventriculi & hepatis intemperiem calidam, &
ab his sitim inexpletam: icterum quoque ac
phthisim & hecticam curant.

Trochisci de Terra sigillata D. Mesue.

Rx. Sanguinis Draconis

Gummi Arabici assati Trochiscorū Ramich

Rosarum rubrarum Seminis Rosarum

Amyli assati Spodij Acatix

Lapidis Hæmatitidis Hypocystidis

Florum Balaustiorum Boli Armeniaci

Terræ sigillatæ [*vel Boli Armeni.*]

Corallij rubri Charabis ana ʒ ij.

Margaritarum Tragacanthæ

Papaueris nigri ana ʒ j. β.

Seminis Portulacæ assati

Cornu ceruini vsti Theris

Gallarum Cypressi

Croci ana ʒ ij.

Aquæ Arnoglossæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

Et quandoque adduntur Opij ʒ ij.

S P O D I I.] pro Spodio sume Ebur combu-
stum preparatum.

z k m n Rosarū hic significat Antheram,

T 2

id est,

id est, luteos apices, qui sunt in Rosis: hi exiccati rubescunt.

GALLAE Cypressi, etiam vocantur nuces Cypressi.

P. C. SCHOL.

Mesues exemplaria Gallas absolutè scriptas habent.

SUNT admodū efficaces ad sputū sanguinis, cum aqua Plantaginis poti: ad fluore verò sanguinis è naribus, fronti illiti: ad menses immodicos, vtero iniecti vel pubi illiti: ad mictū sanguinis, in vesicam iniecti, & ad alias hæmorrhagias, parti sanguine fluenti impositi.

Trochisci de Spodio Mesue.

- ℞. Rosarum rubearum ℥ xij.
 Spodij ℥ x. Seminis acetosæ ℥ vj.
 * Seminis Portulacæ
 Coriandri præparati & tosti
 Pulpæ Sumach ana ℥ ij. β.
 * Amyli assi Florum balauftiorum
 Baccarum Berberis ana ℥ ij.
 Gummi Arabici assati ℥ l. β.
 Agrestæ quantum sufficit.
 Formentur Trochisci.

VALENT ad febres biliosas cū alui fluore: in-

re: inflammationem ventriculi & hepatis, & sitim continuam sedant.

Trochisci de Absinthio D. Mesua.

℞. Rosarum Absinthij Anisi ana ℥ ij.

Raued [*id est, Rhabarbari.*]

Succi Eupatorii [*id est, Gratiola.*]

Afari Seminis Apij

Amygdalorum amarorum

Spicæ nardi Indicæ Mastiches

Folij ana ℥ j.

Succi Endiuix quantum sufficit.

Formentur Trochisci secundum artem.

Pro Folio accipe radices Spica Romana, aut radicem Spica Romana, & Macis ana partes æquales.

OBSTRUCTIONES vētriculi & hepatis, & ab his dolorem, & febres antiquas tollunt, dictas partes reliquasque nutritorias roborant, ac appetentiam excitant.

Trochisci Albandal D. Mesua.

℞. Pulpæ Colocynthis ℥ x.

A

Incidantur minutissimè, & fricentur cū olei

Rosacci ℥ j.

Deinde sume

Tragacanthæ

Gummi Arabici

Bdellij ana ℥ vj.

T j

Mace-

Macerentur hæc in aqua rosacea, donec liqueant & dissoluantur: deinde cum parte resolutarum lachrymarum formentur ex prædicta Colocynthide Trochisci qui siccentur, & cum fuerint siccati, cōtundantur minutissimè, & rursus formentur Trochisci cum reliquo diluto lachrymarum, atque reponantur.

Trochisci Colocynthidos in Hierā Hermetis, & Cōpositiones alias iniiciendi loco Colocynthidos, suntq; salubriores quàm ipsa Colocynthis.

P. C. SCHOL.

ζ x.] Cordum hic falli Bernardus Dessennius in suis illis verbosis Cōmentariis, miserè exclamat, eò quòd ζ x. pro ζ x. ut ipse inquit, hic posuerit: cum ipsemet hac in re (ut & plerisque aliis locis) iudicio vacuus, toto erret calo. Verum in alio Dispensariolo Senatus sui iussu emissò, dextrè respicit, à suis collegis forsàn monitus. Proinde quid Fuchsius artis nostræ (ut & plurimis aliis locis liquet) nescius, in Pharmaceuticas rationes, hoc loco suis annotationibus imaginando deliret, nescio. Mihi brevitati studendam est.

Trochisci Bechij albi.

℞. Sacchari albißimi ʒ j.

Sacchari

Sacchari Candi optimi

Sacchari Penidij ana ℥ iiij.

Ireos ℥ j. ℥ viij.

Amyli ℥ ij. ℞.

Mucilaginis Tragacanthæ albissimæ eū aqua
Rosacea factæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci parui, & signentur.

AUXILIANTUR tussiculosis, & diffi-
culter spirantibus.

Trochisci Bechæ nigri.

℞. Succī Glycyrrhizæ ℥ iiij.

Styracis calamitæ ℥ j. ℞.

Sacchari candi ℥ ij. ℞.

Specierum Diaireos Salomonis

Specierum Lohoch sani ana ℥ ℞.

Sacchari penidij ℞.

Sacchari albissimi ℞ ij. ℥ iiij.

Mucilaginis Tragacanthæ cum aqua Hyssopi
factæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci & signentur.

ABSCISSÆ vocis iacturam refarciunt,
& profunt his qui patiuntur tussim calidam &
siccam, leniunt pectus, & faciunt sputum.

TROCHISCORVM DVAE

SEQUENTES VALERII CORDI

*descriptions huic editioni nunc
primum accesserunt.**Trochisci de Lacca Val. Cordi.*

℞. Laccae electae ℥ iiij.

Ligni Guaiaci scobina in minimam scobem
seu rasuram detriti ℞ j.

Coquatur lignum Guaiacum in ℞ iiij. aquae
caelestis ad consumptionē ferē dimidię partis:
In colatura deinde coquito rad. Rubeę tinctorum
℥ iiij. donec remaneat ℞ j.℞. Dein iterum
colato, & colaturę iniice predictas ℥ iiij. Lacce,
& ad ignē coquito, donec Lacca dissoluatur.
Postea colato & exprimito. & ab iice superflui-
tates Lacce. Colaturam dein ad spissitudinem
aliquā coquito, & insperge sequentes pulveres:

℞. Aristolochiæ longæ Radicis concavæ

Rhabarbari Costiveri ana ℥ ij.

Zedoariæ Galangæ Afari radicem

Curcumæ Cinnamomi Ligni aloës

Nucis moschatæ Schœnanthi ana ℥ j.

Camphoræ ℥ j.

Misceantur omnia optimē, & formentur
Trochisci drachmæ vnius pondere.

RADIX

*RADIX concava, Holvvurtz, quæ falsò
appellatur Aristolochia rotunda.*

Hos Trochiscos composui aliquibus ob-
structione splenis hepatisque laborantibus, &
præsenti auxilio id malum curauerunt.

Trochisci de Succino Valerij Cordi.

R. Ambrae excellentissimæ

Succini albissimi ana ℥ j.

Succini Phalerni

Succini cerei ana ℥ iiij.

Succini nigri Camphoræ

Margaritarum non perforatarum

Margaritarum perforatarum ana ℥ ij.

Onychis Dentaliorum

Entaliorum Umbilici marini

Lapidum cancrorum

Synodontum Ligni aloës Cinnamomi

Schœnanthi Nucismoschatæ Cubebarum

Cardamomi Croci Cyperi rotundi

Zedoariæ Doronici ana ℥ j.

Conterantur omnia minutissimè, & confi-
ciantur Trochisci cum mucilagine Tragacan-
thæ albissimæ in aqua Maioranæ dissolutæ.

AMBRA est succinum Orientale.

SUCCINVM est quod Arabibus vocatur

T ℥

Carabe,

Carabe, Germanis *Agstein* siue *Bernstein*: *Sandaniis*, *Gentar*: *Gallis*, *Ambre*. Est enim *Succinum* nihil aliud quàm *Ambra Germanica*.

Phalernum, id est, flauum & clarissimum, & omnino pellucidum.

Cereum, id est, quod *cera* colorem habet, non adeò pellucidum est.

Nigrum Succinum alio nomine vocatur *Gagates lapis*, Germanicè *Suuartzer Agstein*, oder *Suuartzer Bernstein*.

Inter emendū album *Succinum*, vitare oportet scobem & ramenta: nam hæc solent pro albo *Carabe* vendi. Cū enim *Cereum* aut *Phalernum Succinum* tornatur, candida ramenta remittit. Ideoq; integras glebas candidi *Succini* emere oportet. Est enim valde pretiosum.

Onychis, id est, *Blatta Byzantia*.

Vmbilici marini, Germanicè *Meerbonen*.

Lapis Cancrorum, id est, quos vocant *Oculos cancrorum*.

Synodonites lapides, sunt in capite *Synodontis* piscis inuenti: qui si haberi non possunt, quoniam piscis marinus est, pro iis accipiantur lapilli qui bini inueniuntur in capitibus pisciū *fluuiatiliū*, quos *Raulperszken* Germanicè vocant.

Hī *Trochisci* faciunt ad calculū, ad tumen-
tem

em ventriculum, vertiginem, epilepsiam, apoplexiam, tremorem & imbecillitatē cordis, ad paralyfim si dantur in aquis appropriatis, cum Betonicę floribus, aut Lauēdulæ, aut Tiliæ: & ad suffocationes & strangulationes vteri valēt.

O L E A.

Oleum ex ligno Iuniperi.

Fictile vas in foueā ponatur, supra id aliud fictile angusti orificij inuersum ponatur, recentibus Iuniperi lignis minutimque incisis plenum, cui subducatur lamina ferrea foraminibus peruia, vt destillet liquor, & ne ligni segmenta delabantur; bene autem aptentur, & luto sapientiæ circumlinantur fictiliū orificia, ne quidquam expiret. Postea inferius fictile vsq. ad collū superioris obruito terra, & facto pauimento ignem circa & supra fictile superius accendito atq. ardere finito aliquot horas. Postremo liquorem qui destillauit, auferto. Cuius vsus est purgandis sordidis vlceribus.

E M E N D A T cutis infectiones, serpiginem, cancrum, vlcera maligna, qualia quæ in tibiis & cruribus quorundam, malum mortuum recentiores vocant.

Oleum

Oleum ex Iuniperi baccis.

Oleum è Iuniperi baccis elicitur per artē distillandi, ut Vinū sublimatū. Quia verò minoris emitur quàm ut ab aliquo Pharmacopola preparari queat, confectionem eius nō indicabimus.

Oleum Nardinum simplex D. Mesuæ.

℞. Spicæ nardi aromaticæ ℥ iij.
 Vini Aquæ ana ℥ ij. ℞.
 Olei sesamini ℞ j. ℞.

Coquātur in duplici vase, donec vinū & aqua in vaporē resoluantur: coletur deinde oleum, & colatum reponatur abiecta Nardi spica.

VAS duplex, Gracè vocatur DIPLOMA; constat duobus crateribus, altero alteri imposto, ita ut in unum aromata & oleum coniiciantur, in alterum verò aqua fundatur, quæ subiectis prunis calefacta suo tempore unguenta & olea decoquit: est autem hoc notandū in omnibus aromaticis oleis quæ decoquuntur.

CALEFACIT, tenuat, digerit, modicè adstringit, proinde affectus omnes frigidos & flatulentos cerebri, ventriculi, hepatis, lienis, renum, vesicæ, uteri magnoperè iuuat: naribus iniectum caput purgat, corporis colorem & odorem commendat.

Oleum

Oleum Nardinum compositum D. Mesuæ.

℞. Spicæ Indicæ ℥ iij.

Sampsuchi [id est, *Maiorana*.] ℥ ij.

Xyloaloës Enulæ Folij Indi

Calamiaromatici [eius loco sumatur *Galāga*.]

Foliorum Lauri

Cyperī Schœnanthi

Cordumēni ana ℥ j. β.

Contundantur omnia grosso modo, deinde affunde illis

Aquæ fontanæ

Vini, ana quantum sufficit, i. circiter ℥ xiiij.

Olei Sefamini ꝑ vj.

Macerentur per noctē, deinde coquantur in Diplomate, id est, duplici vase, secundū artem.

ꝑ ꝛo Folio Indo, recipe Spica Romana radicum, macis ana ℥ v.

Oleum Costinum D. Mesuæ.

℞. Costi amari [optimi & veri.] ℥ ij.

Cassia [aut succedanei eius.] ℥ j.

Summitatum Sampsuchi ℥ ij.

Vini quantum sufficit

Olei Sefamini ꝑ ij.

Macerentur duabus noctibus, deinde coquantur in duplici vase secundum artem.

C A-

CASIA, *Aromatica vera*, & *Cinnamomum* similis accipi debet.

CALFACIT, obstructa aperit, neruosum genus roborat, vt neruos, musculos, tendones ligamenta, ventriculum. Præter hæc, hepatis & capillos: canitiem ob id moratur, & corporis colorem ac odorem commendat.

Oleum de Piperibus D. Mesua.

- ℞. Macropiperis [*id est, longi.*]
 Melanopiperis [*id est, nigri.*]
 A Leucopiperis [*id est, albi.*] ana ʒ iiij.
 Myrobal. Chebulorum
 Myrob. Bellericorum Myrob. Emblicorum
 Myrob. Indorum ana ʒ v.
 Radicum Apij
 Radicum Fœniculi ana ʒ iiij. β.
 Sagapeni Opopanacis
 B Ammoniaci ana ʒ ij. β.
 C Turbith albi ʒ ij. Zingiberis ʒ iiij.
 Caulis foliorum recentium
 Thymi viridis Rutæ viridis ana m. j.

Coquantur secundum artem in aquæ quantitate sufficienti ad tertias. Colaturæ adde olei de Cherua ℥ ij. & iterum coque ad consumptionem aquæ.

R. C.

Ana ʒ iiij.] Cordus malè ʒ iij. hic habebat. A
Ammoniacy.] Hyoscyami scdè in Cordole- B
gebatur.

ʒ ij.] ʒ xij. vitiosè Cordus scripserat, ut C
hæc omnia ritè à Euchsio quoq. dicuntur; quam-
quam à Monachis hausta esse non dubitem.

I V V A T morbos neruorū frigidos, ut para-
lysin, spasmus, spasmū cynicum, tremorem,
epilepsiam: adhuc ischiadem, & ceteras arthri-
tidis differentias, & vteri, coli, renū, vesicæ af-
fectus frigidos, quia calefacit, tenuat, terget: ob
id obstructions aperit, calculum frangit.

Oleum Mandragoræ D. Nicolai.

℞. Olei P. v.

Succi malorum Mandragoræ ʒ viij.

Succi capiti Papaueris hortenſis ʒ vj.

Succi Hyoscyami albi ʒ iiij.

Succi Violarum

Succi Cicutæ tenerrimæ ana ʒ ij.

Opii Styraçis ana ʒ j.

Confice sic: misce simul omnes succos oleo,
atq. in vitreo vase obſtructo oriſicio; Soli ex-
ponito per decem dies: vndecimo die coquan-
tur in duplici vase vsque ad consumptionem
succo-

lucorum: deinde ubi refrigerari cœperit, cola
&colato oleo adde Styracem & Opium, &
confice secundum artem.

STYRAX quidem sincerus & purus facil
in oleo dissolvitur.

OPIVM verò sincerum in oleo dissolui no
poteſt, igitur tenuiſſimè tritū inſpergatur oleo
& ſapè miſceantur: nam niſi in aqua aut vini
dissolvatur, non commiſcebitur oleo.

Non habentur apud nos Mandragora poma
ergo loco ſucci Mandragora pomorum accip
infra ſcriptam decoctionem.

R. radicū Mandragora, id eſt Corticū radi
cum eius ꝑ j. Contundantur, & coquantur in
aqua ſufficienti, & colatum decoctū ſuccis adde

AD nimios dolores capitis valet, & phre
neticis malè dormientibus fronti illitum, &
naribus iniectum vehemēter opitulatur, pul
ſibus brachiorum & plantis pedum illitum
quocumque modo vigiliis fatigatum celeriti
mè obdormiſcere facit.

Oleum Maſtichinum D. Meſue.

R. Olei Roſacei	℥	xij.
Vini odoriferi	℥	iiij.
Maſtiches electæ	℥	ij.

Coquan-

Coquantur secundum artem vsque ad consumptionem vini.

CEREBRUM, nervos, iuncturas, ventriculum, hepar corroborat, tumores duros lenit, dolores sedat.

Oleum de Euphorbio D. Mesue.

℞. Euphorbij ℥ β. Olei Cheyrini ℥ v.
Vini odoriferi tantundem, coque secundum artem vsque ad consumptionem vini.

IVVAT maximè frigidos cerebri & nervorū affectus, cephalalgiam, hemicraniam, lethargum, naribus immissum: articulorum quoque & hepatis, & splenis dolores, illitum iuuat.

Oleum Castorei D. Iacobi de Manlius.

℞. Castorei Styrcis calamitæ Galbani
Euphorbij Casia lignæ veræ Croci
Opopanax

Carpobalsami [aut succedanei eius.]

Spicæ nardi Indicæ

Costi ana ℥ iij.

Cyperī Schœnanthi Macropiperis

Melanopiperis Sabinæ

Pyrethri ana ℥ ij. β. Olei ℞ iij.

Vini odoriferi ℞ ij.

Confice sic Galbanū & Opopanaxem: in vi-

V

no

no seorsim dissolue, deinde reliqua omnia con-
tusa cum oleo & vino coquito ad cōsumptio-
nem vini in duplici vase: postea cola, & disso-
lutū & exprellum Galbanum cum Opopanace
oleo adfunde, & iterum coque ad cōsumptio-
nem vini, & repone sæpius miscens in poste-
rum, ut Galbanum & Opopanax in vasis fun-
do subidentes, oleo commisceantur.

Est optimum contra omnes ægritudines
frigidas, præsertim nervorum & iuncturarum,
medetur paralyfi, spasmō, tetano, & sedat
acerrimos rigores, & frigora febrium, si spina
dorsi linatur.

Oleum Scorpionum simplex D. Mesuæ.

- R̄. Scorpiones numero xx. vel xxx. secun-
dum eorum magnitudines.

Olei Amygdalorum amarorum ℞ ij.

- Maccurentur in vase vitreo stricti orificij per
dies xxx. caniculares ad solem, vel pluribus
diebus: postea colatum ad vsus reponere.

LAPIDEM renum & vesicæ frangit & ex-
pellit, lumbis, pubi, peritonæo illitum, aut per
meatum urinarium iniectum.

Oleum Scorpionum compositum D. Mesuæ.

R̄. Aristolochiæ rotundæ Gentianæ Cyperi
Cor.

Corticum radicum Capparis ana ℥ j.

Olei Amygdalorum amarorum ℞ j. ℥.

Macerentur in oleo contusæ radices ad Solem feruidum diebus viginti: deinde coquantur aliquantulum in duplici vase, iniectis ad ultimum scorpionibus numero xv. postea iterum serenis diebus xxx. ad Solem macerentur: postremo excolatum oleum reponatur.

*ARISTOLOCHIA rotunda non est Hol-
vurtz, sed radix lactei coloris, odore & sapore
Aristolochia longa: affertur ex Italia.*

V A L E T contra venena, & pestilentiam.

Oleum Formicarum.

℞. Formicarum alatarum quantum vis
Olei quantum sufficit.

Macerentur æstate ad solem diebus xl. post-
ea excolatum oleum repone.

V A L E T ad confortandum coitum.

Oleum Lumbricorum terrestrium.

℞. Vermium terræ ℞ ℥.

Oleum oliuarum ℞ ij Vini ℥ ij.

Bulliant omnia simul, & fiat oleum: deinde
percoletur & reseruetur.

N E R V O S in frigidatos confortat, & vile
est doloribus iuncturatum.

V 2

Oleum

Oleum Vulpinum D. Mesue.

℞. Vulpem detracta pelle, & abiectis inter-
neis, incidatur in partes, & coquantur in
aquæ fontanæ

* Aquæ marinæ ana ℥ iij. ℥ iiij.

Olei veteris clari ℥ iij. ℥ ix.

Salis ℥ iij. Inter coquendum adde

Anethi Thymi ana ℥ j.

Coquantur autem quousq. ab ossibus rece-
dat caro, & aqua consumatur; deinde coletur
oleum, & excolatum ad vsus suos reseruetur.

Qui prope mare non habitât, sumant aquam
salsam, id est, Muriam, siue aquâ fontium sal-
sorum, ubi salina fuerint. Porro ad coquendam
vulpem non sufficit aquarum præscriptarum
quantitas; ideo accipe quantum abundè sati-
fuerit, & fortiter ultimò oleum exprime.

Ad podagras, reliquasq. arthritidis species
ac dorsi, renumq. dolorem est efficacissimum.

Oleum de Cappare.

℞. Corticis radicis Capparis ℥ j.

Corticis Tamarisci Foliorum Tamarisci

Seminis Agnicasti

Scolopendriæ [id est, Asplenij.]

Cyperii ana ℥ ij. Rutæ ℥ j. Aceti

Vini

Vini optimi ana $\frac{3}{4}$ ij. Olei maturi $\frac{1}{2}$ j. *

Coquantur in duplici vase vsque ad consumptionem vini & aceti.

VALET duritiei, oppilationi, & dolori splenis, ac omni eius ægritudini.

Oleum de Lateribus D. Mesuæ.

℞. Laterem aut regulā rufam antiquissimam ex rufo luto ductam, eam confringe in frusta mediocria, & in prunis vrito, donec tota excauerint: deinde è prunis exempta fragmenta restinguito in oleo claro veteri, & dimittito quousque se oleo implenerint: postea oleo exempta in tenuissimū pulverem contundito, atque in Retortam aut Cucurbitam vitream indito, & secundum artem luto chymistico iuncturas vitrorum claudito, & subtus accensis prunis oleum elcito, & elicitedum reponito.

Conuenit omnibus morbis frigidis. Est enim calidum, penetratiuum, resolutiuū, molliat dura, & discutit tumida. Opitulatur his qui patiuntur epilepsiam, vertiginē, obliuionem, paralyfin, spasmus, dolorem dorsi & genuum, podagram, vel alios iuncturarum & neruorum morbos: medetur spleni, vesicæ & renibus.

V 3

Oleum

Oleum Terebinthinæ.

℞. Resinæ Terebinthinæ aut Laricæ, quam in Germania Terebinthinam vocamus ℞ iij. cam pone in capacem Retortam, siue Cucurbitam vitream, & per artē destillatoriam elice eius oleum, ita vt Cucurbita aut Retorta arenæ imponatur. Primò autem cum aqua exhibit oleum tenue & clarum, secundò aurei coloris, ultimò fuscum & crassum, horū vnumquodque per se auferto & reposito.

CONFERT omnibus ægritudinibus frigidis, & maximè neruorum.

Oleum Tartari.

℞. Tartari puri ℞ iij.

Pone in ollam, & vre in fornace cum lateribus aut tegulis aut fictilibus, vel per se, donec omnino excandescat Tartarū. Postea impone in sacculum lanco panno factum, & suspende in cellario, tum destillabit ex eo clarus quidam liquor, quē repone. Porro re vera hic humor non est oleum, sed acerrima aqua.

VALET ad faciē tergendā, & erugandam.

Oleum Cytoniorum D. Mesuæ.

℞. Cytoniorum non excorticatorum
Succi Cytoniorum ana quantum sufficit.

Incidite

Incidito Cytonia, & impone in vas vitreum, & affunde succum. Affunde etiam oleum omphacinum, hoc est immaturū, vt excedat eius quantitas succi mēsuram. Postea stringe vasis orificium, & ad Solem omnia macera, aut in æstuario diebus quindecim: deinde coque in duplici vase, & abiice posthac Cytonia, & adde recētia, & rursus macera & coque, inde etiam tertio recentia Cytonia impone, & prædicto modo omnia perage, tum repone diligenter obstruētum, ne expiret.

Hodie tanta diligentia non fit hoc oleum: igitur rogo vt maiorem diligentiam impendant.

Est optimum contra debilitatem stomachi, vomitum & fluxum, sistit sudorem, restaurat resolutionem, lapsas vires, corroborat nervos & vires, confortat digestiuam.

Oleum Sampsuchinum.

℞. Foliorum Sampsuchi m. iij.
 Serpylli m. ij. Foliorum Myrti m. j.
 Abrotoni Sissimbrij ana m. β.
 Casia lignea vera ℥ ii.
 Olei omphacini quantum sufficit.

Concidito & contundito omnia, & vitreo vasi impone ac infunde oleū vt supra species emineat:

emineat: tum obstrueto vasis orificio macera
ad solem vel in æstuario diebus octo. Postea
exprime, & expressum oleum infunde recenti-
bus speciebus, & hoc etiam tertio facito.

*Folia vera Myrti accipi debent, qua ex Italia
& Narbonensi Gallia afferuntur.*

*SISIMBRIVM, id est, Mentha aquatica.
est & aliud Sisimbrium in montibus nascens,
multo odoratius, quod melius esset si ubique
haberi posset.*

*OMPHACINVM, id est, ex immaturis
oliuis expressum.*

LASSITVDINI utile est, & morbis ce-
rebri & neruorum prodest, ob id in balneo in-
unctum paralytim iuuat & spasmodum cynicum,
vulgo torturam oris. naribus iniectum: & au-
ribus immissum à flatu tinnitum dissipat, naen-
ses ciet, ac morsui scorpionis prodest.

Oleum Vitellorum ouorum.

- ℞. Qua recetia numero centum; coquito donec
penitus indurentur. postea vitellos eorum
exime, & cominutos assa in sartagine mo-
uendo donec rufescant, & pinguedinem quan-
dam remittant: deinde offam feruentem in-
iice in sacculum pilis contextum, & exprime,
quodque

quodque expressum fuerit oleum repone.

EXPERIENTIA plurima probatū est, cutim expurgare, impetiginem, serpiginem, & alia cutis vitia persanare, capillos regignere, & ulcera maligna & fistulosa curare.

Oleum Hyperici Iacobi de Manliis. *

℞. Summitatum Hyperici iamiam maturefcentis ℥ iij.

Maceretur in vino odorifero diebus iij. bulliant deinde in vase duplici obturato orificio vasis: postea exprime, & recentis Hyperici par pondus iniice, & iterum macera & coque, & exprime, tum etiam tertio recens Hypericum adde: & si vinū minuitur, adde aliquid. Postea

℞. Terebinthinæ claræ ℥ iij. *

Olei veteris clari ℥ vj. Croci ʒ j.

Coquantur in duplici vase vsq. ad consumptionem vini: postea exprime, & à sedimento purgatum oleum repone.

CALIDVM est & siccum, stipticum, ob id consolidat vulnera incisorum neruorum & combustionem ignis, sedat dolores femoris & vesicæ, & prouocat vrinam.

Oleum Irinum.

℞. Olei ℞ vj. Vini ℞ j.
V s Laue.

Lauetur oleum ter in aqua calida, deinde effusa aqua adde vinum, & insperge

Macis ℥ iiij.

Cardamomi Zedoariz ana ℥ ij.

Macerentur in loco aliquo calido, obstructo vasis orificio per dies octo: postea in duplici vase coquito, usque ad consumptionem vini dimidij. Postea exprime oleum, & insperge ei puluerem subtilem

Iridis Illyricæ ℞ ij.

Macera vt prius diebus octo, deinde exprime oleū, & recentis Iridis contusæ par pondus iniicito, tunc rursus ad solē aut loco calido diebus viij. macerato, & rursus exprime. Postremo etiā tertio exprime, & aliam Iridē adde, & similiter omnia perage: deinde in duplici vase oleum vnā cū vltimo inspersa Iride aliquamdiu coquito; ad vltimum deinde exprime & repone oleum; cumque videris subsidere ad fundum vasis Iridis puluerem, leuiter cola.

Cū ita permutatur crebrò Iris, oleo singulis vicibus aliquid decedit: ideo boni ponderis ℞ vj olei accipiantur.

ATTENUAT, resoluit, maturat, & digerit malos humores phlegmaticos pectoris & pulmonis, faciliat sputum & anhelitum, sedat tussim

tussim & frigidos dolores hepatis, splenis & maximè matricis, resoluit dura apostemata, & mollit durities, & confert spasmo, doloribus iuncturarum, aurium, & foetori narium.

Oleum Irinum D. Nicolai Alexandrini. A

℞. Olei sextarios x.
 Aquæ sextarios iiij.
 Radicum Iridis r iiij. ℥ iiij.
 Crini domestici radice ℥ xv.
 Cyperi viridis radicum ℥ vj.
 Helenij ℥ iiij. Anchusæ ℥ ij.
 Cinnami Assæ Spicæ ana ℥ j.

Contundantur radices & aliæ species, & macerentur in oleo & aqua diebus quinque ad solem vel loco calido, obstructo vasis orificio: postea supra lentas prunas in duplici vase coquito, donec aqua consumpta fuerit; deinde refrigerare finito; ultimò exprimito, & cum aliquid subsederit, sensim excolato oleum.

Nicolai Alexandrini Latinum & impressum exemplar ita tradit huius olei confectionem.

SEXTARIUS Romanus, mensura est quæ habet olei uncias ponderales xvj. ℥ v. ʒ j.

CRINON domesticum, id est, Liliū odoratum album quod in hertis plantatur.

Non

Non ubique habentur radices Cyperi virides, ideo aridas sume, & vino asperge tritas.

HELENI, id est, Enula Campana, videlicet radicum eius.

ANCHUSA, est Buglossa silvestris, rubra radice, quam aliqui hodie non rectè Alcantham vocant: tinguntur ea radice unguenta, & cera.

B CINNAMVM, id est quod Cinnamomum.

C ASSAE] ego hic non dulcem Assam, sed foetidam ponere, licet tamen utriusque ꝑ ꝑ. accipere.

P. C. SCHOL.

A Oleum Irinum Nicol. Alex.] Cùm Myrsi descriptio ab hac Nicolai diuersa sit, temerè Fuchsius hanc erroneam dicit.

B Cinnamum.] Cinnamomum inò legendum, aliquantulum nempe differunt, ut alibi diximus.

C Assæ.] Num huius loco Cassia cum Fuchsio legendum sit, videndum. Interea fallitur Cordus, Azam hic foetidam intelligendam putans.

VSRPATVR ad diuturnum catarrhum naribus illitum. Ozenas & putredines narium aufert, tinnitum aurium cum aceto & ruta & amygdalis amaris commistum, & auribus iniectum tollit, asthmaticis gargarismo adhibito opitulatur, hæmorrhoidas veteres inunctum siue colo iniectum educit.

Oleum

Oleum Moschelinum D. Nicolai.

℞. Olei puri ℞ viij.

Aqua ℞ iij.

Folij [aut succedanei eius.]

A

Spicæ nardi Indicæ

Costi [odorati & veri.]

Mastiches ana ℥ iij.

Styracis calamitæ Croci

Myrrhæ Troglodyticæ

Xylocinnamomi [in eius absentia corticis B
Cinnamomi.]

Cassæ lignæ veræ ana ℥ j. β.

Carpobalsami [aut succedanei eius.]

Garyophyllorum Bdellij ana ℥ j.

Moschi ℥ vj.

C

Nuces Indicas num. iiij.

Confice sic: Folium aut eius succedaneum,
Myrrham, Cassiam, Carpobalsamum, & Bdel-
lium tere, & per biduum in aqua & oleo ma-
cera: postea coque supra lentum ignem in du-
plici vase usque ad consumptionem aquæ: de-
inde reliqua omnia in tenuissimum pulue-
rem redacta insperge, excolato & expresso
oleo, & iterum macera & coque parumper:
ultimò deinde Moschum admisce, & reponc,
&

& patere ut aromata subfidant; ea interdum oleo commisce, agitato vase.

Ex Nicolao Alexandrino desumptum est hoc oleum, apud quem non puri, sed Punico olei legitur, id est, in Aphrica nati, quod omnium optimum & dulcissimum existit.

Pro Felio sume radicularum Spica Romana,
macis ana \mathfrak{z} j. β .

Pro Xylocinnamomo sume Cinnamomum electum.

D N V X Indica hic nō significat grandem illam nucē quā ubiq. Indica nux vocatur, sed nucem moschatam. Nam ueteres Græci eam appellant Caryon siue Carydion Indicon, id est, Nucē siue nuculam Indicam: vocatur etiam Caryon Myrsiton, id est, Nux unguentaria siue odorata: & Moschocaryon, hoc est, Moschata nux. quod diligenter in hoc oleo notandum est.

P. C. SCHOL.

A Aquæ] Fuchsius. vinum aqua loco sumendum satis aptè dicit.

B Xylocinnamomi.] Nicolai Alex. exemplar Xylocinnami legit.

C Moschi \mathfrak{z} vi.] Nimia certè quantitate: quare forsā \mathfrak{z} iij. legenda erunt, ut pro duobus ij inferius in unum contractis, & scriptores olim

olims cecutientes legerint.

Nux Indica.] Nuces Indicas hodie passim **D**
 vocatas Fuch. hoc loco intelligendas, non Nuces
 moschatas vulgò appellatas, contendit: eo quòd
 hasce veteribus Græcis cognitæ non fuisse cõstet.
 Verùm id ipsum & de Garyophyllis ac Mosche
 banc cõpositionem quoq. ingredientibus dici pos-
 set; quod non perpendit Fuchsius. Posterioris æ-
 renim seculi cõpositionẽ hanc esse, quod omnia
 hic commemorata cognovit, est indubitatum.

Est optimum ad omnem frigiditatẽ cor-
 poris, potissimũ ventriculi, & ad dolorem late-
 ris foris inunctũ. Stranguriosis & colicis, & ad
 omne nervorum vitium illitum optimẽ facit,
 miscetur epithematibus & emplastris quæ ad
 stomachi & renum affectiones asciscuntur.

Oleum Rutæ.

Rutæ recentis incisæ & contusæ quantum
 libuerit, pone in vase vitreo, & affunde olei
 veteris clarissimi sufficientem mensuram, &
 macera ad solem, aut in loco calido aliquo
 diebus quindecim: deinde in duplici vase
 coquito, & abiecta Ruta recentem iniici-
 to, & iterum quindecim diebus macera-
 to, postea simili modo coquito & exprimi-
 to.

to, & tertio recentem Rutam iniice, m
cera quoque & cola.

*Ita debet praparari oleum hoc & aliqu
sequentia.*

E S T calidum, apertium, resolutium,
mitigatium dolorū, calefacit renes, vesicam
matricem, & sedat dolores eorum, & maxim
colicam, si venter vngatur, & fiat ex eo sol
clyster: prætereà opitulatur nervis, confert
spasmo, & expellit frigidos humores.

Oleum Anethinum.

Oleum Anethinum fit ex floribus & foli
Anethi, & oleo veteri claro, eodem modo qu
Rutaceum oleum.

S E D A T dolores, aperit poros, & resolu
vapores & apostemata, tumores & durities
mitigat dolores & rigores febrium, prouoca
somnum & sudorem.

Oleum Chamæmelinum.

Oleum Chamæmelinum siue Chamomil
læ, vt vocant, fit ex floribus Chamæmeli, id
est, Chamomillæ, & oleo veteri claro, vt Ru
taceum oleum.

V A L E T ad plura; aperit poros, resoluit va
pores, sistit fluentes humores, corrigit malas
quali-

qualitates, confert nervis & membris nervosis, & apprimè mitigat dolores.

Oleum Lilinum.

Oleum Lilinum, siue Liliorum, fit ex Liliis albis odoratis recentibus, & oleo veteri claro, vt oleum Rutaceum.

SEDA T frigidos dolores pectoris, renum, vesicæ, matricis, & colicam: est enim calidum, resolutivum, mitigat tussim, & efficaciter resolvit, & citius maturat apostemata.

Oleum Narcissinum.

Oleum Narcissinum fit primo Vere ex recentibus floribus albi Narcissi, qui vocatur Germanicè Mertzenblum, vveyshornungsbium, vveyssaprillenblum, vveyss Iosepssitebe: fit vt Rutaceum.

VALET ad emolliendas vulvæ duritias, præclusionesque.

Oleum Ligustrinum Mesua.

Oleum Ligustrinum, quod Græci vocant Cyprinum, Arabes autem oleum de Alcanna, fit ex floribus recentibus Ligustri florentis vite, aut paulo post, & oleo veteri clarissimo ad modum Rutacei olei.

Ligustrum est arbuscula salicis fere folio, floribus

X

bis

bus paruis candidis, veluti spumosis & mucosi.
 Germanicè vocatur Reynvveyden & Munt
 holtz. Nascitur copiosè ad Rhenū, & in Misnia
 Hestia, Sueuia, Vvirthēbergenfi agro, Thuringia
 & circa Nurembergam, non longè à Kalckreut

PARTES neruofas roborat, & capillos
 canitie vindicat.

Oleum Sambucinum.

Oleum Sambucinum fit ex floribus Sam-
 buci, & oleo veteri clarissimo, quēadmodum
 etiam oleum Rutaceum.

LENIT, abstergit, & mūdificat cutim, mede-
 tur ictericæ, & maximè hepatis infirmo, oppi-
 lato, & plurimū cōfert doloribus iuncturarū

Oleum Iasminum.

Oleum Iasminum, quod Arabes vocant Ia-
 seminum & oleum de Zambach, fit ex flori-
 bus Iasminis, siue Iaseminis, siue Zambachi, &
 oleo veteri claro, vt oleum Rutaceum.

Est Iasma flos similis Violis aut Cheyri, ad-
 modum odoratus: nascitur in frutice, qui multis
 viticulis ascendit pergulas & concamerationes,
 vt vitis. Colitur in Italia & Gallia.

OPITVLATUR corporibus quæ calefa-
 ctionem laxationemque desiderant.

Oleum

Oleum Cheyrinum.

Oleum Cheyrinum fit ex Leucois luteis, hoc est, ex Cheyris citrinis & oleo veteri claro, ut Rutaceum oleum.

Cheyri Germanicè dicuntur Gelbe-Violen.

D O L O R E S nervorum aliarumque partium corporis mitigat, eaque quæ in thorace, renibus & vesica sunt, discutit.

Oleum Myrtillorum.

Oleū Myrtillorū fit ex Myrtillis, hoc est, baccis veræ Myrti, & oleo omphacino, hoc est, immaturo, eodem modo quo Rutaceum.

Myrtus vera apud nos nō nascitur: neq. habemus semper virides Myrtillos, sed aridos: ut plurimum enim ex Hispania & Italia afferuntur: idcō necesse est ut vino odorato aspergantur.

R E F R I G E R A T & adstringit, ideoq. coeliacis affectibus subuenit, sanat igne ambusta, pustulas erumpentes illitu emendat, attritus hyeme cōcitatos, & intertrigines illitum corrigit. Sedis rimas, condylomata, laxatos artus persanat, & sudores coërcet.

Oleum Myrtinum.

Oleum Myrtinum fit ex foliis veræ Myrti & oleo Omphacino, id est, immaturo:

X 2

quem-

quemadmodum oleum Myrtillorum.

Quoniam verò Myrti vera recentia folia apud nos haberi nequeunt, ideo sume folia Myrti vera quæ ex Italia & Narbonensi Gallia & Candia afferuntur denud, & asperge ea confusa vino veteri odorato, ut dictum est proximè in oleo Myrtillorum.

C E R E B R V M, nervos, cor & ventriculum roborat.

Oleum Mentha.

Oleum Menthae fit ex Mētha crispa sativa & oleo omphacino, id est, immaturo, eodem modo quo Myrtinum aut Rutaceum oleum.

Ventriculum refrigeratum & imbecillum calefacit: firmat nauscam, vomitumque reprimat, appetentiam excitat, coctionemq. iuvat.

Oleum Absinthij.

Oleum Absinthij fit ex Absinthio Pontico & oleo omphacino claro, quemadmodum oleum Rutaceum.

Absinthium Ponticū nos non habemus, quod videlicet non adeò calidum est, sed suavioris odoris & valde adstringens. Nostrium verò Absinthium siue rusticum Absinthium calidius est, & nihil ferè adstringit, ut etiam Galenus scri-

scribit: ideo corrigendum est cum Rosis, quæ dimidium eius pondus æquent.

C A L E F A C I T, ac roborat ea quæ sunt refrigerata, potissimum verò ventriculum, excitat appetentiam, obstructions aufert, lumbricosque enecat.

Oleum Rosaceum.

Oleum Rosaceum siue Rosarum fit ex Rosarum rubearum nondum penitus apertarum decerptis foliis & oleo Omphacino, id est, immaturo, eodem modo quo Rutaceum oleum.

Refrigerat & adstringit, inflammationibus præsidio est, æstuantem ventriculum restinguit, erosiones intestinorum clysteribus inditum & dolores dentium, si eo colluantur, sanat.

Oleum Violaceum.

Oleum violaceum siue Violarum, fit ex floribus Violarum & oleo Omphacino, id est, immaturo, quemadmodum Rutaceum & Rosaceum.

R E F R I G E R A T, incandescentibus inflammationum feruoribus vtile est.

Oleum Nenupharis albi.

Hoc oleum fit ex recentibus floribus Nenupharis, quæ albos flores producit; & oleo

X ;

Om-

Omphacino, quemadmodum Violaceum.

N Y M P H A E A T V M oleum vires habet Violati: refrigerat tamen magis quàm Violatum, & minus quàm Papauerinum: hypnoticis, & intemperaturam partium, vt renum, calidam sanantibus vtiliter mīcetur, & Veneris tentiginem prohibet genitali inunctum, somnum etiam conciliat.

Oleum Nenupharis Citrini.

Hoc oleum fit ex luteis, siue Citrinis Nymphaeæ, hoc est, Nenupharis floribus, & oleo Omphacino, vt Violaceum oleum.

Oleum Populinum.

Populinum oleum fit primo Vere ex oculis Populi arboris cōtusis & oleo veteri claro, loto in aqua calida aliquoties, eodem modo quo Rutaceum aut Anethinum oleum.

Oleum Populinum D. Nicolai Alexandrini.

℞. Olei ℥ lxxxvj. faciunt

℞. P. vij. ℥ ij.

Vini P. iij.

Gemmarum Populi arboris recentium Veris initio collectarum ℞. iij.

Gemmae Populi duntissimè terantur, & macerentur in vino & oleo diebus septē, & quotidie

tidie sæpè agitentur. Octaua deinde die supra lentas prunas in duplici vase coquito, vsque ad consumptionem vini: deinde exprimatur oleum & reponatur.

Porro hoc oleum efficacius erit, si secundo & tertio recentes Populi gemmæ addantur.

G E M M A E Populi, id est, oculi Populi.

Expediit ad capitis dolorem, arthriticis, nephriticis & podagricis, & vbicumque dolor fit.

Oleum Amygdalorum dulcium.

R. Amygdala dulcia sicca, non tamen rancida, contundantur minutissimè: postea in sartagine aliquantulum torrefacies affuso aquæ Rosacæ modico, postea prælo exprime.

L E N I T asperitates pectoris, gutturis & pulmonis, duritiem & siccitatē iuncturarum: est suauis in cibis, & confert hecticis & phthificis; impinguat, augeat sperma, sedat tussim & ardorem vrinæ, vesicæ & vuluæ excoriatæ, cum fistula iniectum.

Oleum Amygdalorum amarorum.

Fit hoc Olexm eodem modo quo ex dulcibus Amygdalis.

A P E R I T oppilationes, & discutit ventositates & vapores, sed potissimū medetur surdi-

tati, sibili & dolori aurium, lenit duritiem
neruorum, & delet maculas faciei.

Oleum Balaninum.

Oleum Balaninum fit ex Balano Myrepfica, id est, Glande vnguentaria, quam Arabes vocant Granum Ben: Fit autem ex tulo allatoque, affusa Rosacca aqua, fructu isto.

Fructus hic ipse Auellanae magnitudinem habet, colorem candicantem, & figuram ut plurimum triangularem. Cortice tenui claudit pinguem quendam nucleum fungosa & alba tunica inuolutum. affertur ex Syria & Arabia.

OLEVM Balaninum repurgat maculas, varos, lentigines, cicatricum nigras, fucos, alium soluit, sed ventriculo aduersatur, dolores aurium emendat. Item si sonant aures, vel
* strepitum, aut sibilum edunt, cum adipe infusum auxiliatur.

Oleum de Cherua.

Oleum hoc fit ex pingui quodam semine, quod Arabes Cherua, Græci Crotona, Latini Ricinum vocant. Fit autem eodem modo quo oleum Amygdalorum.

Planta quæ semen hoc producit, vocatur à recentioribus Cataputia maior, ab Italis Palma Christi.

*Christi, & Mira solis; à Germanis VVander-
baum, Zekensame, & Heydnisch Sprinckorner.*

PRODEST psoris, vlceribus capitis erum-
pentibus, sedis inflammationibus, vuluis quæ
occlusæ conuersæque strangulant, cicatricibus
fœdis, aurium doloribus, potu aluum ciet, si
quis aquis grauat, lumbricos eiicit.

Oleum Papaueris.

E semine vtriusq. Papaueris tã albi quàm
nigri exprimitur oleum, eodem modo quo ex
Amygdalis, Balano Myrepica, & Cherna.

IMPINGVAT, asperam arteriam lenit,
febrium ardorem mitigat, & insomnium.

Oleum Hyoscyami.

Hoc oleum exprimitur ex Hyoscyami se-
mine eodem modo quo ex Papauere.

Oleum Spicæ.

Oleum Spicæ fit per destillationem ex ma-
iori Lauendula, quæ Spica vocatur.

*Hoc oleum apud nos maioribus sumptibus fit
quàm in Gallia Narbonensi, ideò potius emendũ
est à mercatoribus, qui illud è Gallia afferunt.*

Oleum Laurinum.

Oleum Laurinum apud nos non facilè fie-
ri potest: quoniam verò in magna copia affer-

X 5

tur

tur ex Italia & aliunde, ideo facile emitur à Materialistis.

CALIDUM est & apertiuū, mitigat colicam & frigidos dolores ventris, stomachi, capitis, hepatis, splenis, renum, matricis, nervorum, iuncturarum, denique omnibus ægritudinibus frigidis confert.

Oleum Seseaminum.

* Oleum Seseaminum exprimitur è Seseami semine, eodem modo quo de sem. Papaveris.

Sesamum verum affertur ex Alexandria Ægypti Venetias: nunc ex Italia & Hispania, unde ematur sincerum; nam adulteratur oleo Nucum & Papaveris, sed odore & sapore facile apprehenditur à peritis dolus.

OLEUM Seseaminum impinguat, auget sperma, lenit guttur, & omnem asperitatem & duritiem, & clarificat vocem.

Petroleum Flauum.

Petroleum clarum, quoddam est album, quoddam verò aurei coloris: Defluit autem ex petris in Italia & plerisque aliis locis, unde ad nos affertur.

CALEFACIT, siccatur, essentiæ tenuitate in altum penetrat, digerit: proinde materiam omnem

omnem excrementosam consumit, ob id epilepsia, paralyfi, vertigini, obliuioni, & lienis, renum, vesicæ, vteri, neruorum, articulorum omnium, & reliquarum partiū neruosarū doloribus frigidis maiorem in modum confert.

Petroleum nigrum.

Petroleum nigrū, siue Naphtha nigra, crassius est quàm flauum: Gignitur autem in agro Brochdorpio & Brunsvicensi in Saxonia.

PETROLEVM, *id est, Naphtha.*

OPOBALSAMVM SVCCEDANEVM PRETIOSVM EVRICII

Cordi, qui Valerij pater fuit, huic editioni ex Val. Cordi scriptis nunc primum accedens.

R. Iridis Illyricæ

Zarnabi longi [*id est, Zedoaria.*]

Zarnabi rotundi [*id est, Zurumbet.*]

Cubebarum Cardamomi maioris

Cardamomi minoris Agallochi

Olei Benzoi ana 3 iiii.

Garyophyllorum Nucis moschatae Macis

Arceutidum [*id est, gran. Iuniperi.*]

Cassiae Cinnamomi Santali citrini

Benzoi

Benzoi ana ℥ ij.

Crocī Afari Maioranæ Schœnanthi

Nardi Celticæ rad. Rosarum rubearum

Cyperī longi &

rotundi ana ℥ j.

Camphoræ ∅ ij. Moschi ∅ j.

Hæc omnia trita macerentur in vino Rhe-
nано ter sublimato, diebus octo. Postea dili-
gentissimè distillantur in balneo. Distillatæ
deinde aquæ quæ primo exiuerit, cape ℥ vi. in
quibus dissolue optime, candidissimæ, electæ
que Myrrhæ ℥ ij. sic tenuissima & præstantis-
sima pars Myrrhæ, aquæ vitæ miscetur: crassior
verò instar fecis subsidet, quæ nequaquam est
separanda aut excolanda: quoniam in fundo
dimissa ipsum Opobalsamum aliquot annis
conseruabit incorruptum.

V N G V E N T A.

Vnguentum Agrippæ Regis D. Nicolai.

℞. Radicum Bryoniæ ℞ ij.

Radicum Cucumeris asinini ℞ j.

Scyllæ ℞ β. Ireos ℥ iiij.

Radicum Filicis Radicum Ebuli

Tribulorum aquaticorum ana ℥ ij.

Cera

Ceræ albiſſimæ ℥ xv. Olei albiſſimi ℥ iij.

Radices omnes iſtæ recentes inciſæ & conuſæ macerentur in oleo per dies octo: deinde coquantur, poſteâ exprimantur: & in colato oleo & expreſſo reſoluatur cera, & fiat vnguentum ſecundum artem.

Apud Nicolaum Alexandrinum inuenitur idem vnguentum: ſed impreſſi codices nō habent radices Filicis & Ebuli, & Tribulos.

Oportet omnes iſtas radices & tribulos eſſe recentes. quòd ſi neceſſitas urgeat, & non ſint ad manus recentes; tunc ſume ſiccatas, & af-funde vini optimi ℥ iij.

TRIBULI aquatici ſiue marini, ſunt A vvaſſernuſſe, & ipſi fructus accipi debent.

P. C. SCHOL.

Tribuli aquatici.] Deſſennius verò contrà, A nō fructus, ſed radices hic intelligēdas eſſe putat.

HYDROPICIS omnibuſque corporis ædematibus ſuccurrit. Neruorum mala ſanat, urinam mouet, extrinſecus illitum ventrem ſubducit, dolorique renum vtile.

Vnguentum Apoſtolorum D. Auicenna.

℞. Terebinthinæ Ceræ albæ Reſinæ
Hammoniæ ana ℥ xiiij.

Ariſto-

Aristolochiæ longæ Thuris masculi
 Bdellij ana ʒ vj.
 Myrrhæ Galbani ana ʒ iiii
 Opopanacis Floris aris ana ʒ i
 Lithargyrij ʒ ix.
 Olei, si fuerit æstas ʒ ij.
 In hieme autem ʒ iij.

Aceti quantum satis est ad Hammoniacum
 Galbanum, & Opopanacum dissoluenda.
 Confice secundum artem.

*FLOS Æris propriè significat grana qua-
 dam parua, quæ à partibus aris prosiliunt cum
 refrigerantur affusa aqua partes aris: hoc ta-
 men loco solet poni viride aris.*

Est efficax cōtra vulnera & vlcera diffici-
 lia & fistulas: cōsumit carnē mortuā, & cōsum-
 ptam restaurat, duram mollit, & plagas sanat.

Vnguentum Aregon D. Nicolai.

℞. Rosmarini Maioranæ
 Radicis Iari Serpylli Rutæ
 Rad. Cucumeris asinini ana ʒ iij. ʒ.
 Foliorum Lauri Saluiæ
 Sabinæ ana ʒ iij.
 Pulicariæ maioris
 Pulicariæ minoris ana ʒ iij.

Radi.

VNGVENTA.

335

Radicum Bryoniae ℥ iiij.

Laureolæ ℥ iiij. β.

Nepetæ ℥ iiij.

Mastiches

Olibani ana ℥ j. β.

Pyrethri

Euphorbij ana ℥ j.

Zingiberis

Piperis ana ℥ iiij. β.

Adipis vrsini

Olei Laurini ana ℥ iiij.

Olei moschellini ℥ β. Petrolei clari ℥ j.

Butyri ℥ iiij. Olei communis ℥ v.

Herbæ & radices Malo mense collectæ, in oleo macerentur diebus septem, deinde coquantur additis circa cocturæ medium siccis reliquis: tum colentur.

Colato oleo adice reliqua, &

Ceræ ℥ j. ℥ iiij.

O L E V M debet esse purum & vetus. Porro auctores nō ponunt certā mensurā olei: quidam iubent accipi ℥ v. vel quantum sufficit. Sed tantum h̄ rbarum & radicū pondus & quantitas, nō potest bullire in ℥ v. olei: ideo accipe olei ℥ medicales sex, & affunde aqua etiam aliquot libras, & coque ad consumptionem aqua, & cola.

I A R V S

IARVIS est vera *Serpentaria*, pro qua ponitur *Aren* recenter effossam.

PYLICARIA, id est, *Conyza*, Germanicè vocatur *Duruvuriz*, & est similis *Enula Campana* in foliis, caulibus & floribus; sed multo minor: nascitur humidis locis & exiccatis aquis circa stagna.

LAVREOLA, est planta similis *Thymelea*, id est, planta in qua nascitur *Coccum gnidiu*, eius loco sume radices vel folia *Cocci gnidij*.

OLEVM *Moschellinũ* suo loco descriptũ est.

P. C. SCHOL.

A Et affunde aquæ.] *Cacutit Cordus* in aqua unguentum coquens, cum in vino coquendum esse ratio dicitur.

Ceterum cum unguentum istud in ponderibus mirè corruptum undique legatur, nos id ipsum, quantum nunc licuit, restituimus.

PRODEST malis corporis frigidis, convulsionibus, resolutionibus partium. Item doiori colico, renum, articulorumque.

A *Unguentum Martiatum D. Nicolai.*

R. *Ceræ albæ* ℞ ij.

Olei ℞ viij. [aut quantum sufficit.]

Rosmarini

Folio

Foliorum Lauri ana ℥ viij.
 Rutæ ℥ vij.
 Tamarisci [*foliorum scilicet*] ℥ vi.
 Maioranæ Sabinæ Balsamitæ Saluæ
 Ocymī Polij [*videlicet veri*]
 Calaminthæ Artemisiæ Enulæ
 Betonica Brancæ vrsinæ Spargulæ
 Herbae venti Pimpinellæ Agrimonix
 Absinthij Herbae paralyfis
 Herbae sanctæ Mariæ Cimarum Sambuci
 Herbae crassulæ Millefolij
 Semperuiuæ Chamædryos Centaureæ
 Centumneruæ Fragulæ Tetrabit
 Quinquefolij ana ℥ iiij. β.
 Radicum Hibisci [*id est, Altheæ.*]
 Cymini Myrthæ ana ℥ iiij.
 Cœni-græci ℥ j. β. Butyri ℥ j. ℥ ij.
 Vrticæ Violarum Papaueris nigri
 Mentha Saracenicæ Mentha crispæ
 Lappathioli Polytrichi Carduncelli
 Matris siluæ Maturellæ Herbae moschatae
 Leluija Lingua ceruinæ Crispulæ
 Camphoratae Styracis calamitæ
 Iedullæ ceruinæ ana ℥ β.
 Adipis vrsini Adipis gallinacei
 Mastiches Thuris ana ℥ i.
 Y Olei

Olei nardini ℥ ij.

Herbæ omnes in Maio mense colligantur & incisæ macerentur in vino odorifero per die septem, octavo deinde die coquantur, donec ferè consumatur vinum: postea cola, & colaturæ expressæ adde oleum, & coque dequo donec consumatur vinum, mox adde ceram & reliqua secundum artem.

In hoc unguente multa sunt herbarum nomina quæ apud probatos Auctores nusquã inveniuntur, ideoq; aliquis non facillè eas interpretabitur.

NICOLAUS Pratositus loco Maioranæ habet Esbrium, alij autem habent utrumque. Sed non constat quid sit Esbrium: alij enim dicunt Maioranam esse, alij Saluiam: sed utrumque ingreditur hoc unguentum tam Maioranam quam Salvia.

BALSAMITA, id est, Mentha aquatica.

BRANCA ursina vera, quæ Romana cognominatur, accipi debet, quæ habet radices longas multas, glutinosas, sapore Tragacanthæ. E alio nomine vocatur Acanthus: quæ verò Germanice vocatur Bernclauv, & habet Anethi umbellam & semina odore & sapore cymicum nihil minus est quàm Branca ursina: nam semper illam Romanam brancam ursinam intelligunt.

gant auctores omnes. est autem urbana & hortensis herba Branca vrsina vera.

SPARGULA, id est, Gallion, Germanicè B vocatur Ranrizen & Sprengelblum, herba est denso, numerofo, conferto & odorato flore.

PIMPINELLA, quam Auctor intelligit, C est Sanguisorba, qua Germanicè Blutdrofflein vocatur.

HERBA Paralysis, id est, Himelschuffel.

HERBA sancta Maria, secundum interpre- D tationem omnium, est Persicaria.

HERBA Crassula pinguis habet folia: nascitur in muris & in tectis: Germanicè vocatur Fettehexne, sine Donner kraut.

CENTVMNERVIA. i Plantago maior.

TETRAHIT, id est, herba Indaica, quam dicunt esse Orobum.

LYMINARIS maioris, auctor Ioannes Iacobus Manlius, pro Cymino & Myrtha habet Cimarum Myrthi. Sed nescio quam bene non tamen improbo. Porro Nicolai Alexandrini impressum exemplar habet Cymini & Myrtha: sed Nicolaus Prapositus pro Myrtha habet Myrrham: sed male.

LAPATHIOLVM, id est, Acetosa.

POLYTRICHON, herba est ex speciebus Capilli Veneris.

E MENTHA Saracenica, Germanicè vocatur, Vnser frau ven mintze. Herba habet folia oblonga, Lapathio minora, ut in summis caulibus aureos flores in corymbis dispositos ferè ut Tanacetum, tota odoratissima est.

CARDVNCELLVS, id est, herba Turcha, quā nos in Germania vocamus, Carduum benedictum.

C MATRISSILVA, est Periclymenū, Germanicè vocatur Speklilien: ascendit arbores ut Vitis, flores habet longos, reflexos & odore Lilij. Nuremberga in hortis colunt, cū alibi proueniat spontè in siluis.

MATVRELLA, id est, Phu, id est, Valeriana maior. Impressi codices Nicolai Alexandrini non habent Maturellam, sed Marathrū, id est, Fœniculum: sed malè.

ALLELVIA, id est, Trifolium acetosum: Germanicè Buchampfer vocatur.

CRISPULA, quæ sit herba, non constat recentioribus: alij enim Buphthalmū, alij herbam Cancris sic vocant, nec indicant figuram herbae Cancris: ego autem poncrem eius loco Buphthalmum, id est, Cotulam maiorem, non fœtulam.

HERBA MOSCHATA duas habet species: una habet veluti acus longas, & est restrū Ciconia:

nia: altera est parua, & non habet acus; sed est herba admodū parua, folia habet similia concava radici, id est, Holvvurtz, odorem habet in Maio mēse Musci: nascitur umbrosis locis iuxta concavam radicem i. Holvvurtz, in Maio tantū reperitur: Germanicè vocatur Bisemkraut.

CAMPHORATA est Abrotonum, quia odore accedit ad Camphoram: quidā dicunt esse Abrotonum silvestre siue albū, sed perinde est: efficacius tamen est vulgare Abrotonum.

Nicolaus Alexandrinus paulò aliter describit hoc unguentū, ut codices impressi ostendunt, ideoq; & eius modū subiungemus: nam variatur ponderum ordo & quantitas.

ADVERSUS frigida corporis mala, resolutionem coxendicum, nephritim, convulsionem, & id genus alia valet: tumores reprimat, durities emoliat, liuoremque cutis emendat.

Vnguentum Martiatum magnum D.

Nicolai Alexandrini.

℞. Cerae albæ ℥ ix. Olei sextarios vj.

Fet. verò Cond. Cera ℥ xij. Olei sextar. lxvi.

Rosmarini Foliorum Lauri ana ℥ ij. β.

Amaraci ℥ ij.

Esbrij Sabinæ Balsamitæ Ocymi

Y 3

Elcli-

Elelisphaci [*id est, Salvia.*]

Polij [*scilicet veri.*]

Calaminthes Arthemisiæ Enulæ

Betonicæ Brancæ vrsinæ Herbæ vëti

Pimpinellæ Argemoniæ Absinthij

Herbæ paralyfis Herbæ sanctæ Mariæ

Cimarum Sambuci Herbæ crassulæ

Semperuiuæ Millefolij Chamædryos

Centaureæ Centineruię Fragulæ

Quinquefolij Herbæ Tetrahit ana ꝑ j. β.

Radicis Euisci Cymini

F Myrthæ ana ꝑ j.

Fenigræci ꝑ β. Butyri ꝑ v.

Vrticæ Violarum Papaueris rubri

Menthæ Saracenicæ

Menthæ alterius [*id est, Mētha crispasatina*]

Lapathioli Polytrichi Carduncelli

Marris siluæ Marathri Herbæ moschatae

Alleluia Linguae ceruinæ Crispulæ

Camphoratae Styracis Medullæ ceruinæ

Adipis vrsini Adipis gallinacei ana ꝑ iij.

Thuris ꝑ ij. Oleinardini ꝑ j.

Confice hoc modo: Herbas omnes atque radices in fine Maij mensis vel circa Solstitium æstiuū collectas, minutim incisas in vini sufficienti quantitate macerato per dies septem:

octaua

octava deinde die coquantur lento igne, donec propemodum vinū sit cōsumptum: postea cola & exprime, & affunde colaturæ expressæ olei prædictos sextarios, & iterum coque, donec omnis aqueus herbarum succus cum vino in vaporem resolutus fuerit: deinde adde Ceram in partes contractā, & paulo post Adipes. Butyrum atque oleum Nardinū; ad ultimum verò Styracem, atque Thus in minutissimum pulverem trita: melius tamen esset, optimam & electam Styracem, & puram instar resinæ alicuius, vnā cum Cera iungere: nam liquescit in oleo. Sed talis Styrax calamita rarissimè ad nos affertur. Porro miror in hoc vnguento, quod tam parum olei tot herbarum libris addatur: præterea etiam optimæ vires aromaticarum herbarum in coctura evanescent.

Ita se habet vnguenti huius compositio secundū impressum Nicolai Alexandrini exemplar.

SEXTARIUS mensura est Romana, quæ capit mensurales uncias viginti olei: pōdere verò habet olei uncias sedecim, drachmas quinque, scrupulum unum. Sex autem sextarij olei, faciunt in hoc vnguento ℞ viij. ℥ iiij.

ESBRIUM quidā dicant esse Maioranam, quidā flores Salvia: ego autē acciperem pro Esbri-
Y 4 brio

brio Maiorana capitula, summitates & flores.

A M A R A C V M, ego hic non credo significare Matricariam, cum per eam vocē etiam Maioranam possimus intelligere, nam utraq. amaracus vocatur: si autem Maioranam inieceris, multo odoratius unguentum fiet, quam si Matricariam indideris.

HERBA venti, id est, parietaria vera.

P I M P I N E L L A, hic non significat Germanicam Pimpinellam acri radice, quam Itali vocant Saxifragiam; sed eam quam Itali vocant Sanguisorbam, Germani Blutsstropffley. Radicem habet rubram, Tormentilla sapore, nascitur in pratis una eius species, altera in montibus, & Itali acetariis miscent, habetque cucumeris odorem.

Q V I D A M non habet Cyminum, sed Cimas Myrtha: est autem Myrtha idem quod Myrtus. Alij habent Myrrham, sed male.

P R O Papauere rubeo habent alij Papauer nigrum: est autem rubrum Papauer idem quod agreste Papauer in agris nascens.

M A R A T H R Y M, id est, Fœniculum. Porro ego hunc locum Nicolai Alexandrini credo esse corruptum, & censeo pro Marathro legendum esse Matarellam, id est, Phu maius, cuius radices accipi debent.

Lingua

Lingua cervina est herba quæ hodie improprie *Scolopendria* nominatur.

P. C. in utrumque vng. Martiatum Schol. Vng. Martiatum.] Fuchsius rectè monet, non A Martianum, sed Martiatum nominandum esse.

Spargula, id est, Gallion.] Spargulam non B Gallion, ut Cordus ait, sed Apparinen esse veterum, Fuchsius ritè sentit.

Pimpinella.] Fuchsius per hanc vocem, non C Sanguisorbam Germanis vocatam, cum Cordus hic intelligendam esse vult; sed acrem herbam Saxifragam à multis appellatam, Germanis Pimpinella nomine cognitam: id quod ea propter, quod adstrictoria sua facultate, huic medicamento Sanguisorbam malè conuenire existimet: quasi verò nihil unguentum hoc præterea recipiat quod adstringat atque etiam refrigeret. Itaque cum Italia multo prius (immò forsàn ea fabricatum) quàm Germania unguentum istud cognitum fuerit, Pimpinellam Italorum seu Sanguisorbam Germanorum hic intelligendam esse contendo.

Herba sanctæ Mariæ.] Hanc Persicariam D esse, sinistrè Cordus interpretatur, ut & Fuchsius quoque inquit: sed eam esse quam Saluiam Romanam, & Mentham Græcam, seu Costum

hortensem ac Lassulatam. Etruscis vocari constat, *Vnser frau vven mintz* Germanis dictam à *Mextha* Saracenica diuersam. Qua in re falsum nihilominus *Fuchsius* existimo, *Mentha* hanc *Gratam* cum *Saracenica* confundentem eandemque facientem, cum diuersa sint: ni Germanis aliquibus ita eam appellare placuerit. Italis tamen secus; qui hac in re, ob eas quas superius dixi rationes, hic quoque consulendi atque credendi sunt.

E *Mentha Sarac.*] Hanc *Mextham* Saracenica, vocatam quoque *Mentham* Romanam, in suis de *Stirpium* libris, imagine & scripto depingit doctiss. *Rembertus Dodonaeus*: qua hoc loco intelligenda erit: quicquid *Fuchsius* ex suo corruptissimo in medium proferat.

F *Myrrhæ.*] *Fuchsius* *Myrrhæ* legi manu nescio quàm bene: cum unguentum *Martiatur* paruum *Nicol. Alexandrini*, *Myrti* folia manifestè recipiat. Cur autem *Myrtum* aliàquā adstringentia admittat hoc unguentum, hic dicere non vacat. Tantummodo miror id à tanto viro non esse olfactum, neque perpensum.

Ceterum hocce in unguento, ut & multi aliis in medicamentis, plura longè aliter exponenda, miscenda, tractanda, atque consicienda sunt.

unt, quàm à Eufasio & Francisco Alex. est fa-
titatum: ita ut huius Apollo non usque aded,
veluti Thraſonice promittit, nebulosis suis ra-
diis Pharmacopæos vibret, neque irradiet; quin
in densa adhuc caligine aequè ut prius versentur
utque deambulent. Quod tamen illi condonan-
dum foret: eo quòd adolescentem se fateatur, nisi
iſa illius ætatis inuenilis iudicio vacua, & hinc
emeraria rei Pharmaceutices sibi inexperta, ac
(ut locis mille liquet) ignorata ſcriptione, Apo-
line abusus, illiq; iniurius, tantum diuimplus
quo contaminasset. Sed hac, quoniam vespè-
ascit, citis, si voles, quadrigis.

Ad frigiditatem & dolorem capitis, pecto-
ris & stomachi, ad scirrhus hepatis & splenis,
c ilij dolorem; ad paralyticos, arthriticos,
ſchiadicos, nephriticos, & podagricos, & ad
omnes dolores, ad tumores, durities, spasmos
& febrientes, ad ignem vel ſolem inunctum.

Vnguentum Martiatum paruum

D. Nicolai Alexandrini.

℞. Foliorum Lauri	℞	ij.
Rutæ	℞	ij. β.
Amaraci [id est, Maiorana.]	℞	ij.
Rosmarini	℞	j. β.

Folio.

Foliorum Myrthæ ℞ j.

Esbrij [*accipe summitates Maiorana pro E*
Balsamitæ (br.)

Ocymi ana ℥ vj.

Butyri ℥ v.

Styracis Medullæ ceruinæ Adipis vrsi

* Adipis Gallinacei ana ℥ iiij.

Mastiches ℥ iiij. Thuris ℥ ij.

* Olei nardini ℥ j.

* Olei oliuæ q. s.

Ceræ mundissimæ quantum sufficit.

Ego Olei acciperem ℞ vj.

Cera verò ℞ iiij.

Pet. verò Coud. olei ℞ xxiiij. sumēdas esse dicis

Porro hoc quoque vnguentum conficies v
proximum.

MYRTHA, id est, Myrtus: sunt autem ac-
cipienda folia vera Myrti, quæ ex Italia affe-
runtur, & non eius planta quam vocamus Ger-
manicè Heydelber.

P. C. SCHOL.

Petrus verò Coud. olei, &c.] Si omnia hu-
iusce Dispensatorij loca manca erigenda, dubio-
sa expendenda, erronea collapsaq; restituenda
mihi essent, simulq; singulorum rationes scriptis
reddere deberem, in densum volumen præter in-
stitu-

titutum, libellus omnimodè extumesceret. Hic
attamen (priusquam sese negotium subducatur,
ad calcem enim ferè perductus sum) pedem fi-
ere, aliquidq; serij propalare, tempus & locus
opportunos summopere urgere videntur: ut pu-
a, si quid salis Francisco Alex. inesset, atque vel
minimū haberet rerum medicamentariarum
pharmaceuticarumue peritia, experientiaq; (ut
minibus numeris absolutū opus se promulgasse
irroganter sibi persuadet) non ita leuiter osci-
anterq; aliorum errores incogitantiasq; etiam
evidentissimas trās scriberet, & alioquin pagel-
as multa, tadiofa, atque inani dicacitate reple-
ret, conspurcaretq;. Consulat ille, quāso, vulga-
es tantū uniuersalesq; componendorum mis-
cendorumq; medicamentorum normas, tum à
eipso etiam conscriptas formulas, vel si volet,
etiam minimos pharmacopolas hac in re exami-
net: herbarum materialiumue libra, num olei
inas ad mīntis requirat. Carnis libris duabus
aque libram coctura sufficere si dixeris, à coci-
uero nōne etiam rideberis? Itaque cū Cor-
lus hac in vnguento suo ex censu, olei hic libras
ex tantū, ad herbarū materialiumue libras
lures duodecim (qua quantitate vix madesce-
ant) accipiendas suasisset, ut adhucdum eius

in

in contextu sonant verba, ego verò multas
dens olei libras, ex sex viginti quatuor effeci,
necdum sufficere pro tanta materia copia scio
oleo, ut regula & ratio decent, materia si
contegenda. Simili insuper cecitate, ut in
unguento omnes dispensatoriorum combinata
vsi sunt, in unguento Martiatomagno. Vbi ex
Nicolai Alex aliorumque exemplaria, olei sex
ria sex admodum macre legunt; ego sexaginta
sex multo pinguius, necessario reposui; ratione
errorumque causas hic prateriens. Bone Deus,
tantosque Aristarchos mirum est tanta labora
coryza, ut tantum intervallum, nempe à sex
sexaginta sex, à sex insuper ad viginti quatuor
non olficerint, adeoque evidentes res animadu
tisse neminem. Hinc ut quantum in reliquis
glectum fuerat, colligere facile queas: quod a
rischi prater omnium scio expectationem, ita fr
quentes, locorum non omnium, sed precipuoru
tatum, in hocce tam exiguo enchiridio anima
nerforam indicatiui demonstrare possunt. Qu
circa ut ingenuè quid sentiam tandem prof
ram, rei que summam semel explicem; tot int
hodie dispensatoriorum divulgatores, nullum pa
digni quid Pharmacopœis consarcinasse prota
lisseque video, nihilque ferè prater aliorum ignavia
tran

transcripsisse, ac in suas chartas transfudisse,
 ita egisse errata & ineptias, erratis atque in-
 otis accumulasse comperio: ita ut posteriora
 prioribus etiam nonnunquam deteriora Phar-
 macopœisq; inutiliora esse conspiciantur. Eius-
 modi igitur omphacini rabulismi valeant. Sed
 edem retrahere, receptuq; canere tempestivè,
 citius est: priusquam malè audiens, vilis inep-
 tusq; apothecarius, sordidusq; immò olidus un-
 uentarius, a medico quopiam dispensatorij cor-
 asore appeller, nulla ratione cum seplasiario
 onferendo; à quo corripì reprehendive posse,
 auitas vetitat, piaculumq; putatur. Silere ita-
 ue volo, ne in Lacca labyrinthum aliquem in-
 antus incidens, illudere quempiam existimet.
 Verùm gallus in suo sterquilinio audet.

Ceterùm hic obiter etiā referre volo, vnguen-
 ū Aregon olei quoq. magna tabescere panuria.

A p podagram frigidam siue calidam, pa-
 alyricos, arthriticos, nephriticos, ischiadicos,
 c ad omnia vitia & dolores nervorum valet.

Vnguentum album.

℞. Cerussæ in aqua rosarum lotæ	℥	xviiij.
Lithargyrij albi loti	℥	j. β.
Olei Rosati	℞	ij. ℥
		iiij.

Ceræ

Ceræ albiſſimæ ℥ vi. aut circiter.

Confice ſecundum artem.

Quidam alia ratione cōponunt hoc vnguentum: nam alij addunt albumina Ovi, alij non addunt Lithargyrium, alij non Ceram, ſed Tragacanthum admiſcent.

POLLET aduerſus vlcera, ſcabiem & aduſtionem.

Vnguentum Dialthea ſimplex D. Nicolai.

℞. Radicum Altheæ ꝑ ij.

Seminis Lini

Seminis Fœnigræci ana ꝑ j.

Olei ꝑ iiij. Ceræ ꝑ j.

Terebinthinæ ℥ ij. Reſinæ ℥ v

Radices & ſemina contuſa macerentur tribus diebus in aquæ ꝑ viij. aut quantum ſufficit: quarta die coquantur, donec remittantur craſſam & viſcoſam mucilaginem: eam deinde expreme mox.

℞. Expreſſæ mucilaginis ꝑ ij. & coque cum oleo: cū deinde aquoſum illud in mucilagine conſumptum fuerit, ceram addito, & fac ſecundum artem.

EMOLLIENDI vim habet, calefacit, & humectat.

Vnguentum

Vnguentum Dialthea compositū D. Nicolai.

℞. Radicis Altheæ ℥ ij.

Seminis Lini

Seminis Fœnigræci ana ℥ j.

Scyllæ recentis ℥ vj.

Olei ℥ iij.

Cerae ℥ j.

Terebinthinæ

Gummi Hederæ

Galbani

ana ℥ ij.

Colophonix

Resinæ ana ℥ vj.

Radices & semina cōtusa macerētur tribus
 diebus in ℥ viij. aut sufficienti quāritate aquæ:
 leinde coquantur donec crassescat mucilago.
 Postea

℞. Mucilaginis expressæ ℥ ij. & adde reliqua,
 ac fiat secundum artem vnguentum.

V A L E T propriè ad dolorem pectoris ex
 frigidityte & pleuresi, & super pectus inun-
 ctum sanat omnia loca, infrigidata calefacit,
 molliciat & humectat.

Vnguentum Ægyptiacum D. Mesue.

℞. Æruginis ℥ v. Mellis optimi ℥ xiiij.

Aceti fortis ℥ vij.

Coquātur omnia simul, donec fiat vnguen-
 tum spissum, & colore purpureum.

A E R V G O, est viride aris.

Z

C O N.

CONFERT ad vulnera antiqua, fistulas-
que extergit: carnis excreſcentiæ medetur, ve-
hementerque exiccat.

Vnguentum aureum D. Meſua.

℞. Cera citrinæ ℥ vj. Olei boni ℥ ij. β.
Terebinthinæ ℥ ij.
Resinæ Colophonix ana ℥ j. β.
Thuris Mastiches ana ℥ j. Croci ℥ j.
Confice ſecundum artem.

* VULNERA certò & ſalubriter glutinat.

Vnguentum Citrinum D. Nicolai.

* ℞. Boracis ℥ ij. Camphoræ ℥ j.
Corallij albi ℥ iiij.
* Amenti dulcis ℥ j.
Umbilici marini Tragacanthæ albiſſimæ
* Amyli ana ℥ iiij.
Cryſtalli Entalij
Dentalij Thuris albiſſimi
* Nitri * Marmoris albi ana ℥ ij.
Gera ſerpentinæ ℥ j. Ceruſſæ ℥ vj.
Axungia porcina recentis, non ſalita, ſed præ-
parata & mundata ℥ j. β.
Seri caprini præparati ℥ j. β.
* Adipis gallinacei præparati ℥ j.

Confice ſic: Axungiam porcinaſque
adipem

adipem gallinaceum in vitreato vase liqua si-
mul, & impone tepidis adhuc, corticum Citrei
mali satis magnam quantitatem, & maccen-
tur per mensem vnum. Postea eximito corti-
ces, & eliquatis adipibus, vt dictum est: adde
seuum caprinum: deinde addantur reliqua
tenuissimè trita: vltimò verò insperge Cam-
phoram subtilissimè tritam.

*Notandum est in hoc unguento non concor-
dare exemplaria in ponderum characteribus.
Nam quidam pro ℥, ponunt 3, & econtrà.*

BORAX est nitri species, qua aurum fer-
ruminant Aurifabri.

AMENTVM dulce, est Gypsum quod in ca-
pillatas venas scinditur.

YMBILICI marini, lapilli sunt inuenti
in littore maris, figura Fabarum magnarum:
Germanicè vocantur Merbonen.

ENTALIVM testaceum quiddam est ma-
inum, Fistula modo longum & concavum, fo-
is strictum, longitudine digiti parui.

DENTALIVM conchula marina est par-
va, dentatam rimam habens.

NITRVM est Salpetra.

GERSA Serpentaria, est radix Serpentaria
vera preparata, vt infra ostendemus.

A Amentum dulce.] *Amiantum veterum est. id, permale verterunt Fuch. & Francis. Alex. longè enim alia res est. Barbara vocabula, doctus licet veterum vocibus quandoq. sint conformia non ea propter semper re ipsa eadè sunt, ne esse debent, idemq. significare. Qua in re docto etiam viros interdum hallucinatos videmus.*

FACIEI maculas emendat, scabiem in quacumque corporis parte exterit, cicatrice extenuat, ruborem oculorum aufert, & ea quæ aspera sunt, læuigat.

Vnguentum Populeum D. Nicolai.

℞. Oculorū Populi arboris recentium ℞ j. β.
 * Axungia porcina præparata ℞ iij.

Oculi Populi contundantur, & macerentur in Axungia, donec sequentes herbæ colligant æstate.

℞. Foliorum Papaueris agrestis

Foliorum Mandragoræ

Cimarum rubi tenerimarum

Foliorum Hyoscyami

Solani Vermicularis Lactucæ

Semperuiuæ maioris Bardanæ Violaria

Scatuncelli ana ℥ iij.

Herba

Herbæ contundantur & misceantur oculis Populi & Axungię, & diuittantur per dies decem: deinde coquantur supra lentum ignē cum vini odorati sufficienti quantitate, donec vinum cōsumatur: postea colentur & exprimantur, & expressum vnguentum reponatur.

MANDRAGORAE folia ubique haberi non possunt, ideò duplex pondus foliorum Hyoscyami sumendum est.

VERMICULARIS vera, est Semperuiua minor, linguam non mordicans.

BARDANA. i. Lappa maior, cuius radicem precipit esse accipiendā Nicolaus Alexādrinus.

SCATVNCELLVM, re vera est Umbilicus Veneris seu Cymbalaris, & non Krentzkrant. Folia habet pingua cōcaua ut Cymbalū, radicem Aro similem: perquā pauci eam cognoscunt.

CONTRA nimium calorē valet, & temporibus illitum, somnum conciliat.

Vnguentum Fuscum D. Nicolai.

Rx. Olei	℞ j. β.	Ceræ nouæ	℥ iiij.
Colophoniæ		Picis naualis	
Sagapeni	ana ℥ ij.		
Mastiches	Galbani	Thuris	
Terebinthinæ	ana ℥ j.		
	℥ 3	Confice	

Confice secundum artem vnguentum.
S A N A N D I vim habet & extrahendi.

Vnguentum Diapompholygos D. Nicolai Alexandrini.

R. Olei rosacei

Ceræ albæ ana ℥ vj.

Succi fructus vuar lupinæ quantum sufficit.

Cerussæ ℥ ij. Plumbi vsti & loti

Pompholygis Thuris puri ana ℥ j

Confice secundum artem.

DIAPOMPHOLYGOS, id est, de Nihil albo. Nam Pompholyx est Nihili album, id est, Galmes flux.

V V A Lupina, id est, Solanum siue Solatrum.

Ad exiccanda erysipelata, vulnera sordida, & ad sananda tibiarum vlcera, aliorumque locorum concaua vel dissipata, replet, refrigerat & cicatrizat.

Vnguentum Comitissæ D. Gulielmi de Varignana.

R. Corticum medianorum castaneorum

Corticum medianorum glandium

Corticis mediani quercus arboris

Myrtillorum Caudæ equinæ Gallarum

Corticum Fabarum Acinorum Vuarum

Sor.

Sorborum immaturorum siccorum

Mespilorum immaturorum siccatorum

Foliorum Pruni siluestris

Radicum Chelidoniae ana ℥ j. β.

Contundantur aliquantulum, & coquantur in aquæ Plantaginis ℥ viij. aut quantum sufficit, donec media pars consumpta fuerit: deinde in colatura lauentur sequentia, nouem vicibus semper recentem aquam decoctionis affundendo quotiescumque laueris.

℞. Cerae nouæ ℥ viij. β.

Olei Myrtillorum

Olei Mastichini ana ℥ j. β.

Postea insperge sequentium rerum tenuissimum puluerem.

℞. Corticis mediani castanearum

Corticis mediani glandium

Corticis mediani quercus arboris

Gallarum ana ℥ j.

Cineris ossium cruris bubuli

Myrtillorum Acinorum vuarum

Sorborum siccorum ana ℥ β.

Trochiscorum de Charabe ℥ ij.

Confice secundum artem vnguentum.

ACINI hic significant lignea semina que sunt in vnis.

SORBA sunt fructus similes Mespylis: Germanicè vocantur Sporling, Sporbirn, Sporepsel & Drecksecke.

PRVNVS silvestris, id est, Schlehendorn.

INCEPTVM abortum prohibet, hæmorrhoidas sistit, ac laxatos renes conciliat.

Vnguentum de Arthanita manus D. Mesua.

R. Succi Arthanitæ ℞ iij.

Succi Cucumeris asinini ℞ j.

Olei Irini ℞ ij. Butyri vaccini ℞ j.

Pulpæ Colocynthidos ℥ iij.

Polypodij ℥ vj. Euphorbij ℥ β.

Arida omnia contundantur & macerentur in succis per dies octo: affuso etiã oleo in vase vitreo diligenter obturato: nona deinde die coquantur lento igne aliquãdiu, postea colentur. Colaturæ adde

Sagapeni in aceto dissoluti aureos v.

Myrrhæ aureos ij.

Coquantur iterum vsque ad consumptionem succorum: postea adde

Ceræ ℥ v. Resinæ taurini aureos v.

Feruantur simul donec liquecat cera, postea inspersione tenuissima puluerem.

R. Scammoneæ

Aloës

Mezerion

Colo-

Colocynthidos ana aureos v.

Euphorbij aureos ij.

Salis gemmæ aureos iiij.

Turbith aureos v.

Piperis longi Zingiberis

Chamomillæ ana aureos ij.

Confice secundum artem.

Omnia ferè exemplaria habent Colocynthidos ana aureos v. meus autem manu scriptus Mesua habet aureum j. quod magis probo: sed textum nolui immutare.

ARTHANITA est Cyclamenus; siue Cyclaminus: quidam malè vocant Panè porcinum. Si radices eius non adsunt recentes, tunc accipe radices eius siccatas circiter l vj. contendantur & coquantur in aqua, & eliciatur succus, ut ex Glycyrrhiza fit.

ILLITVM stomacho, vomitu purgat: hypogastrio autem inunctum, aluum deiecit, ob id hydropicos mirè iuuat: seorsum excrementum largè vacuando, vermes quoque necat, & educit: adhibetur non potentibus fumere medicamentum purgans.

Vnguentum de Arthanita minus D. Mesua.

Rx. Succī Arthanitæ

Z 5

Visco-

Viscositatis quæ exprimitur è radice filicis.

Succi Cathengit ana ℥ ix.

Succi extremitatum Tamarisci ℥ ij.

Oesyti [*id est, Hyssopi humida.*] ℥

Olei Irini ℞ ij.

Bdellij Hammoniacy ana ℥ j. ℞.

Aceti quantum satis est ad Hammoniacum dissoluendum.

Ceræ Citrinæ ℥ vi.

* Corticum radicum Capparis ℥ j. ℞.

Spicæ ℥ iij.

Confice secundum artem vnguentum.

FILIX non significat Polypodium, sed eam herbam quæ Germanicè vocatur Vvaltfaren. & Creutzfaren.

CATHENGIT, significat Ebulum: est autem hoc vocabulū valde corruptum in plurimis exemplaribus.

OESYTVS, id est, Hyssopus humida, & est pinguedo lazarum succidarum.

SPLENIS tumores etiam scirrhosos dissolvit, & strumas.

Vnguentum Potabile.

℞. Butyri recentis sine sale ℞ iij.

Rubæ tinctorum Castorei Spermatidis Ceti
Tor-

Tormentillæ ana ℥ j.

Bulliāt simul in vino odorifero ad vini consumptionē, ac fiat vnguentū secundū artem.

DATVR ad consolidandum casum ex alto.

Vnguentum Rosatum D. Mesua.

℞. Axungiaē porcine recentis quantitatē quam volueris, & lauetur in aqua calida nonies, & tantundem cum aqua frigida lotionē vltima: deinde teratur cum ea Rosarum rubeorum recentium æquum pondus, & dimittantur marcescere per dies septem: postea coquantur cum facilitate ac percolentur, & rursus tantundem rosarum rubeorum teratur cum ea, & dimittatur per alios dies septem marcescere, atque adfundatur succi rosarū pars dimidia, olei Amygdalini pars sexta, & rursus concoquantur cum facilitate dum succi euanescent. Quod si parum Opii in aqua Rosarum colliquatum inter decoquendum iniicitur, fit efficacius.

PHLEGMONAS, erysipelata, herpetas sedat: Cephalalgiam calidam & ventriculi ac hepatis intemperiem calidam mitigat.

Vnguentum Pectorale.

℞. Mucilaginis seminis Psyllij

Traga-

Tragacanthæ Gummi arabici Seminis Lin
 * Fœnigræci ana ℥ j.
 Adipis gallinæ Medullæ vituli
 Butyri recentis loti cum aqua violarum an
 ℥ j. β.
 Olei Violati

Olei Amygdalorum dulcium ana ℥ j.
 Cera albæ quantum sufficit: fiat vnguentum.

Mitigat dolores pectoris & tussim, digerit
 maturat, faciliat sputū, & resoluit pleuresin

Vnguentum Album Caphuratum.

R. Olei Rosati ℥ j. Cera albæ ℥ iij.
 * Cerussæ ℥ vj.
 * Albi ouorum num. iij.
 Caphurę dissolutę cū aqua rosarū ex arte ℥ ij.
 Fiat vnguentum secundum artem.

Vnguentum Rubrum Caphuratum.

R. Olei rosati ℥ j. β.
 Lithargyrii ℥ ij.
 Minij ℥ iij. Cerussæ ℥ j. β.
 Thutiæ
 Caphuræ ana ℥ iij.
 Cera ℥ ij. in æstate. Sed in hieme ℥ j.
 Fiat vnguentum in pila plumbea cum pi-
 stillo plumbeo.

CERO-

C E R O T A.

365

Cerotum Infrigidans Galeni ex Mesue.

℞. Cerae albæ ℥ j. *

Olei rosati omphacini ℥ iiij. *

Cōquassentur simul cū modico albi & clari acetī. Oleum verò Omphacinū antequā rosas recipiat, sæpius est lauandum cū aqua fontis gelidissima: deinde confice secundum artem.

R E F R I G E R A T febres ardētes, calorem hepatis, & sedat dolores capitis, circum tempora, super hepar & spinam dorsi linitum.

Cerotum Santalinum D. Mesue.

℞. Rosarum ℥ xij.

Santali rubei ℥ x.

Santali albi Santali Citrini ana ℥ vj.

Boli armeniaci ℥ vij.

Spodij ℥ iiij. Camphoræ ℥ ij.

Cerae albæ ℥ xxx. Olei Rosati ℥ j.

Confice secundum artem.

O L E V M Rosatum debet fieri ex oleo acerbo, id est, ex immaturis oliuis expresso.

P H L E G M O N A S & intemperaturas omnes calidas ventriculi, hepatis, & partium aliarum potentissimè extinguit.

Cerotum

Cerotum Stomachale Galeni D. Mesua.

℞. Rosarum rubrarum ℥ xx.
 Foliorum Absinthij ℥ xv.
 Mastiches ℥ xx.
 Spicæ nardi Indicæ ℥ x.
 Cerae mundæ ℥ iij.
 Olei Rosacei ℞ j. ℞.

Cera & oleū aliquoties ex aqua Rosarū luentur, & excolata omni aqua rursus ad lenitum ignem resoluantur: deinde alia omnia in subtilissimum pulverem trita, inspergantur.

V E N T R I C U L U M & hepar roborat, horum dolorem à frigido lenit, appetentiam excitat, coctionem iuuat.

E M P L A S T R A.

Emplastrum Diachilon simplex D. Mesua.

℞. Mucilaginis Fœnigræci
 Mucilaginis seminis Lini
 Mucilaginis radicum Althææ ana ℞ j.
 Olei veteris clari ℞ iij.
 Lithargyri ℞ j. ℞.

Coquantur secundum artem, & fiat Emplastrum.

DIACHILON vocatur hoc Emplastrum,
 à succis

de succis viscosis siue mucilagibus: hodie corrupto nomine dicunt Diaquilon.

Mucilagine ista debet esse spissa & viscosa: deoq; oportet ut quantitas seminū & radicum sit satis magna, unde fieri debent mucilagine.

SCIRRHOs hepatis, lienis, ventriculi, & liiarum partium, ipsas etiam chœradas & durities reliquas emollit & iuuat.

Emplastrum de Mucilaginibus seu Diaquilon compositum.

℞. Mucilagine radicū Altheæ
Mucilagine seminis Lini
Mucilagine mediani corticis ulmi
Mucilagine Fœnigræci ana ℥ iiij.
Olei Chamæmelini Olei Liliorum
Olei Anethini ana ℥ j. ℞.
Hammoniæ Galbani Opopanacis
Sagapeni ana ℥ ℞. Cera nouæ ℥ xv. *
Croci ℥ ij. Terebinthinæ ℥ ij.

Gummi siue lachrymæ resoluatur in vino optimo, & conficiantur secundum artem.

Porro hic me licet oleorum & Terebinthinæ pondus augere.

VLMS arbor est quæ vocatur Germanicè Ylmen & Rustern. Cortex eius medius est similis

milis cortici Tilia. Gleich vñ ein bast: ex eo debet fieri mucilago.

CHAMÆMELVM, vulgò vocatur Camomilla.

MATVRAT apostemata, & mollit durities, partim resoluit, & partim digerit, abstergitque saniem ruptorum apostematum, & sanat phlegmones.

*Emplastrum Diachilon magnum Filij
Zachariae, ex Mesue.*

℞. Lithargyrij mundi tenuissimè triti, & per
cribrum excussi ℥ xij.

Olei Irini Olei Chamæmelini

Olei Anethini ana ℥ viij.

Mucilaginis seminis Lini

* Mucilag. rad. Altheæ

Mucilag. Fœnigræci

Mucilag. Ficuum pinguium

Mucilag. Passularum

Succi Ireos Succi Scyllæ Oesypi

* Glutinis Alzanahan ana ℥ xij. β.

* Terebinthinæ ℥ iiij.

Resinæ Pini

Ceræ citrinæ ana ℥ ij.

Conficiatur secundum artem Emplastrum.

S V E-

SUCCVS *Scylla*, est mucilago ex trita *Scylla* expressa.

OESYPVS, est pinguedo lanarum succidarum, cuius faciendi modum in ultimo tractatu indicabimus: vulgò vocatur in Pharmacopoliis *Hyssopus humidus*.

GLUTEN *Alzanahan* vel *Alchanach* siue *Alzanach*, est *Ichthyocolla*, id est, gluten, siue colla piscium: vulgò *Hausenblasen*.

Hoc Emplastrum debet habere consistentiam & spissitudinem Ceroti.

RESOLVIT & maturat omnes durities & inflammationes.

Emplastrum Diachilon paruum D. Mesue.

℞. Lithargyrij	℥	vi.
Olei veteris clari	℞	j.
Mucilag. Psyllij	℥	iiij.
Mucilag. Hyoscyami	℥	j. β.
Mucilag. seminis Lini		
Mucilag. radicum Maluæ	ana	℥ ij.

Conficiatur secundum artem Emplastrum Ceroti alicuius spissitudine.

TVMORES calidos digerit & maturat.

Emplastrum de Meliloto D. Mesue.

℞. Meliloti	℥	vi.	Florum Chamæmeli
			Æ
			Fœni-

Fœnigræci Baccarū Lauri Radicū Altheæ

Absinthij ana ℥ iij.

Seminis Apij * Cordumeni Ircos Cyperi

Spicæ nardi Indicæ Casia lignæ

* Ammios ana ℥ ij. β.

* Sampsuchi [*id est, Maiorana.*] ℥ iij.

Hammoniæci [*id est, Harmoniaci.*] ℥ x.

Styracis calamitæ Bdellij ana ℥ v.

Terebinthinæ ℥ j. β.

Ficuum pinguium num. xij.

* Seni caprini

Resinæ ana ℥ ij. β.

Ceræ ℥ vj. Olei sampsuchini

Olei Spicæ ana quantum sufficit.

Confice Emplastrum sic:

℞. De Meliloto prædicto ℥ v. ℥ ij.

Fœnigræci

Chamæmeli seorsum præter prædicta ana
℥ iiij.

Coquantur in ℞ iiij. aquæ aut quantum sufficit, donec remaneat ℞ j. deinde omnia arida cum reliquis sex drachmis Meliloti subtilissimè pulueriscentur. In decoctione autem colata secundum artem dissoluantur Hammoniæcum & Bdellium: dissolutis addantur Ficus per se minutissimè incisæ & contusæ, & optimè

mè misceantur. Postea ad ignem simul lique-
fiant Terebinthina, Seuum caprinum, Cera &
resina Pini, & addatur olei Spicæ Nardi, olei
Sampsuchi ana circiter \mathfrak{z} v. Cum deinde
omnia sunt mista, addantur pulueres triti, &
fiat secundum artem Emplastrum.

Porro potes etiam sequenti ratione confi-
cere \mathfrak{z} vj. ingredientis Meliloti, vnà cum reli-
quis aridis tundito, & iisdem permiscero: po-
stea & ad decoctionem priuatim Meliloti m.
iiij. & gummi, videlicet Hammoniacum at-
que Bdellium, in vino dissoluto: Olei verò
Sampsuchini atque olei Nardini accipere tum
oportet ana circiter \mathfrak{z} vij. aut \mathfrak{z} viij. & confice
secundum artem Emplastrum.

*O L E I Sampsuchini compositio supra tradi-
tur in tractatū de Oleis.*

*Per oleum Spica, Mesue intelligit oleum Spi-
cæ Nardi siue oleum Nardinum. Mesue enim
nusquam meminit Lauandula maioris: quæ ho-
die Spica vocatur, neque eius olei quod vocant
oleum Spica.*

E M O L L I T omnem duritiem quæ in ie-
cinore, liene & ventriculo existit. Dolorem
item vehementer sedat, hypochondriaque
tensa sanat.

- * *Emplastrum Triapharmacum Mesuæ, cui
sub vnguenti nomine describitur.*

R. Lithargyrij subtilissimè triti

Aceti vini ana ℞ j.

Olei veteris ℞ ij.

- * Fiat coctione secundū artem Emplastrum.
FACIT nasci carnem in vulneribus, &
consolidat ea.

Emplastrum Oxycroceum D. Nicolai.

R. Cerae Picis Colophonix

Croci ana ℥ xij. Terebinthinæ

Galbani Hammoniæ Myrrhæ

Libani [id est, Thuris.]

Mastiches ana ℥ iiij.

Aceti phialam vnam.

Galbanum & Hammoniacum in aceti suffi-
cienti quantitate dissoluantur, & rursū ad
lentorem coquantur, donec acetum in vapo-
rem euauerit: tum addantur liquefactis simul
Cera, Pici, Colophonix & Terebinthinæ: post-
quam omnia sunt commista, inspergito etiam
Myrrham, Libanum & Mastichen subtilissi-
mè trita: ad vltimum, verò, etiam Crocum per
se in tenuissimum puluerem redactum. Et fiat
secundum artem Emplastrum.

OXY.

OXYCROCEVM dicitur hoc Emplastrum,
ab ingredientibus Croco & Aceto.

Nicolaus Alexandrinus secundum hunc mo- A
dum tradit Oxycrocei confectionem. Alij autem
qui ex eo hoc Emplastrū scripserunt, tertiā eius
partem describunt: & cum \mathfrak{z} iij in tres partes
diuidere conarentur, tertiam earū partem sta-
tuerunt \mathfrak{z} i. \mathfrak{z} iij. itaque resultat \mathfrak{z} i. Nam ter-
tria nonem faciunt: quapropter nos maluimus
ex fonte haurire huius Emplastri confectionem.

P. C. SCHOL.

Nicolaus Alexand.] Fuchsf. prauè hic censet A
Cordum in ponderum ratione errare, re non be-
ne ab ipsomet ponderata.

PRODEST omnibus fractis, item partibus
quæ dolore aliquo affliguntur: duritiem deni-
que omnem emollit & discutit.

Emplastrum Apostolicum D. Nicolai.

Rx. Lithargyrii	\mathfrak{z} vj.
Ceræ fuluæ	
Colophoniz	ana \mathfrak{z} ij.
Propoleos	
Visci quercini	ana \mathfrak{z} j.
Hammoniaci	
Lapis calaminaris	ana \mathfrak{z} vj.
	a 3 Masti-

Mastiches Olibani

* Mumia ana ꝑ iiij.

Terebinthinae Bdellij Galbani

Myrrhae Aeris vsti Squamae aris

Viridis aris Sarcocollae

Dictamni Cretici Aristolochiae rotundae

Opopanacis ana ꝑ iiij.

* Olei veteris quantum satis erit.

Vini clari quantum Galbano, Hammoniaco
& Opopanace dissoluendis satis fuerit.

Confice secundum artem & diligenter Em-
plastrum.

*Nicolaus olei quantitatem non exprimit, qua-
re nonnulli ꝑ j. iniiciunt.*

*PROPOLIS, non sunt sordes alueariorum
apum, sed est Cera odorata; qua apes ante hie-
mem foramina alueariorum obturant: Germa-
nicè vocatur Bet & Nebenvvax: eam apes col-
ligunt ex oculis Populi & Betulae arborum.*

*VISCUM quercinum hic non significat li-
gnum visci quercini, sed gluten illud lentum ex
visco quercino extractum, quo capiuntur aues, hoc
est, der vogelleym auß eichenmistell gemacht.*

* *SQUAMA aris est duplex, una est crassa,
qua vocatur Germanicè Kupfferschlach; alte-
ra farinae modo tenuis & rufa: hac vocatur
Kessel-*

Kesselbraun, & est efficacior, & hic debet poni.

VALET ad dolores ceruicis potissimum
& renum; sagittas ac surculos corpori in-
fixos extrahit.

*Emplastron Apostolicum D. Nicolai
Alexandrini.*

℞. Lithargyriij ʒ xviiij.

Ceræ rubræ

Colophonix ana ʒ vj.

Propoleos

Visci Quercini ana ʒ iij.

Hammoniæ

Lapidis Calaminaris ana ʒ ij.

Thuris

Mastiches

Mumiæ ana ʒ j. ʒ.

Terebinthinæ Galbani Bdellij Myrrhæ

Chalcæ cecaumeni Sarcocollæ

Lepidos chalci Opopanacis

Dictamni Cretici Aristolochiæ

Prasij viridis ana ʒ j.

Olei veteris quantum sufficit.

Coquatur Lithargyrium secundū artem in
oleo, donec fiat massa purpurea, & non adhæ-
reat manibus dum refrigerata tractatur, quod
Græci vocant Amolinthum: deinde omnia

2 4

sigillatim

figillatim secundum artem iniiciantur. Gabanum & Opopanacum in vino dissoluantur reliqua Gummi terantur & inspergantur. Di-
ctamnus Creticus verus solus vitimò addatur.

Nicolaus Alexandrinus non ponit olei pondus aut mensuram: mihi autem videntur sufficere uncia sex.

CHALCVCEAVMENOS, id est, *Æsustum*
LEPIS Chalcu, id est, *Squama aris*: Germanicè *Kupfferschlag* vel *Kesselbraun*: & efficacia est altera eius species quæ *Kesselbraun* vocatur.

PRASIVM viride hic significat *Æruginem*, id est *Viride aris*.

Ad omnia vulnera recentia siue antiqua, & ad nervos praeiosos vel musculos, ad puncturas vel morsum terrestrium animalium vel maritimorum peculiariter congruit, educit ab eis humores & putredines intimè immersas, & concavitates earum pura carne replet: repletisque cicatricem absque detrimento inducit: Sagittas, calamos, & similia altiùs membris infixæ, sine dolore extrahit.

Emplastrum Album coctum.

℞. Olei ℥ ij. Cerussæ ℥ j. ℞.
Cera albæ ℥ iiij.

Coquan-

Coquantur secundū artē, & fiat Emplastrū.

OPITVLATVR excoꝛiatis à calceamen-
tis, scapellatione, vel ab alia causa.

Emplastrū griseum, de Lapide Calaminari.

℞. Lapidis Calaminaris præparati	℥ j.
Lithargyrii	℥ ij.
Cerussæ	℥ β.
Tuthiæ	℥ j.
Terebinthinæ	℥ vj.
Ceræ albæ	℥ j. β.
Seui ceruini	℥ ij.
Thuris electi	℥ v.
Mastiches	℥ iij.
Ayrrhæ	℥ ij.
Camphoræ	℥ j. β.

Confice secundum artem.

DESICCAT, replet & cicatrifacit vlcera.

Emplastrum viride.

℞. Ceræ nouæ	Resinæ
Terebinthinæ ana	℥ iij.
Olibani	Mastiches
Viridis æris ana	℥ iij.

Confice secundum artem.

Emplastrum Basilicum magnum.

℞. Ceræ albæ	Resinæ	Pineæ	Seui vaccini
icis naualis	Terebinthinæ	Olibani	
Ayrrhæ ana	℥ j.		

Olei quantum sufficit: fiat Emplastrum.

VLCEA phlegmone carentia, præsertim
artium nervosarum, terget, & carne implet.

a s

Empla-

Emplastrum de Crustapanis Montagnar.

℞. Mastiches Menthæ Spodij

Corallij rubri Santali rubri

* Santali albi ana ℥ j.

Crustæ panis tostæ & maceratæ in aceto p
horam mediam ℥ ij.

Olei de Mastiche

Olei Cydoniorum ana ℥ j.

Farinæ hordei, quantum sufficit.

Fiat Emplastrum.

VALET in vomitu puerorum, & his q
cibum retinere non possunt.*Emplastrum de Baccis Lauri D. Mesuæ.*

℞. Thuris Mastiches Myrrhæ ana ℥

Baccatum Lauri ℥ ij.

Cyperj

Costi ana ℥ β.

* Mellis calidi quantum ad cogendum satis e

Si verò triplum Cyperi & stercoris vacc
rum aut caprarum sicci ad pondus omnium
accipiatur, erit efficacius ad hydropisim, & in
flationes discutiendas.Ventriculi, intestinorum, hepatis, renu
vesicæ, vteri, & partium aliarum dolorem
flatibus aut intemperie frigida ortum placa

P R A

379

P R Æ P A R A T I O N E S
Q V O R V N D A M
S I M P L I C I V M.

Aloën cum Aromatibus abluendi modus.

Aloës purissimæ & cribratæ P j.
Cassie lignæ Spicæ uardi Indicæ
Sari Schœnanthi
Carpobalsami [aut succedanei eius.]
Cylobalsami [aut succedanei eius.]
Cinnamomi Ligni aloës Croci Mastiches
accæ ana ʒ iij.

Decoquantur aromata in aquæ quantitate
sufficienti, secundū artem in duplici vase: de-
inde colētur. In colatura dissolue Aloën con-
nuē agitando: & pone ad solem in vitrea aut
treata patina, donec exiccetur. Oportet au-
tem patinā linteolo puro tectam soli expone-
re, ne aliquīd incidat. Quōd si hieme lauanda
est Aloë, in æstuarium ad fornacem ponatur:
oportet etiam fundo vasis insidentes arenas, &
quæ sunt aliæ sordes, diligenter auferre.

Aloën simplex abluendi modus.

Aloës purissimæ & tritæ P ij.
Aquæ cælestis q. s. aut P. vj.
Miscan-

Misceantur in patina vitrea, ita ut aqua c-
 lefacta prius infundatur: deinde subsidere sin-
 to sordes & calculos, & puram pinguemque
 aquam, cui se pura Aloë miscuit, sensim exco-
 lato, & sordes in fundo abiicito; postea colatur
 ram tectam linteolo in sole exiccato.

Laccam abluendi modus.

Modus abluendi Laccā, qui passim à scriptoribus traditur, admodū absurdus est: & qui enim primus inuenit aut tradidit, Lacca naturā penitus ignorauit: nam quidquid purū, sincerū & efficax est in Lacca, illud aqua miscetur, quā illi dicunt abiiciendā esse, & quod remanet, in Trachiscos formandum: hoc est calculos, ligna & sordes. Nos verò rectius modum trademus.

℞. Aristolochiæ longæ

Schœnanthi ana ℥ ij.

Decoquantur in aquæ ℞ iiij. aut q. s. donec nec remaneant ℞ ij.

Colaturæ insperge

Laccæ integræ ℞ j. ℥ iiij.

Decoquatur Lacca deinde lēto igne, donec aqua fiat coloris sanguinei: & quidquid in Lacca boni fuerit, dissoluatur, tum per filtrum aut laneum pannum cola, & remanentes sordes

de

es abitte. Excolatam verò & sanguinei coloris aquam lentis prunis in duplici vase vsq. ad mellis spiffitudinem coquito, & tepidam massam in Trochiscos fingito. hic itaque verus est modus abluendi Laccam.

Plumbum lauandi modus.

2. Mortarium plumbeum, in eum infunde aquam cælestem, & agitato aliquot horas aquam in mortario, donec aqua colorem acquirat linidum, & crassescat in modum limi. Limum hunc per linteum exprime, & exiccatum repone.

Limatura ferri, quam Scoriam vocant, preparatio.

1. Limaturam ferri optimi, aut Chalybis, aut Squamam. hoc est, Batituram eius: purgacam ab omnibus immunditiis, hoc modo: Proliciat in aquam clarissimam, & fricetur manibus, postea sordidam aquam effunde totam, deinde impone limaturam in vitream patinam, & affunde modicum aceri, vt tantum humectetur, nec emineat acetum: postea macera diebus xxx. ultimo tere & repone.

Scam-

Scammoneam preparandi modus.

℞. Scammoneæ optimæ ℥ iiij.

Contere in subtilissimum puluerem, deinde insperge illi olei Violati optimi modicum, fiat massa: deinde excava aliquot Cytonia magna, & in cauitatem eorū impone massam Scammoneæ, & cooperi foramina Cytoniorum: postea assa in fornace cum pane, donec Cytonia perfectè sint assata: deinde exime Scammoneam, & impone sequenti diluto.

℞. Carnium Myrobal. Citrinarum ℥
Succi Cytoniorum ℥ iiij.

Conterantur Myrobalani, & misceantur cum calefacto Cytoniorum succo, & stent in infusione horis xxiiij. deinde leuiter cola: colaturam verò infunde Scammoneæ, & optimè simul misce: vitimò in loco calido exicca, & exiccatam repone Scammoneam.

Colocynthis preparatio.

* ℞. Colocynthis pulpæ ℥ j.

Bdellij

Tragacanthæ ana ℥ xij.

Incidatur Colocyntis minutissimè, Tragacanthum verò & Bdelliū dissolue in aquæ Rosarū q. s. & dissoluta insperge incisę Colocyntidis

idi, & fac Trochiscos, quos in sicco aliquo
co siccabis, exiccatos deinde Trochiscos ite-
m subtilissimè terito, & reforma Trochiscos
hibita Mastiche in oleo Rosaceo dissoluta.

Scilla preparatio.

Scillā magnā recentē, neq. putridā, neq. ge-
lu flaccidā: abiice eius exteriores aridas tu-
nicas: inuolue deinde eam massæ siue pastæ
pistorū vnde panis fit: assato postea in furno
cum panibus, donec panes percocti fuerint:
hinc è furno exime Scillā, & sigillatim om-
nes tunicas derrahe, & funiculo traiectas in
calido loco exiccato, abiicito verò medium
Scillæ cor, vnde germen enasci solet. Porro
Scilla non est incidēda ferreo aliquo cultro,
sed è ligno solido aliquo facta: nam cōtra-
hit à ferro venenosam quandā rubiginem.

Mezerei fol. preparatio.

Foliorū Mezerei quantū libuerit, ea mace-
ra in aceto vini horis xxiiij. postea exiccen-
tur: cum verò yriiis voles, cōtere, & in con-
tundendo abiice eorum venas & nervos.

Esula rad. preparatio.

Esula tam maior quàm minor, præparatur
odem modo quo Mezereon.

Gersam

Gersam Serpentariae faciendi modus.

℞. Radices Serpentariae verę, vel loco eius radicem
dicum Ari, id est, Aronis ꝯ iij. Terantur subtili-
tissimè, & affunde eis aquę Rosaceę ꝯ iij.
deinde exsiccentur ad solem in vitrea patina
na, linteolo tecta. Postea secundo tantum
aquę rosaceę affundito, & simili modo ex-
sicca: tertio eadem aquę Rosaceę quātita-
inspergatur, & ultimò siccata in farinā cum
vino odorato in Trochiscos siue orbiculos
finge & repone: ingreditur autem hac Ge-
sa vnguentum Citrinum, & reliqua quę a-
nitorem cutis conficiuntur.

Spodium præparandi modus.

℞. Eboris in partes secti ꝑ j.

Pone id in nouum & nondum crematum fi-
tile, & crudo operculo tegito, & iunctura
luto figulino diligenter oblinito: postea in
fornacem figuli mitte, & cremari finito, donec
fictilia percocta sint; deinde exemptum Ebu-
in tenuissimum puluerem terito & cribrato, &
infunde ei in patina vitrea aquę Rosarum ꝯ iij.
& exsicari finito. Deinde secundo terito, &
alias ij. ꝑ aquę Rosaceę affundito, atque si-
militer exicca. Tertio etiam terito, & admisc
aqua

in aqua Rosarum ꝑ j. in qua diligenter dissolu-
ta sint Camphoræ tritæ subtilissimè ʒ iiii.
Tere omnia in tabula marmorea durissima, &
frange Trochiscos, quos repone in denso vase
aliquo, ne expirent. Porro si Ebur habere non
poteris, loco eius sume Cornu ceruinum, & si-
militer præpara: est enim hoc quoque optima
medicamentum ad multa, præsertim contra
venena.

*Ebur crematum, melius est ut operto fictili
fiat: alias enim non candidum, sed nigrum fit.*

Pulmonis Vulpini præparatio.

ꝙ. Pulmonem Vulpis recentem, extrahe ex co-
arteriam siue fistulâ, & lava in vino odorato
calefacto: mox ollæ impositum, exicca in
tepido furno: deinde exiccatū repone in lo-
co sicco, & inuolue Absinthio, ne putrescat.

Hepatis Lupini præparatio.

Hepar Lupi eodem modo præparatur quo
pulmo Vulpis.

Sanguinis Hircini præparatio.

Hircum mediocris ætatis domi alito, & per
mensem nihil aliud dato præter Pimpinellam,
Apium, Petroselinum, Leniticum, & similia:
deinde sanguinem eius, qui ex aeternis fluxit,
excipito.

excipito, & concrefcere finito; atque aqueum illud effunde, grumos verò sanguinis in furno exicca. Maëtandus autem eft Hircus Veris exitu, id eft, principio æftatis cum Sol Cancrum ingreffus eft.

Adipum vel Pinguedinum præparatio.

℞. Adipem vel Pinguedinem cuiuscumque animalis, & laua in aqua aliquoties, donec pura defluat aqua, & non amplius faniofa aut crucata appareat: deinde incifam liqua in duplici vafe, & eliquatam in frigido loco repone fine fale.

Medullarum præparatio.

Medullas ex offibus auferto Autumnæ initio, & laua, & liqua in duplici vafe, fecundum modum qui traditus eft in Adipum fivæ Pinguedinum præparatione.

Oefypum faciendi modus.

℞. Lanæ succidæ, hoc eft, nondum purgatæ, ex collo, feminibus & femoribus ovis de tota quantitatē fatis magnā: infunde ei aquam feruidam, & laua diligēter quouſq. omnem suam pinguedinem in aquam depofuerit. Poſteà expreffam lanam ſepone, & aquam illam pinguem & ſordidam vaſculo aliquo diutiſſi.

diutissimè ex alto fundito & refundito, donec spumosa fiat: tum finito spumam subsidere, & collige aquæ innatantem pinguedinem: iterumq. aquam refundito, donec spumet, & subsidentem pinguedinē aufero; & rursus refundito, donec non amplius spumet, & nulla concreseat supra aquā pinguedo. Tum collectam pinguedinem iungito, & in aqua lauato, manibusque diducito, donec pura fiat, & aqua clara defluat & albescat, & linguam admota non mordeat: tum reponere in fictili denso, loco frigido. Porro hic Oesypus hodie vocatur corrupto nomine Hysopus humida: sed non bene præparatus habetur in Pharmacopoliis.

Terebinthinam resinam coquendi modus.

℞. Resinæ Terebinthinæ, aut eius loco Laricinam resinam, quam Terebinthinam hodie vocant, ℞ j. affunde ei aquæ ℞ xxiiij. & coque in magno vase, donec odorem amittat & inspissetur, adeo ut refrigerata digitis in puluerem teri queat. Hoc modo vsta resina ingreditur in quædam Vnguenta, Olea, & in Trochiscos Cyphi, qui pertinent ad Mithridatium.

b 2

Acacia

Acacia Succedanea.

Acacia vera apud nos non potest confici: eius autem loco sumunt nostri Pharmacopola totius ferè Europa, succum Prunorum siluestrium, id est, Schlehen-safft. Sed hæc, quam describemus, propius ad vera Acacia vires accedit.

℞. *Seminiū Thamarindorum*
Sumach ana ℥ ij.

Contundantur, & affunde eis aquæ celestis
℥ viij. ant q. s.

Macera deinde per horas xxiiij. Postea coque donec tertia pars aquæ remaneat: excolatam deinde aquam, cum albuminibus ouorum clarifica & despuma: despumatam deinde iterum coque supra lentas prunas ad spissitudinem iustam, deinde repone, ut Acaciam ex Prunellis siluestribus factam.

P O N D E R V M
R A T I O.

P O N D E R A quibus hodie Medici utuntur, hæc sunt: *Libra, Quartarium vel Quadrans, Vncia, Drachma, Obolus, Scrupulus, Lupinum, Granum, Siliqua, Lens;* & hæc quidem à Græcis atque Romanis mutuauerunt.

Præter hæc sunt alia quæ à Barbaris atque Arabi-

Arabibus desumpserunt: qualia sunt, Manipulus, Pugillus, Aureus, Kist, Kirath, & Danic, quorum nominibus Mesuen potissimum uti constat.

Libra itaque, quæ & Pondo etiam dicitur, in duodecim uncias diuiditur. Errant itaque indocti huius ætatis Pharmacopola, qui libram sedecim unciarum, quot sanè mercatoria ac negotiatoria est, in medicamentis conficiendis accipiunt. Ea autem illos uti libra facilè ex quartis colligitur, quibus uncias quatuor assignant, quas si quater sumpseris, sedecim prodibunt uncia. Quartam autem libra partem, Latini Quadrantem nominant sicuti tertiam Trientem, sextam Sextantem. Quadrans itaque, vel (ut nostri loquuntur) quarta, vel Quartarium, pondus existit trium unciarum. Triens verò quatuor, veluti Sextans duarum unciarum.

Porro Vncia octo drachmas cõstituit: denarios septem. Drachma scrupulos tres. Scriptulũ verò, qui Græcis ρεῖσμα dicitur, quasi primum ponderis elementum, nonnulli Scrupulum etiam nominant: habet verò obolos duos. Obolus pendet grana duodecim, quæ idcirco viginti quatuor scrupulum constituunt. Nicolai tamẽ scrupulus ex viginti tantum granis constat.

b 3

At &

At & alia pondera Græcorum Medici usurparunt Drachma enim nouem Lupinos pendit Siliqua verò, qua Græcis $\chi\rho\acute{\alpha}\nu\alpha\varsigma$, est dimidium Lupini Siliqua itaq. sex, Lupini tres scrupulum pendunt. Semex autem in Siliqua contentū, non tota Siliqua intelligitur: & id mediocre, nō enorme & habitius, neq. strigosum & emaciatum, qualia hordei aut tritici grana usurpamus, qua hodie minimum pondus faciūt veluti olim grana lentis. Vnum enim Siliqua grarum sex lentis seminibus pondere respondet: qua si sexies sumpseris, in vniuersum triginta sex lentis semina prodibunt, qua scrupulum constituunt.

Nunc ad ea, quibus Arabes & recentiores vsi sunt, veniemus: inter qua primū Manipulus nobis occurrit. Sc. autem vocant herbarū fasciculū, qui manu deprehendi & complecti potest. Pugillo autē perperam pro pondere vtuntur recentiores, cū sit diminutiuum potius à pugno, qui compressis sit digitis. Aureus, illis pondus vnius drachmæ cum dimidia significat. Danich pondus octo granorum. Kirath verò quatuor.

P. C. SCHOL.

Danich.] Contra Georgij Agricola, aliorumque doctiorū virorū sententias, Cordus Danich pondus granorū sex, & Kirath trium faciebat.

NOTÆ

391

NOTÆ PONDERV M

QVÆ HODIE IN

V S V S V N T.

Grani	}	Nota est	Ġ. Ein gren oder ger-
Scrupuli			sten kornleinschver.
Drachmæ			Ʒ. Ein scrupel ein drit-
Vnciæ			teil eins quintlins.
Quadrantis			ʒ. Ein quintle, oder gul-
Libræ			den schver.
Semis			ʒ Ein vntz, ist Zuvcy
Manipuli	}		lot.
Pugilli			Quad. Ein quart, ʒ
			lot.
			℥. Ein pfund.
			ß. Halb.
			M.
			P.

FINIS eorum qua Valerius Cerdus Nu-
rembergensi Senatui exhibuit.

b 4

VALE

VALERII CORD

DE EXTRACTIONE, VT

VOCANT, PURGANTIVM MEDI

*camentorum, & Oleorū destillatione: in gene-
re primum: deinde priuatim de Oleo è Chal-
cantho duplici, vno austero (vel acido,) al-
tero dulci: Libellus tripartitus à Conrado
Gesnero primū publicatus, & Val. Cordi an-
notationibus in Dioscoridē ab eodē annexus.*

P A R S P R I M A.

De Extractione. Cap. I.

EXTRAHITVR ex medicamentis So-
lutiuis ipsa qualitas purgans æquē ac
Olea, sed diuersa ratione. Olea propter ætiam
substantiam ascendunt in destillatione. Solu-
tiua verò facultas, quoniam terrestri corpori
inseparabiliter inhaeret, non ascendit, sed in
fundo relinquitur: excepto vno atque altero,
flore videlicet Pruni siluestris & Persici; quo-
rum aquæ destillatæ alnam subducunt; & quia
fiores hanc vim obtinent: nam hi melius
à Sole excoquantur, & subtiliores vires, quæ
facile resolvuntur in vaporem, acquirunt. Sed
quæ

quæ propriè solutiva vocantur, vt sunt radices, aut radicum liquores, aut succi, aut cortices, aut semina, omnibus inest tenaciter inhærens & viscosa qualitas. Ideoque eorum solutiva vis non potest ascendere in destillatione, sed manet in substantia decoctionis, ex ea evaporante quicquid est aqueum. Excogitata autem hæc est extractio pro delicatis & nauseabundis, vt qui magnam solutivi dosim non ferunt.

Ellebori nigri extractio. Cap. II.

R E C I P E rad. Ellebori nigri recent. libras iiij. lauentur, dum sunt succo præditæ: deinde incide minutim, ac superinfunde sequentis decoctionis colaturam:

Succi Buglossi, Borag. ana ℥ ij. Succi depurentur, & colentur diligentissimè, vt auri claritatem acquirant, & reponantur ad tempus conueniens.

Deinde ℞. rad. Fœniculi, Cichoreæ, Asparagi, Petroselini, ana vnc. iiij. Fruct. Iuiubarum, Sebesten ana ℥ ij. Seminum Melonum, Cucumeris, Cucurbitæ, Citrulli, ana ℥ β. decoquantur secundum artem in aquæ ℥ xij. Colaturæ infunde prædictas ℥ iiij. succorum: deinde sine ebullire paululum ad ignem. Postea

b 5

incisas

incisas & contusas radices Ellebori iniice, & coque lento igne paulatim, vsq. dum radice emineat: deinde exprime rursum per filtrum Colaturam coque ad Mellis crassitudinem clemēti igne, adhibita assidua cura ne aduratur. Postea repone, & vttere faciēdo periculum in dosi, à scrup. semisse, vsque ad scrup. vnum

P. C. SCHOL.

Sebestien ana ℥ ij.] *Cum Gesneri editio ana ℥ ij. legat, ego ex industria (si pondere metiendi sunt hi fructus) ex drachmis uncias feci, & legendas esse puto. alioquin cuiusque uncia una ad minus sumi debet. Cumq. semina frigida ponderibus carerent, ego cuiusque ℥ β. adscripsi. Si cui verò hac non placuerint, illi, ut suo more loca hac restituat, permittitur.*

Extractio Rhabarbari. Cap. III.

R H A B A R B. electi ℥ j. minutim incidatur, & grosso modo teratur: postea adfunde
 * succi depurati Boraginis, Buglossi, ana ℥ ij. maceretur per horas xxiii. deinde coque ad lentissimum ignem, vsquequo extra emineat Rhabarbarū. Exprime postea fortiter, & expressam decoctionē per lancū colatoriū trans mitte & exprime, vt substantia in colatorio maneat:

beat: colaturā coque ad mellis spissitudinem,
 dictis Zuccari vncijs ij. Quidam in balneo
 Mariæ ad spissitudinem coquūt, ne aduratur,
 quod melius est, quemadmodū etiā in duplici
 vase. Purgando deglutiendū cum gutta olei
 Cinnamomi, aut Anisi mixtū & azymo inuo-
 lutum, faciendo in dosi periculū, à scrup. j. vsq.
 ad scrup. ij. Quidam, quia Rhabarbara per se
 non valde purgant, acuant totā extractionem
 ū modico Diacridij optimi, quod nihil nocet.

*De Extractione è Massis Catapo-
 tiorum. Cap. IIII.*

Cv m virtutē solutiua ex massis pilularum
 extracturus es, necesse est, vt prius diligenter
 dispensata sit massa, sumpta Aloë purissima, &
 aliis medicamentis electis. Deinde recipe quā-
 tumq. volueris massam, & cōcidas in minutas
 partes, ac macera per octiduū in aqua pluuiali,
 succorū Boraginis, Fœniculi ana q. s. Coque
 deinde in vitreo duplici vase per integrum
 diem: deinde exprime per laneū pannū mun-
 tissimū, qui nullos pilos emittat, & iterum in
 balneo vel in duplici vase ad iustam spissitudi-
 nem diligenter coquito, & forma pilulas mi-
 nutas. da scrup. ij. aut circiter vnū. Hoc modo
 extracta

extracta massa est purissima, tenera, & facili in manu liquefcit. Porro reliquorum purgantium medicamentorum vires similiter exprimi possunt. Sed animaduertendum, quod semper sint admiscenda in decoctione lenientes & lubrici succi, quales prædicti sunt: & melius multo est, vt omnia in duplici vase coquantur.

Aloë quomodo optimè lauetur. Cap. v.

A L O E N optimam, fuluam, pellucidam, facile in manu liquefcientem, cōfringe in partes minutas, & pone in patinam vitream mundam: & infunde desuper sufficientē quantitatem aquæ pluuiæ: dissolue in duplici vase omnino, & permitte denuò refrigerari. postea aufer innatantes, si qui sunt, pilos; & sensim quod est liquidissimum ad spissitudinem in duplici vase coque. Quod verò in fundo vasis est crassiusculum, in alios vsus seruetur.

P A R S S E C V N D A.

De destillatione Oleorum. Cap. i.

Q V O N I A M Aromata quædā, & omnium umbelliferarū herbarum semina ferè constant magna ex parte, calida, tenui & aëria substantia: ideo necesse est, vt aliquid de oleaginosa substantia habeant. Nam talem habent
mixtu-

ixturam propemodū omne oleum. At cum
 cum & pinguedo quæ in simplicibus medi-
 camentis continentur, duplex sit, quædam
 nonenda sunt. Naturæ periti, duplex inueni-
 unt oleum. In simplicibus medicamentis:
 unum terrestre, crassum & viscosum, & totali-
 ter suo corpori in quo est commixtum: quale
 est oleum Nucum, Amygdalarum, Baccarum
 auri, Seminum Lini, Hyoscyami, Sinapi,
 apaueri, & omnia similia quæ in fructuum
 aut seminum nucleis continentur. Hæc autem
 omnia propter totalem cum substantia cui in-
 continent commixtionem inseparabilia sunt, nec
 aliquo modo per destillationem elici possunt.
 Quare vi exprimenda sunt è substantia. Alte-
 rum tenue, æriumque est, & separabiliter suo
 corpori inhaeret: & hoc est segregabile. Ascen-
 dit enim faciliè in destillatione, nec difficulter
 suo cui inest corpori decedit. Tale autem est
 quod continetur in aromatibus, Carpobalsa-
 mo, Cardamomo, Pipere nigro, Cubebis,
 Cinnamomo, Garyophyllis, Macere, Nuce-
 moschata, Ligno aloës. Item quod continetur
 in seminibus umbelliferarum herbarum: qua-
 les sunt Ligusticum, Angelica, Angelica mi-
 nor, Libanotis nigra, Magistrantia, Pastinaca,
 Caros

Caros, Cymīnū, Ammi, quod appellant Ammū: item Apiū, Petroselinū, Giagidiū, Pimpinella, Anisum, Fœniculū, Anethum, &c. Elciuntur autē hæc olea per destillationē in arena, ita vt tusa aromata aut semina iniiciantur in cucurbitam vitream luto intestam optimā vna autē vice ad L. ij. iniiciantur, & sint tria secundū capacitatem cucurbitæ: infundatur deinde ad vj. lib. aquæ clarissimæ, ac miscetur diligenter. Pone deinde cucurbitā in capellā aptam fornaci, & arena imple, & non attingat fundum, sed intersit arena. Cucurbitę imponi alembicū vitreū, cuius rostrū desinat in stanneam vel ferream fistulam stanno intus & foris illitā: ea fistula transeat in obliquū per vas quod habet in se aquam frigidam, vt inter destillandū egrediens cū oleo liquor refrigeretur, claude iuncturas accuratē, madefacta papyro vel linteo, & suppone exceptoriū. Postea accende ignē lentū, & vide ne nimium surgat & ebulliat in alembicum, quod in cucurbita continetur. Semina enim quædam vt Anisum propter raritatē substantię suæ, simulq. viscosum quod habet largiter ebulliūt, ideò nō statim alembicum imponere debemus: sed postea quā bullas excitari videris, & vaporē sursum ferri

ferri. Quod cum fiet, depone alembicū, & im-
misso bacillo agita, ita resoluetur in vaporem
spuma, quæ postea mediocri igne moderari,
cōpesci & excitari potest. Quo facto, impone
rursus alembicum, & circumlutato satis, ac di-
stillato sine cessatione, donec cōieceris nullum
amplius intus contineri oleū: quod visu & gu-
stu statim percipies: nam cū gustu distillantes
guttæ non amplius respicient iniectionis aromatis
saporē, desistendum est ne aroma fundo cucur-
bitæ inhereat & exuratur. Deinde segrega con-
tentū in distillata aqua oleū optimū, quo po-
tes artificio. Porro notandū est, quædam ex his
oleis aquæ innatare, quædam fundum petere.
Innatant Piperis nigri, & recētis Cardamomi
& Anisi: Fundum petunt, Cinnamomi, Macis
& Garyophyllorum, &c. ut videtur. Aqua Cin-
namomi & Anisi cū destillantur, lacteum
habent colorem, & lacteum hoc paulatim in
oleum conuertitur. Reseruanda autem Cinna-
momi est aqua, præsertim quæ primò exierit.

Natura & vires Oleorum. Cap. II.

FOENICULI & Anisi olea, naturam mi-
rabilem habent: nam in hieme vtrumq. con-
crescit instar butyri, ita ut aspectu imitentur
sperma

ſperma Ceti, præſertim Aniſi. nam hoc æſtat
media concreſcit aſpectu niueum: reliqua
omnia liquida permanent. Reponuntur opti-
mè in loco frigido & puro, præſertim Carda-
momi & Piperis. Ea enim omnium tenuiſſi-
mam ſubſtantiam habent, adeò vt neglecta
omnino euaneſcant. Vires autè habent earum
rerum, è quibus extracta ſunt; ſed multò effi-
caciores. Nam efficacia quæ vni libræ ineſt, in
paucas drachmas contrahitur. Garyophylli
enim vnciæ xvj. contrahuntur in vnciã vnã
ſemis, aut duas. Cinnamomi in drachmas duas
ſemis, aut duas. Piperis, in drachmas duas aut
tres vna ſemis. Miſcentur autè in confectione
gutte x, vel xv, aut xx. librę Zuccari pro delica-
tis: ſed infundendum eſt vltimò cum morſel-
lis, quos facis, vel orbiculis, optimè miſcendo.

P A R S T E R T I A.

De Oleo Vitrioli faciendo. Cap. 1.

OLEUM vitrioli, quod à quibuſdam
Oleum vitæ appellatur, aut melancho-
lia artificialis, nihil aliud eſt, quàm aluminosa
qualitas, & ſubſtãtia ex vitriolo per artem ex-
tracta, modicoque ſulfuri mixta. Nam ipſum
vitriolum è quo fit, triplici conſtat mixtura,
videli-

videlicet multo alumine, modica æruginē, & paulo sulphure. Aluminosa enim aqua in metallis per cris venas & Marchasitam distillans, æruginosam qualitatem acquirit, & sulphuri, quod Marchasitæ inest, mixta paulatim con- crescit, aut industria ad spissitudinem coqui- tur: in distillando autem aluminosus & sul- phureus vapor tantum ascendunt, æruginosa qualitate in fundo retortæ relicta; quo fit, vt hoc oleum aluminis, & non æruginis saporem habeat. Est autem duplex hoc oleum, nempe austerum & dulce. Austerum duplici constat mixtura, scilicet alumine multo & modico sulphure. Dulce verò simpliciter sulphure con- stat. Nihil enim aliud est, quàm liquidum sul- phur ex austero oleo extractum. Quapropter gustu nequaquam alumen, sed sulphur emula- tur. Faciendū est autē vtrumq. maxima cura & diligētia, adhibitis aptis fornace, retorta, & receptaculo: siquidē aptitudo instrumētorum, ut aiūt Chimistę, magistrū parit. Quapropter sequentes Canones diligenter obseruentur.

Electio Vitrioli. Cap. 11.

CVM plurimæ sint Vitrioli species, operæ et iū est indicare, quæ nam species eius huic

c

operi

operi potissimum cōducat. Et quamuis omne vitriolum hoc oleum reddat, nullum tamē est ex omnibus præstantius caruleo aut viridi: quoniam plurimū fugitiui sulphuris obtinet, quo adiuuatur, vt facilius oleum ascēdat. Notandum etiam melius esse facticio natiuum Vitriolum, & maximē Vngaricum: aut si huius copia non sit, Goslarie. Eligendū præterea est quod magnis racemis constet, & maioribus cubis concretum sit. Quod autem fractum, minutum & puluerulentum est, veluti inutile non est recipiendum, quemadmodum etiam quod Solis vel aëris iniuria candorem & puluerulentam canitiem contraxit.

Coctio Vitrioli. Cap. III.

At quia Vitriolū multū in se habet aquei & excrementici humoris qui oleū diluit, & non nisi longo tēpore & magnis molestiis per distillationem ab oleo separari potest; cōpendiosa est inuenta via, qua breui tēporis interuallo id absumi queat, ne lōga mora artifici fastidium pariat. Recipe igitur prædicti Vitrioli P xij. conice eas in ollam magnam, nouam & optimē crematam: ollam impone fornaci profundæ, supra ardentes prunas: cū liquefier

& bullire cœperit, spatula agitetur, vt integrum liquefacto misceatur, donec & ipsum liquefiat. Bullire demum finito, vsquequo nullam prorsus bullam amplius excitet, & donec totum densetur. Deinde exemptam è fornace, cum Vitriolo ollam refrigerari permittito, loco neque humido neque ventoso, sed sicco & tepido: postquam refrigeratum fuerit, ex olla eximito, & considera an superficies eius vndique rubescat. nam si rubescit, bonum est signum, & facilius calcinatur, vt iam dicemus.

Calcinatio Vitrioli. Cap. IIII.


EXEMPTVM olla Vitriolum, in minutas partes confringe, & in mortario subtilissimè terere: deinde tertiam aut quartam eius partem in nouam ac bene coctam ollam conice, ac rursus in profundam fornacem, sicut antè, dimitte, & aliquamdiu vrito, donec rufus fiat color. Mox ollā ab igne depone, & moue eam, vt videas notam, an satis calcinatum sit Vitriolum. Nam si in olla fluctuat argentiuiui ut liquefacti plumbi modo, & exsistentes bullas eiacularur, satis vsum esse intellige: tunc effunde in magnam & recentem ollam prius calefactam, & effluet quasi sit liquidū, aut ad

c 2

modum

404 VAL. CORD. DE ARTIF.
 modum argenti vini. Quod autem reliquum
 est Vitrioli, similiter sigillatim, vt calcinetur,
 vras. Cum vltum fuerit, commisce rursus op-
 timè in mortario, modeste agitans ne pulue-
 rem excites nares & fauces offensurum. Cum
 hæc omnia executus fueris, Vitriolum in bi-
 lancem ponito, & animaduerte pondus ipsius.
 Nam si vj. lib. id est, medietas superfuerit, be-
 ne omnia facta sunt: sed hæc sufficiant.

De fornace faciunda, Cap. V.



MATERIA quæ di-
 stillāda est, quomodo præ-
 paranda sit, iam indicaui-
 mus. Nuncautem dicere de
 fornace res & ordo postu-
 lat. nam si hæc inepta fue-
 rit, frustra omnia fient. Ex-
 truenda igitur est fornax
 ex lateribus in planum po-
 sitis, quo crassioribus parie-
 tibus ignis facilius & diu-
 tius contineatur: fiet etiam
 quadrata & æqualiter cras-
 sa, intusque habeat prope-
 modum duarum spithama-

rum

rum latitudinem, non tamen omnino, sed dempta tertia parte spithamæ. Extruaturn autem hoc modo: Prima & infima cavitashabeat altitudinem semipedis, cui pertransuersum imponantur serraenta satis crassa, vt ignitis carbonibus non inflectantur: secunda cavitash, quæ est constituta supra ferream cratem [id est, *vber den roß*] habeat duum pedum altitudinẽ, & ex anteriori parte foramen, per quod carbones iniciantur. hoc incipiat lateris transuersi crassitudine super cratem. Per mediam deinde cavitatem, in ipso medio insipienti fornacem, per transuersum infigatur ferreus axis, quadrangularis, crassitudine pollicis, qui impositam retortam sustineat. In latere deinde sinistro fornacis, relinquatur meatus, per quem retortæ collum exeratur.

Destillatio Vitrioli. Cap. VI.

POSTQVAM fornacem extruxeris, eligito retortam capacem, aptamque ante omnia, ex vitro Venetiano aut saltem Hessiaco factam, prius vndique luto obductam: in eam coniecito totum Vitriolum, ita vt aliqua pars retortæ relinquatur vacua, quò facilius à Vitriolo spiritus ascēdere queant. Mox transuer-

1 sam & ferream trabem in fornace optimè luto
 2 obducito, eique in medio superposito perluta-
 3 tum testæ fragmentum; super id collocabis
 4 retortam, ne à candente ferro immediatè dis-
 5 secetur, ita tamen, vt in medio fornacis retorta
 6 constituta sit; eiusque rostrum extrorsum mo-
 7 dicè prouum promineat, & meatus per quem
 8 collum suum è fornace exerit, diligentissimè
 9 luto farciatur atque obstruatur. Postea accipe
 10 quinque tegulas, & fac ex iis tectū supra for-
 11 nacem sub quo lateat retorta ad eum modum
 12 quem depinxi, tectū luto vndique obducatur,
 13 quatuor pro fumo foraminibus relictis, in
 14 singulis angulis singulo, ea amplitudine, vt
 15 crassissimus pollex liberè intronitti & exeri-
 16 queat. Fac etiā quatuor conos ex luto, quibus
 17 foramina obstruantur: quo facto, applica re-
 18 tortæ orificio receptraculū grande ex vitro Ve-
 19 neriano aut Hesiaco: quo enim maius idip-
 20 sum fuerit, eo liberiùs spiritus recipiet: si verò
 21 paruum fuerit, periculū est ne spirituum copia
 22 distentū rumpatur: infunde etiam in retortam
 23 aquę clarissimæ vnc. xvij. aqua enim citò spi-
 24 ritus ad se rapit, & prohibet ne cōfringatur re-
 25 ceptaculum. Ita applicatum optimo luto dili-
 26 gentissimè obstruatur, magna adhibita cura,
 27 ne

ne quicquam in receptaculū incidat, tingitur enim inde in rufum colorē oleū. Cū omnia hæc feceris, dimitte per integrā noctem lutum exiccari: ac si quæ fatiscunt rimæ luto illinantur: manē deinde perlucidum accende ignem, ex puris & magnis carbonibus, aperto vno superius foramine, per quod fumus exeat, augeaturque successiue ignis vsque ad vesperam: quo tempore aperiendum est secundum foramen, & attende diligenter an appareant spiritus, qui è retorta egrediūtur, veluti si quis candidum efflaret fumum: nocte sequente vigili cura cauendū ne ignis remissior fiat, sed acrior, paulatim tamen: ita deinde auctum ignem in vigore teneas, ac altera die tertium aperi foramen, augendo sigillatim ignem, vsquequo etiam retortæ collum candescat. Sequenti secunda nocte auge ignem, & post mediam noctem aperi quartum foramen. Cū ita in summo vigore ignis fuerit constitutus, videbis spiritus egredi, veluti conglomeratas nubes; qui cū cessare voluerint, aperi omnes fornacis aditus, & sine intermissione carbonesingere, vsquequo etiam receptaculum excandescat; studiosè cauendo ne quicquam frigidum aut humidū super retortam aut receptaculum

culum iniuria aut casu decidat. Agenda hæc sunt in loco clauso, quò neq. imber, neq. ventus ingrediatur: cōservandus autem ignis est, donec nulli prorsus spiritus in Vitriolo relinquatur: quod visu facillè percipi potest. Cùm autem nulli amplius egredientur, sine vt per se extinguatur ignis, ac totum opus integrum cum nocte diē quiescere ac refrigerari finito: postea aufer cum contento humore receptaculum; & repone, donec oleum ab aqua segregabis: tum contractam retortam inspice, & vide an caput mortuum nigrum sit: hoc enim signum est perfecti operis. Est autem caput mortuum exustum in retorta Vitriolum.

Segregatio infuse aque. Cap. VII.

QVONIAM in receptaculo continetur vnà cum Vitrioli oleo aqua, segreganda hæc est, vt Vitrioli liquor sincerus reponatur: segregatur autem per distillationem in balneo aut cinere subtili, tutius tamē in balneo: quapropter totum humorem qui est in receptaculo, in cucurbitā vitream Venetianam aut Hefsiacam infunde, superponendo Alembicum ē simili vitro factum, quæ bene luto circumlinatur: sub balneo deinde accenso igne, paulatim

tim sine aquam exstillare, donec habeas vnc. xvij. illas quas infudisti. Si Vitriolum non bene calcinatum fuerit, plus egredietur: quare vide ut prædictæ xvij. vnciæ sint bonæ mensuræ. Cùm hoc feceris, refrigerari balneum finito, & aquam quæ distillauit abiicito. Quod verò in balneo cucurbitæ in fundo reliquum fuerit, purum est Vitrioli oleum: habet tamen plerumque rufum colorem, idcò secundum sequentem modum rectificandum est, ut clarum fiat.

Rectificatio olei Vitrioli. Cap. VIII.

ACCIPERE retortam Venetianam aut saltem Hessiacam, antea luto optimo vestitam: in eam funde quod in cucurbita continetur oleum: retortam pone in minorem fornacem, in capellam quæ pura & lota arena repleatur. Et quemadmodum antea in balneo, ita nunc in arena distilla, paulatim ignem acuendo, ut sigillatim ex intervallo delabantur guttæ. Retortæ orificio applica receptaculum ex eodem vitro factum, ac commissuram optimè luto claude, ne quicquam expiret: cùm deinde totum è retorta distillauerit, refrigerari finito, ac postea aufer, & infunde sensim in purum vitrum

c s

trum

trum Venetianū, quod habeat angustum orificium, ac reponere, ceu præsens in multis morbis remediū. Hoc est austerū Vitrioli olenū, cuius vires & naturam nunc indicabimus, quas excellentes & efficaces habet.

Vires eius. Cap. IX.

M E R V M ac non dilutum, neq. debet neque potest intra corpus sumi: nam propter nimiam acrimoniam, ignis modo interanea, & quicquid attingit, adurit: omnia nēpe corrodit præter vitrū & pingua, veluti ceram, picem, seuum, & liquidorum etiam oleorum colorem immutat, præsertim olei Macis; cui si misceatur, sanguineum reddit colorem. Si etiam in duobus vasculis contineatur quantumvis frigidum, & repente sibi ipsi misceatur, adeo incallescit sua sponte, ut manibus vix teneri queat. In terram effusum bullit, quemadmodum etiā pura melancholia: quare etiā melancholia artificialis appellatur. Quemadmodum enim melancholia, ita etiam hoc oleū ventriculum confortat, & ad cibi appetentiam inuitat ac stimulat, frigidum ventriculum calefacit, phlegma consumit, crassos & viscosos humores incidit, colicæ ac dysentericæ opitulatur

EXTRACTIONIBVS. 411

tur, sitim ac feruorem interancorum in febribus extinguit: singultum prohibet confestim, & nauseam ac cibi abominationē auertit; sed temperandū est cum aliis quibusdam. Quare exemplum vnum atque alterum ponemus.

Aduersus Calculum.

R. Olei Macis

Olei Terebinthinæ clariss. ana guttas xij.

Aquarum Anisi

Fœniculi ana vnc. ij.

Syr. Liquiritiæ vnc. j.

Olei Vitrioli tres aut quatuor guttas.

Misce omnia optimè, & gusta: si habet acetositatem, quæ dentes non in stuporem trahat, bene est; si non est acetosa portio, instilla adhuc vnam aut alteram guttam, & consule palatum, ac propina securè.

Ad ventriculum debilem.

R. Syr. de Mentha vnc. j.

Aquæ Cinnamomi, vnc. iiij.

Olei Cinnamomi guttas ij.

Olei Vitrioli guttas iiij.

Da securè.

Ad calorem & sitim in febribus.

R. Syr. ex succo aut infusione Violarum vnc. j.

Aquarum

Aquarum Cinnamonomi vnc. j.

Hordei vnc. iij.

Olei Vitrioli guttas iij. aut iiij.

Misce, & contrahet puniceum colorem, & saporē vini austeri Cinnamonomo aromatizari.

Ex austero quomodo dulce fiat. Cap. x.

ANTEA dictū est, Austerū Vitrioli oleum duplici constare mixtura, videlicet multo alumine, & paucō sulfure. Quare cū ex austero oleo dulce extrahitur, nihil aliud sit quā quod sulfur ab alumine segregetur. Est itaque dulce Vitrioli oleum nihil aliud, quā oleum sulfuris aut ipsum sulfur in liquidam substantiam redactum: & hoc propriē oleum dici potest: est enim pingue vinctuosumque, quemadmodum ipsum sulfur quod in oleo, & non in aqua liquescit. sequitur autem modus segregationis.

Modus segregationis. Cap. xi.

RECIPE vini ardentis acerrimi & ter sublimati vnc. vj. Olei Vitrioli austeri tantundem, misce in Veneto vitro, & pone in cucurbitam parvam, angusto orificio, & optimē luto orificium claude: dimitte ita per integrum mensem aut duos. Deinde effunde in cucurbitam

bitam cui sit immediatè vi ignis agglutina-
tum & annexum alembicum, [hoc est, *ein kolb
mit einen angeschmeltzen helm*] cuius figu-
ram subiiciemus: pone deinde in paruam for-
nacem, ac dimidiā partem eius cinere obrue:
postea applica recipientem, & luto iuncturam
claudere diligenter, & extrahe vnc. vj. vini ar-
dentis, quas infudisti: vt verò tutius hoc fiat,
pone in balneum Mariæ, sic solum vinum abs-
que oleo ascendet. Cum extraxeris autem per
balneum infusas sex vnc. vini ardentis, pone
id quod residuum est, in fornacem, vt arena
mediam cucurbitæ partem attingat, ac nouo
& vacuo recipiente, eoque non magno applica-
to, luto iuncturam diligenter claudere. Accende
deinde lentū ignē, & sensim extrahe omnem
humiditatem quæ relicta est in cucurbita, do-
nec nihil humidi amplius in fundo appareat:
adhibita semper maxima cura & diligentia, vt
ignē ita modereris, ne ebulliat vsq. ad alem-
bici canalem. Nam si hunc ebullitio attigerit,
sedari non potest, nec prohiberi, quin in rece-
ptaculum egrediatur: ac totum oleum corrum-
pat; solet enim facillimè ebullire. Cum au-
tem sensim extraxeris, aufer statim recipien-
tem cum suo humore, tum videbis duo conti-
neri

neri in eo, videlicet aqueum humorem, & oleosum ac pinguem. Segregabis autē vnum ab altero statim, ita vt. nihil aqueum in oleo relinquatur, nam aqua illa perdit oleum. Solet



autem oleū ipsum plerumque aque in-
natare, maximè si
infusum prius vinū
omnino per balneū
extractū fuerit: sed
statim poteris tactu
discernere oleū ab
aqua. Oleum enim
pingue est, aqua
minimè. Segrega-
tum oleum deinde
vsi reserua.


Einen Kolb mit einem angeschmelzen
helm/ der muß man endlich auß der Glasz-
hütten bestellen zu machen / auß zerbroch-
nem Venedischem glas / oder auß Hessi-
schem glas.

Vires eius quod segregatum est. Cap. XII.

V I R E S habet quicumque & Sulfur, sed
omnia efficacius præstat, quia propter liqui-
ditatem

ditatem facilius penetrat, & ad actiones pro-
 perat, quod sulfur non potest; quia impeditur
 à soliditate & spissitudine sua, quo minus pe-
 netret. Illud verò amplius potest sulfure hoc
 oleum, quòd valeat potenter ad omnes in
 corpore putrefactiones, & præcipuè ad pestem.
 Ad educendum è pulmone in pleuritide, &
 peripneumonia, & difficili tussi, pus, & crassos
 viscososque humores: tutò enim absque omni
 periculo intra corpus sumitur. Calculum ne-
 que in renibus, neque vesica coalescere sin it,
 exulceratam vesicam sanat. Dosis eius est vna
 aut altera guttula, aut tres, in vino modico
 temperatæ. Miscetur etiam rotulis & mor-
 sellis è saccharo factis. Diligenter autem re-
 seruandum est. Nam modicum fit ex lib. j.
 austeri olei Vitrioli, & faciliè propter tenui-
 tatem partium euanescit.

F I N I S.



EPI.

EPITAPHIVM VALERII

CORDI, QUI SEPULTVS EST
Romæ in æde D. Mariæ de anima,
regione Parionis.

VALERIO Cordo Simesusio Hesso,
Euricij filio, moribus, ingenio, comitate præ-
stantiss. Doctorem omnium admirationem
merito: Qui naturæ obscuritatem & herba-
rum vires adolescens senibus explicauit: Cum
expleri cognoscendi cupiditate non posset,
perlustrata Germania, Italiam adiit, Venetia
in honore habitus, & Romam vix ingressus,
subito morbo inter amicorum lachrymas, non
recuperabili studiorum iactura, opt. ætate ex-
tinguitur, anno salut. M. D. XLIII. VII
Calend. Octobr.

Ingenio superest Cordus, mens ipsa recepta est
Calo: quod terra est, maxima Roma tenet.

APPEN-

APPENDIX ⁴¹⁷EX

SCRIPTIS D. IACOBI
SILVII MEDICI PARISIENSIS,
PRO INSTRUCTIONE PHAR-
MACOPOLARVM.

DE SINGVLORVM MEDI-
CAMENTORVM SIMPLICIVM
exacto delectu, Collectionis tempore le-
gitimo, Repositione commoda, & Dura-
tione eorum.

DE RADICIBVS.

RADICES euellenda sunt, cum medica-
mentosa sunt maximè. Quæ dos omnibus
eodem non inest tempore, sed alio alia ve-
geta magis sunt: quamquam sunt qui putent
omnes radices legendas Autumno, ubi folia de-
ciderunt: alij Veris initio, priusquam in folia aut
caulem erumpant. Omnes tamen integra sunt, si
fieri potest, vellenda. & unaquaque in solo
calonatura ipsius maximè familiari, bene ma-
trita, bene habita, non præ alimenti copia enor-
mes, neque ob inopiam strigosa, tenues, rugosa:
mox aqua lauanda, & radiculis portione quan-
dam alimenti repetentibus, & stolonibus etiam-
dum

dum trahentibus, purganda: post (nisi utenili
recentibus aliqua inceserit vel commoditas vel
necessitas) siccanda, quadam umbra & vento,
ut apij, foeniculi, iridis, & quae alia sunt vel mi-
nores, vel sicciores, vel rariores, quarum vires
sol ceu ignis promptè dissipet: quadam contraria
dictis sole & vento, vel igni siccantur si calum
est nubilum, aut hiems: & saepe versanda, ne
mucida aut putrida fiant: ut bryonia, gentiana,
mandragora, rhei pontici. Si verò siccatis citò est
opus, patella ignita impositas saepe versando sic-
cabis. Quadam item integra siccantur, ut gen-
tiana; alia in taleolas dissecta, ut iris; alia ligno-
sa matrice (sic enim cor Plantarum Gaza ex
Theophrasto vocat) adempta, ut foeniculi, pe-
troselini, apij. Deinde reponuntur loco non inso-
lato, non infumato, non humido, non pulueru-
lento, sed sublimi puro, sicco, aut septentrionem,
aut potius meridiem spectante, praesertim quan-
do hae plantae quadam adhuc humidiores re-
quirunt, modo non flectat austrus. Eadem quamdiu
vegetae adhuc sunt seruandae, paritè scilicet ac
tenuis & rare, ut asari, asparagi anno tantum
quamvis elleborus uterq. etiam triennio seruare
possit, ut magna & crassa essentia praeclata, bryo-
nia, rheon Ponticum, aristolochia, gentiana. Haec
autem

autem tria, colligendi tempus legitimum, repositio comoda, & duratio, non in radicibus solis observanda sunt, sed etiam in aliis plantarum partibus, atq. adeò quibusdam animalium aliquorum partibus, ut sanguine hircino, hepate lupi, pulmone vulpis, vesica apri. Propterea Chamapityn, chamædryn, thlaspi, centaurium, polion, hypericum, aliaq. florentia capiebat Galenus, theriacem vel aliud medicamentum compositurus, non sole æstivo siccata, neq. dum fructus eorū adhuc crudi & imperfecti sunt. Iubet idem cōtinua speculatione cognoscendū, quando fructus sunt futuri, quando eduntur, quando augentur, quando denique vigent. Quo tempore potissimū eos cōmodè decerpas, & in siccis domunculis repositas custodias, ne à solis radiis urantur, neque humiditate à tecto vel muris madescant. Ob id domo non vult subterraneas eos reponi, nec aliis vicina, neque sub regulis, sed horum media, quæ ostia meridiem spectantia habeat, prope qua tamen medicamenta ne reponas. Omnia igitur legenda, quando summæ sunt virium, & accusandi tum mercatores tum herbarij, qui radices, liquores, succos, flores, germina, fructus extra anni tempus carpūt, & in urbes conferunt. In quibusdam & astrorum obser-

uatio valere putatur. Paeonia enim radix a
epilepsiam legenda decreſcete Luna quibusdam
videtur, & Alyſſon ſub aſſu Canicula vult leg
Galenus, ut Aſchriou caneros fluuia: illes cap
contra rabiem, unde eſt herba nomen, tamquam
vis quadam illis cōtra rabiem a ſidere accedat
rabiem canibus aſſerente. Plantas item calidas
ex calidis regionibus, & ex harum editis & ſic
cis locis, ut Creta montibus, praefert Galenus.

D E H E R B I S.

QUAE prius in radicibus dicta ſunt de colle
ctione, repositione, duratione illarum, a
herbas etiam transferri poſſunt, niſi quod his fe
rè recentibus utimur quibusdā omnino, ut por
tulaca lactuca, bugloſſa, atriplice, beta, braſſica
acantho, naſturtio, helxine, mercuriali, viol
nigra, intubo, fumaria, hyoſcyamo, mādragora
& alii permultis. Quibusdam verò recentibus
utimur, quādo his mitioribus opus eſt, ut ruta
mentha, abſinthium, abrotonum, recentes mini
calent ob miſtam humiditatē excreſcentioſan
ſiccata verò calidiores ſentiuntur, & fumari
recens minus alium ſubducit magis ſicca.

Colliguntur ferè cū floribus herba, aut ſem
nibus, ſic benediſtus carduus acanthiū putatu
centaurium paruum, calaminthe, chamaedry
chama

chamapitys, daucus, fumaria, maiorana, polium, pulegium, origanum, serpyllum, thymus: aut saltem cum vigent folia magnitudine odore, colore, praesertim qua cacumini sunt propiora.

Siccantur in umbra magis, nisi si qua scapo sunt crassiore, aut folio humidiora, & ob id apto putrere. Vbi probe sunt siccata, reponuntur uti radices, sed minus diu seruari possunt, ob id quotannis mutanda.

DE FLORIBVS.

Flores ut plantarum partes reliqua legantur, cum maximè vigent, ut capparis in gemma, rosa ex pardi coepta, reliqui ferè aperti. Sed haud ita pridem & ex quibus vis nondum exhalauit, siccantur sole magis minus, pro varia ipsorum natura: quidam siccandos volunt, donec ex ponderibus decem unicum supersit. Reponuntur, ut alia: quotannis mutetur, quamuis schœnanthos etiam decennium efficax seruari possit: chamamelum item diu vegetum est ob sortem partium suarum mixturem.

Flores & omnia quae iucundum odorem efflant, arculis tiliaceis vullo situ obductis reponuntur.

DE SEMINIBVS.

Legenda sunt semina cum sunt matura, & fructus quibus includuntur maturi. Semi-

na verò quotannis mutare præstiterit, etiam si pleraque diutius seruari possint.

Ut aptè perennet, charta aut foliis aptè inuoluantur.

DE FRUCTIBVS.

Fructus ut maturi decerpantur necesse est.

DE CORTICIBVS.

Corticibus ut recondantur eximere cōuenit, cum herba suis foliis exuuntur siccantur etiā expurgata inibi, locis asperginē nō redoletibus, sed cū luto aut puluere sunt obfusa, aqua elui debēt.

DE SVCCIS.

XYΛΙς, id est, succus ex plantis totis vel plantarū partibus concisis & tuis, torculari vel manu, vel aliter expressus, aqua interdū aspersa aut vino, aut liquore alio, vel recens vsurpatur, vel vase aut loculamento aliquo reponitur. hicq; vel liquidus vel siccus. Liquidus item aut per se seruatur, ut vinum, acetum: aut misce sale, ut omphacium, oleum: aut supersus phiala oleo, ut succus rosarum, granatorum, limonium, cydoniorum, sambuci, ebuli, & similium: aut sole, vetustateve, aut igni per se siccatur, ut succus glycyrrhizæ, opor Cyrenæicus, scammonium: aut coctione cum melle, vel saccharo ad iustam crassitiem facta sole vel igni, ut in plurimi

ritus syrupis audies. Qui verò succi sine melle aut saccharo reponuntur, plurimū corrumpuntur, nisi igne diutius cocti, aut sole æstivo usque ad mediocrem crassitiem siccati fuerint. Idem temporis spatio sicciores evadunt, pluribusq; annis servati, eò siccitatis veniunt, ut balauisticis similiter lenigari possint, quales sunt succus hypocistidis, vix acerbæ, glycyrrhizæ, centaurij, & alij propè omnes. qui verò ex his lentorem quandam natura habeat, dilatantur magis quam lenigentur, nisi siccioribus multis mista horum parva portio, Portulacæ, semperniui, cotyledonis, & aliarum similiter glutinosarum succus, præ lentore nimio per se non potest exprimi, quare cum omphacio probè trita herba exprimitur, alij tritas igni lento calefaciunt: alij tritas loco frigido, ut cella vinaria, vimineo vasi impositas in catinum subiectum destillare permittunt. $\chi\lambda\delta\varsigma$ etiam, id est, succus, sæpe cum humore aliquo extractus ex partibus plantarū, ut semine psyllij cydoniorum lini, fœnograci, lentorem aut velut cremorem & mucorē significat, unde dictum est emplastrū διὰ $\chi\lambda\delta\varsigma$, id est, de glutinosiss quibusdam succis, diversum tamē ab eo quod est de mucilaginibus, ut in compositis leges.

Liquidis medicaminibus densior materia ar-

d 4

gentea,

gentea, vitrea aut cornea conuenit. Fiftilis etiam, si modo rara non sit, accommodatur, & lignea, praesertim è buxo: sed aenea uasa oculariis medicamentis liquidisq; &c.

DE LACHRYMIS.

△ Ἀγρυον, id est, lachryma, seu humor ex plāta sponte sua defluens siue in gummi aquea res concreseat siue in resina liquecat, oleagina eius substantia Arborum partibus, praesertim truncis à germinatu incisis & scarificatis, etiam resinas elicimus. Accensis autem arboribus resinosis, ut pinu, picea, larice, terebintho, reda, cedro, ex resinosa substantia igni parum siccata fit pix liquida, cui quod supernatat, pissanthum tenui consistencia & facultate est astringente, ob id cunitiem sine ulla noxa tardat, ut pissellaum, id est, pix liquida, cum oleo mista. Galenus lib. 1. comp. ph. part. Pissasphaltus autē est Muma Serapionus. Si pix iterum coctione siccetur, Falimpissa dicitur, sicca adeo ut puluerisari possit, qualis est Graca, etiā Colophonia, & Hispana, & Gallica dicta πῖσσα βέβηνα, lib. 8. comp. ph. part. & Dioscoridi probatur & Lycia. Est etiam Dioscoridi ex usdem arboribus resina liquida & sicca. Resina omnis calefacit, siccatur, tenuius est partium, magis minus.

DE

DE ANIMALIBVS ET
EORVM PARTIBVS.

S Anguis hirci quadrimi, bene habitus, aliquamdiu nutriti vino albo, fœniculo, seseli, auro, & ceteris calculum frangentibus, Augusto mense iugulati, medius effluens (nam primus enarius, postremus crassior putatur) vase vitreo receptus, tectus linteo raro, Sole siccatus, etiam cum myrrha, foliis Lauri, & similibus, calculum potenter frangere dicitur, Tralliano, Auienna & ceteris practicois.

Adipem & medullam stanneis vasis recondi conuenit.

Medulla loco sicco & edito, & Septentrionem spectanti reponitur, cum foliis lauri siccis ne putrescant, aut situm ducant, qua iniuria in locis humidis Meridiem spectantibus eis accidit: sunt qui reponant bifariam, adipum modo.

ADVLTARIA SIMPLI-
CIVM MEDICAMENTORVM.

A Cacia succo & carne prunorum agrestium representatur dolo parum malo, cum utraque viribus conueniant.

Aloës crassa partes & impura lotionem separata aqua

d 5

ta aqua

ta aqua marina & croco Mesua adulterantur, sed croci odor dolū aperit. Alij acacia, alij gummi iminiscendo adulterant, tuncq; minus est ad minima friabilis, & odor & sapor est alius.

Ambra, pulvere ligni aloës, styracis, ladani, ambra largioris moscho in aqua rosarū soluto. Sed hac manū attritu multo, cum cera, mollescit, vera non mollescit. Platearius.

Amomum, planta amemide simili, sed inodora, ex Armenia delata, seminis dissimilitudo vitium detegit.

Asphaltum, id est, bitumen pice mistū Dioscoridi, licet adulterari non posse, ut neque carpo balsamum, neque xylobalsamum, scribit Gal. lib. 1. antid.

Ærugo multis modis adulteratur Dioscoridi: sed hodie sincerior videtur, si adulteratum suspiceris, notas ex eo repete.

Æris flos limata æris scobe.

Bdelliū adulteratur gūmi, sed ita vitiatum minus est amatū, & suffitu odoratū, Dioscorid.

Balsamum, id est, opobalsamum, vitiatum terebinthina paucō opobalsamo mista, vel sine hoc croco orientali, & succo foliorum citri vel oleo nardino. De quo in opobalsamo plura leges.

Bitumē adulteratur pice, ut in Asphaltē dixi.

Casto-

Castorium variè adulteratur; vitium autem facile deprehendes attentus notis quas in vero & laudatiore Castorio diximus in partibus animalis medicamentosis.

Costus, radice prædura Helenij Comagenij, sed odor Helenij minus vehemens, neque caput tentans, & sapor minus acer, quàm costi.

Crocus misto crocomagmate tuso, flore croci, vel oleo & pulvere bersilij, ut vocant: qui fri-cando dolum detegit, vel sape sublitu & lithar-gyro vel plumbagine ad pondus augendum, utrumque minus odore vegetum est. præterea hoc est puluerulentum. Adulterati quoque croci color & odor celeriter euanescent, veri diu per-manent. Galenus primo Antidot.

Cassia odorata, corticibus capparis & radicis tamaricis mistis.

Caphura, gummi Iuniperi, sed hoc est minus odorum & durius, illa est friabilis, & odore va-lentiore. Platearius.

Garyophylli vetustate examinati, vino pul-uerem optimorum Garyophyllarū habente irri-gantur, siccantur, foris solum Garyophyllos olent, & vix ad dies decem molliores sunt integris.

Carpobalsamum adulterari semine hyperici simili, quod Petra Palæstina oppido affertur: auctor

auctor est Diosc. adulterari tamen non posse affirmat Gal. I. Antidot.

Euphorbiū lacte hadino, sarcocolla & glutini-
mitione cōspurcatur, experiētia veri est diffici-
lis: nā euphorbiū leui gustu os diu accendit, ita
ut omnia gustata euphorbiū respiciant. Idem in-
iectum igni odorem edit fastidiendum, Dioscor.

Ebur vstum (quod cur spodiū vocet vulgus,
non video) ossibus canis vstis vel albo marmore
vsto, id verò gravitate proditur, illud forma os-
sis, & linearum desiderio

Galbanum mutatur resina, farina fabarum
excorticatarum, hammoniaco, Dioscorid. ex cu-
ius notis sincerum deprehendes.

Galanga acris cypero Europaeo insipido, vel
falso, vel historta, ut vocant, radice austera: si
verò dicta radices aceto puluerem vera galan-
ga & piperis habente biduo macerentur, foris
solum galangam referant. Platearius.

Ladaniū, stercore caprino & pulvere nigro, id
autem tractando non mollescit, sed in puluerem
abit, modo ladani vetustate exuēti. Viribus pra-
tereā & odore ladani caret, quod sic vitiatū est.

Laser omne antequam siccescat, adulteratur
sagapeno, aut faba lomento: sed maleficiū depre-
henditur colore, odore, sapore, dilutione, Diosc.

Lycium

Lycium quibusdā *amurca*, *succo absinthij*, *felle tauri*: sed id à viribus *sinceri* multum recessit.

Lemniam terram sic adulterant, ut nemo veram à falsa possit secernere sic & *Lycium*, *Indicum*, & plurima alia, ut verorum nota à falsorum notis non exactè discerni possint.

Ligustici semen adulteratur semine quodam simili, quod facile gustu discernitur, amarum enim est: alij semen *fœnicule* aut *seseleos* admiscientes *Ligusticum* dolo vitiant.

Lentiscina resina, id est, *mastiche*, *thuris* & resina *pinæ nucis* mistura.

Moschus pelliculis incisis puluere carnis *columbinae* siccata, sanguine *badino*, & pane asso. Si eius certum pondus pelui madenti impositum aliquamdiu sit grauius, est legitimum; si pristinum pondus seruat, supposititium.

Manna Arabū, *saccharo* & folliculis *sennæ*.

Myrrha adulteratur gummi macerato in aqua, in qua *myrrha* maduerit, *Dioscorid.*

Nardus adulteratur *stinni*, seu *stibio* cum aqua aut *palmeo* vino inspissationis ponderisq; causa inspirato.

Nardus Celtica adulteratur imposita herba simili, quæ *birculus* ab odoris grauitate vocatur: sed herba candidior, sine cauliculo, minori-

poribus foliis, radice nec amara nec odorata, uera nardus est.

Opi omnes adulterantur addito sagapeno, ante quā inarescant, colore, edore, sapore dolus deprehenditur: & quia cum aqua vel salina non mox solvuntur adulterata, adulterantur etiam fursure & farina, præcipuè καολίας, id est, quæ ex caule defluit, quia dilutior: ζιζίας verò, i. quæ ex radice perlucidior & purior. Quamvis enim radice incisa aut caule quod effluit crassum & lentum ὀπός, id est, liquor dicitur, lib. 6. simpl.

Opium, semine lactuca agrestis.

Opopanax, hammoniaco aut cera, tunc in aqua si digitis teratur, non solvitur, nec lateſcit uti sincerum. Diosc.

Os ex corde cervi cartilaginosum, simile est maiorum animalium corde.

Opobalsamum tam variè adulterāt & astutè, ut eius adulteria etiam exercitatissimos fallant. Hæc verò adulteria inuulganda non censeo ne maligni etiam vitient à nobis edocti. Vitiatum mista unguento terebinthino, lentiscino, cypriaco, balanino, susino, metopio, melle, vel Cypriæ cera liquida: sed maleficium facile deprehenditur. Nam verus liquor in vestem lanceam fusus, maculam non facit, & post lotionem non tam

nam non relinquit, cum vitiatum inhareat. Ad-
hac merus, lac si instillatur, coagulat, & in
aqua aut lacte celerrime liquatur, & colore la-
ctescit. Alias quasdam notas apud eundem &
Simeonem, si libet, legeris potius, quam apud
barbaros hoc seculo adhuc legi solitos, profunda
hominum ignorantia, & magno mortalium in-
commodo.

Piper longum fraudulenter preparatum, est her-
ba quadam flaua, quæ à Xene assertur, aspectu
quidem, non autem gustu macropiperi similis: hac
autem aqua irrigata soluitur, natium macro-
piper insolubile permanet, Gal. lib. i. Antidoto-
rum. Piper longum verum ex Barbaria assertur:
adulteratum verò duplex est; alterum, quod in
Alexandria maxime conficitur, alterum herba
cuiusdam germen. Quod facticiū est, si per diem
totum in humore maceretur, illico liquatur ac
soluitur, lib. iij sanit. tuend. Illud fortè ex massa
subacta aqua, in qua dissolutum aut macera-
tum sit piper, & in formas effictas coniecta, post
siccata. Vidi etiam adulteratum ex germine &
velut nucamento betula & coryli.

Pastilli theriaci, ex radice pentaphylli, id est,
tormentilla Venetiis male componuntur, non ex
viperarum carnis, Hermolaus in Coroll. Massa.

Phu,

Phu, radice rusci admista vitatur, sed malificium facile deprehenditur; quia haec dura ei frangi contumax, & sine ulla odoris gratia.

Pompholyx, taurino glutine, ouillo vel maripulnone, aut grossis vel quibusdā aliis crematis.

Pentapetalon, *Pentaphyllon*, *Polium*, nihil simile habet in plantis. ob id non adulterantur.

Rha-Ponticum, radice centaurij magni. *Rhabarbarum* examinatur maceratū aqua diebus quinque, postea siccatur idem minus in crocum tingit, intus nigricat, varietatem in fractura amisit, densius est, astringit magis: ex aqua vero illa siccata trochisci fiunt regibus.

Rheon cum viget ac integrum est, valente astringit, densum est ac contractū tota substantia, tamen celeriter perforatur. Incola regionis in qua gignitur, coctione vires eius in aquam trahunt: deinde rheum siccatur, tamquam integrum sit, nec coctum, transmittunt: sed id rarius est & laxius integro, nullam aut minimam astringentem retinens. Quantum aliis notis rheon à rhabarbaro differat, alibi diximus.

Sagaperum, succo laseris & galbano, *Dioscoridum* id non liquefit, sed verum vino vel aqua affusa statim dissoluitur, Galen. lib. 1. Antid.

Sarcocolla puluerizata est suspecta adulteris.

Dioscoridum

Diosc. à quouis puluere misto, integra eligatur.

Styrax modis multis Dioscoridi adulteratur, sed dolus facile deprehenditur notis ab eo dictis.

Santala lignis aliis, rubrum bexfilio inodoro, flauum & album ligno cedrino odoratiore linguam calefaciente.

Scammonium lacte tithymali & sarcocolla, vel erui farina, tunc linguam minus valenter pungit & mordet.

Saccharum, intus faculentum aut spuma succi canna eius auctum, tunc in ore vanescit, & fractum nigricat.

Turbith gummi dissoluto quibusdam radicibus extremis illito, verum autem si frangitur, gummosum est intus.

Tamar-Indi prunis adulterati non splendent, humidiores sunt, sapore & nucleo prunorum multum à semine Tamar-Indorum diuerso.

Thus, pini resina & gummi, suffitum autem gummi flammam non edit, resina autem in fumum vanescit, thus statim ardet, odore etiam maleficium proditur.

Thuris cortex, pini aut nucis pineæ cortice hostium tamen index ignis: nam reliqui cortices suffiti, quāquam incenduntur, sine odore fumant. Thuris verò cortex ardet, & odorem fumum edit.

c

Thuris

Thuris manna, adulteratur cribrata pini resina, aut polline aut cortice thuris confuso: sed hæc igne deprehenduntur.

Hæc abunde fuerint ei, præsertim qui veras simplicium sincerorum notas, ex nostro libro simplicium primo accuratè didicerit. Nam cum rectum sui est obliqui sit index, ut initio secundum docuimus, et in uno quoque rerum genere quod perfectissimum est, idem sit simplex ac unicum. Id si cognoveris, alia ei congeneria aut etiam arte affinia nullo negotio secreveris.

SIMPLICIS ALICUIUS NOMINE ABSOLVTE SCRIPTO, QUID ACCIPIENDUM.

I AM tradamus simplicis alicuius nomine scripto absolute et sine determinatione sexus, coloris, magnitudinis, figura, loci, temporis, vel notarum probitatis aliarum, vel partis eius simplicis, radicum, foliorum, florum, seminum, &c. quòdnam sit eligendum: nam pro variis scopis varia, sed in scopos efficaciora deligimus. Quam in rem te iuvabit nostra simplicium per locos communes descriptio. Quæ enim radicibus salis sunt efficaces planta, illarum nomine radices veniunt.

miunt: quæ foliis, floribus, fructibus, seminibus, cortice, ligno, liquore, succo, gummi, sunt utiles ac medicamentosa magis, dum planta nomen effertur, partem eius usurpari solitam elige. Quum verò pluribus suis partibus ad res etiam varias valent, quibus sit opus, coniecta ex partium illarum facultate & affectus natura, & medicamento constituendi forma, ut anisi, anisum, apium, carum, cnicus, cuminum, gith, libysticum, nasturtium, psyllium, seseli, staphis agria, semine sunt præstantiora, idque solum illarum nomine intelligendum, in aliis multis similiter.

Anisum, Cretense, lib. iij. sanit. tuend.

Agnus, id est, flos eius aut semen, licet folia etiam sint utilia.

Agaricus albus & femineus.

Aloë, id est, succus eius, aloë Indica, lib. 9. simplicium in diphryge.

Alumen scilicet scissile, quia præstantissimum, lib. compos. pharm. gen. primo.

Acetum, ex vino non hydromelite vel cerenisia.

Aristolochia, pro re proposita explicanda est: rotunda enim cum multum tenuare crassum humorem, tergere ulcera, digerere ex utero; longa autem, cum mitiora hac volumus. Clematidis autem quia fragrantior in unguentis expetitur.

Amomum, *Scythicum* lib. 8. comp. phar. part.

Ammi, *Illyricum*, lib. 9. eiusdem, *Ægyptium* alij laudant.

Balsamum, opobalsamum potius intelligendum, quàm carpobalsamū aut xylobalsamum, lib. 2. comp. phar. part.

Bryonia, alba, quia efficacior, quàm nigra.

Buglossum, utrumq; foliis & flore efficacius, radice tamen non inutile.

Cassia vel *cassia* in libris Græcorū. *Cassia* *syriaca* optima & *cinnamomo* viribus & toto habitu finitima. In libris *Arabum* eadem lignea dicitur, altera verò fistula his dicta ponitur, cū medicamentum est purgatorium.

Cardamomum, maius.

Capparis, cortex radicis.

Centaurium, minus in purgantibus medicamentis: in ceteris maius dictū à facultate multiplici & efficaciore.

Calaminthe montana, quia efficacior quàm domestica.

Costus, amarus, cū subamarus & valde acer solum nominetur, dulcem tamen nescio quem *Arabes* inuenerunt.

Cypressus, id est, nuces eius in astringentibus medicamentis: lignum aut folia in diureticis.

Cinna-

Cinnamomum optimum, de quo in simplicibus abunde.

Corallium, rubrum.

Cuminum, Æthiopicum, lib. 4. sanit. tuend.

Daucus, agrestis, nam satius pastinaca est, alimentum verius, quàm medicamentum.

Elleborus, niger Mesua, quia salubrior: albus Galeno Aph. 1. lib. 5. Obserua igitur an compositio sit Arabica aut Græca. Elleborus uterque & belonium ex locis editis præstant.

Eruca, siluestris quia efficacior hortensi.

Epithymum, Atticū melancholiam ex ventriculo purgat: id in Græcis compositionibus vsurpandum; in Arabicis Arabicum.

Fœniculus, semen, sed in collyriis succus foliorum aut radicum.

Galla solida, efficacior quàm perforata.

Gummi, Arabicum, id enim omnium perfectissimum vel Plinio auctore.

Gluten, mastiche, ceteris glutinis efficacius, ut vitrum etiam glutinet, quibusdam intelligitur: aliis ichthyocolle: aliis taurocolla magis placet glutinis nomine.

Hyssopus, montanus hortensi melior, ut calaminthe montana efficacior domestica. Hyssopum Cilicium Diosc. Creticum verò Archigenes,

genes, apud Gal. lib. 8. comp. phar. part.

Hyoscyamus, albus, seu albū eius semen, quod tamen interdū exprimitur. frequentius tacetur.

Iris, radix ireos Illyrica veteribus, nūc phar-
macopolarum ignavia Florentina vsurpatur,
cū illa per Venetos facile haberi queat.

Lupinus, amarus, nam dulcis esculentus est,
ut ille amaritudine per macerationem in aqua
deposita.

Lactuca, semen, praterquā in victus ratio-
ne, ubi herba potius intelligitur.

Lapathum, oxylapathum efficacius rotundo.

Lithargyros, auri, tamen lithargyros chrysi-
tis aliquoties in lib. comp. phar. Gal. legitur.

Mastiche, Chia, lib. 7. met. & alibi passim.
Ægyptiam tamen ac recentem ob id pinguis-
simam laudat, lib. 2. ad Glaucon.

Marrubium, album præstantius nigro.

Mel, apum, alterū, æromeli seu mel ærium
& roscidum.

Margarita, solida meliores perforatis, nisi
etiam sint flaua, obscura, solidis pares.

Medulla, si nō additur cuius animalis, & va-
lens futurū est medicamentū, cernina miscenda
valentior quā vitulina, lib. 6. com. phar. part.

Nuclei, pini, olivæ, dactyli autem Avicenna.

Oleum,

Oleum, olium, ex oliis expressum.

Opium, Thebaicum, Galenus lib. 7. simpl. & post eum omnes.

Petroselinum, Macedonicum & in hoc Astreoticum, & huius semen maximè in usu est, lib. 8. comp. phar. part.

Pruna si alius deicienda est, Damascena, & Hispana seu Iberica, hodie Augustana & Cathalaunica Italis dicta, sunt multò præstatiore, vel si qua his similiter sunt pingua, dulcia. Si ad cohibendum & astringendū fit medicamentum, Damascena immatura, vel potius qua Iorana nobis dicuntur S. Iuliani & Turonica.

Papaver album semen.

Piper, album, quia acrius, & linguam magis pungit, quàm nigrum, à quo per adustionem vis exhalavit, Gal. lib. 8. simpl. sed album id maturum intellige. Nam albū ex macropipere in racemum granatim dehiscente, recens factum, minus acre, & macropiperi facultate proximum, quale apud Serapionem est accipiendum.

Pix, liquida in suppurantibus & tergentibus: sicca, in siccantibus unguentis epuloticis & glutinantibus, Galen. lib. 7. simpl.

Paeonia, mas seu eius radix vel semē, Manardus statis nostra medicus lōgè doctissimus in epistolis.

C 4

Poly-

Polypodium, quercinum vulgò usurpatur murale. & a saxis pratulerim cum Narbonensibus quibusdam, quod frequentissimum, & pro quercino omnes venditant, nisi si quando astrictione opus est, qua ratione hederam quoque quercinam nonnullis expeti audio.

Quatuor emollientia { malua
althea
viola nigra
acanthus, id est, branca vrsina

Quatuor semina { Frigida { Maiora, melonũ, cucumeris, cucurbita, citrulli.
Minora, lactuca, portulaca intubi, cichoriũ.
Calida { Maiora, cumini, carui, anisi, fœniculi.
Minora, apij, dauci, ameos, anemini.

Quinque radices vretica, apij, petrosolini, asparagi, graminis, rusci.

Resinarum primas non iniuria meruit lentiscina, id est, mastiche: inter alias verò præfertur terebinthina, quia melior quàm colophonina, & fricta dicta, aut illius loco ponitur laricea dicta, terebinthina propè similis, Galen. lib. i. comp. phar. gen. Recentioribus verò pinea intelligitur.

Ruta,

Ruta, folia ruta agrestis: Gracis verò folia ruta domestica. Illam verò & illius semen, moly, vel hesanum, vel hesasa, vel cum Syris, apud quos nascitur, Hermola ferè vocant.

Rosa, rubra recens in purgantibus: sicca in astringentibus.

Raphanius, foluestris.

Rosmarinus, folia, interdū flos, quē nescio cur hodie vulgus ἀρωγῆ .i. florem absolutè appellet.

Rhus, cortex fructus sumach dicti.

Stæchas, Stæchados Arabica flos.

Styrax, calamite: nam liquidus vulgò dictus est myrrha stacte, si verus sit.

Santalum, flauum.

Spica nardi, Indica.

Sulfur ἀπυρρον, id est, ignem non expertum seu viuum, est nobilissimum, ad quædam extinctum ceu nobis familiarius præfertur.

Σχοῖν, id est, iuncus: pro schoena anthos.

violarum

Tres flores cordiales, { buglossi
boraginis.

Thymum, Atticum, aut ex editis locis & siccis, lib. 4. sanit. tuenda.

Viola nigra seu purpurea, vulgò Martia & quadragesimalis, quòd in ea tempora flos ferè incidat,

442 SIMP. ABS. SCRIP. QUID ACCIP.

incidat, & eadem recens si haberi potest: nam
sicca inefficax.

Zizipha. i. iniuba, recentia & bene matura
aut saltē integra, nō putria aut vetustate exu-
ca, quod illis post sextum mensem ferē accidit.

Si quæ singula in singulis regionibus sunt
præstantissima & laudatissima.

Alumen, Milesium.

Agaricus, Ponticus Andromacho iuniori i
Myfi, Cyprinum. (Theriaca

Nitrum, Berenicium. Sinon, Syriacus.

Cuminum, Hispanum, alibi Æthiopicum
melius Ægyptio.

Anisum & Thymū, & alia plurima, Cretica
lib. 4. sanit. tuend. in diatrion piper. & diacala

Meon, Hispanum & Macedonicum.

Aristolochia, Pontica, & hac melior Cretica
lib. 10. comp. phar. part.

Phu, Ponticum. Castorium, Ponticum.

Daucus, Creticus, semine & radice bonus: ce-
teri solo semine.

In Dicaarchia, qua nūc vocatur Puteoli, eru-
go, cerussa, as, squama aris, & alia nōnulla. Ro-
ma argenti spuma fit optima: ex Sicilia, item
magna Libya & Creta quotannis multo præ-
stantissima Romam afferebantur.

Hucusque Siluius.

D I A

DIARIVM PHARMACORVM PARANDORVM,
ET SIMPLICIVM LEGENDORVM,

A

MATTHIA LOBELIO collectum.

IN uniuersum annum optimè instructurus officinam Myropola per dies & menses operariis, famulis & officinae caculis iniungit quæ faciendæ sunt; quia nonnulla medicamenta omni tempore parari nequeunt: quorum quidem aliqua si concinnari possent; tamen non debent, quia omnia simplicia suo tempore & in summo virium vigore (ut scitè Diosc. & Gal. docuere) colligenda, recordenda, preparanda, & aliis miscenda. Nonnulla verò quouis anni cardine, solo & celo, vel minori sumptu preparantur, & miscentur. Exemplo igitur sumpto ab iis qui opera locarunt, exordium sumemus.

I A N V A R I O.

M E N S E primo & anni primis diebus perlustranda quæ supersunt valida & integra in officina; ut vitiosa, cariola, antiquata, deprauata & putrefacta abiiciantur; ut & quæ desiderantur, inueniantur, & absumpta restituantur.

F E.

QVAECVMQVE imperata sunt mensi
Ianuario, fieri possunt hoc & sequenti mense
Et circa finem in regionibus calidis. in quibus
omnia præcocia sunt, collige Violas ad syrup
præparationē; Conseruationē siue Conditum
ad Oleū: & ad pulueres cordiales siccatas ser-
uandas; quas & tardius colligere potes vt sicci-
ores sint, & calor maior adfit ad siccandas eas
Collige item Keyri.

RADICES COLLIGENDI
T E M P V S.

Circa finem Februarij, initio Martij, & pri-
mo Vere collige radices in varios vsus, prius-
quam vis in folia erumpat.

Censuit tamē Dioscorides omnes incipien-
te foliorū defluuio esse legendas, & cælo sere-
no, cui in quibusdā Gal. Auicenna & Mesues
consentiunt, in aliis diuersa sentiunt.

M A R T I O.

RADICES quouis anni tempore colligi
possunt quæ hominum cultu & satione crebra
in omnem anni partem vegetæ incidunt: qua-
les ferè sunt hortenses alimentosæ. vt,
Apij

Apij vulgaris
Buglossi vtriusque
Betæ
Lactucæ
Intubi
Oxalydis
Raphani
Napi
Pastinacæ
Sisari
Cepæ
Porri
Allij.

Et præter has erraticæ,

Dauci
Gingidij
Caucalidis

Ari
Dracunculi
Cyclaminis
Periclymeni
Cotyledonis.

Nam hæ quin-
que vt bulbosæ quæ-
dam, aliæ etiã æsta-

te siccatis foliis plenæ sunt, & frequenter
Autumno regerminant, alimenti pinguis &
crassi copia.

Quæ verò solius naturæ sponte crescunt, aut
semel à nobis tempestiuè seruntur aut plantan-
tur, serè sunt optimæ, solo aut vere, aut (vt dixi)
autumno, paucissimæ æstate aut hieme. Quin
& hæ quas multis anni partibus communes
diximus, sunt præstantiores, cum tempestiuè
sata adoleuerunt & vigent: aliis verò temporibus
ignauiores; quâdo vt quadâ & holitoris opera
& irrigatione coguntur adolefcere sub cælo sibi
parû propitio; quale æstiuû est ac autumnale
&

& hiemale. Sic vere ipso quando primū ge-
minare incipiunt, nobis leguntur in annū

Enula	Lilium	ger
Althea	Alni nigrae ra-	Elula maior
Iris	dieis cortex	Farfara
Acorus	Hyoscyamus	Filipendula
Symphytum	Angelica vtra-	Filix
Ruscus	que	Filix florida.
Asparagus	Anonis	Gentiana
Petroselinum	Asarum	Iarus
Apiū palustre	Asclepias	Aron
Forniculum	Bistorta	Imperatoria
Bryonia	Betonica	Lepidium
Agrimonia	Buglossum	Mandragora
Meum	Carlina	Narcissus
Phu	Garyophylla-	Nymphaea
Cyperus	ra	Radix cana
Rubia que po-	Centaurium	Capnos Plin
tius autumno	maius	Rubus
Saxifraga	Chelidonium	Scrophularia
Eriogonum	utrumque	Parasites
Tormentilla	Cotyledon	Petrosel. Ma
Pentaphyllon	Cynoglossum	cedon.
Pœonia vtraq.	Dictamnus	Peucedanum
Polypodium	albus	Pimpinella
Gramen	Elleborus ni-	Pistolochia
		Pitius

PHARMACOR. PARAND. 447

Pitiufa & Rustica- Cortex rad.
 Cortex rad. nus Fraxini
 Populi Muscus arborū Cortex rad.
 Sigillū Mariæ Cort. rad. sam- Lauri.
 Orchides buci Cortices arbo-
 Raphanus syl. Rad. Ebuli. rum.

HERBAE ET FLORES.

Viola Martia ad
 Syrupum
 Conseruam } in regione temperata.
 Oleum
 & cordiales confectiones.
 Keyri.

Aquæ destillantur ex violis & herbis hieme
 vegetis, vt Aqua

Vmbilici Veneris

Mandragoræ

Semperiui

Capill. Veneris.

Adiantum omne, Asplenium, Phylliris.

In regionibus calidis Syr. ex herbis recentibus
 parari possunt, vt,

Capillorum Veneris simplex & compositus

Grana Hederae arborea

Oculi Populi.

APRI-

Quaecumque omiffa Martio mense, initio
Aprilis parari poffunt.

Keyri Primula Veris

Narciffi flores ad oleum

Gochlearia Orchides Salvia vita.

M A I O.

Quae praetermiffa funt mense Aprili, funt
initio Maij.

Destillētur herbe quae ad statū peruenierunt.

Herbae quae iam caulem produciunt, & se-
men edunt illo mense, conseruantur ad The-
riacam vel aliam compositionē. Reponantur
in altiori parte domus.

Vnguenta ex succis fiunt.

Emplastra ex succis herbarum parantur.

Conseruationes ex plantis.

Colliguntur

Abfinthij coma ad conser.

Eupatorium ad succum.

Paludapium Serides Plantago

Daphnoides Lens palustris Lupulus

Cichorium Leucoia Tamariscus

Fumaria Lichen Thlaspi semē

Genistae flores Mezerion Vinca per.

Lactuca syl. Napi semen Vinca

Bugu-

Bugulæ	succus	Pulmonaria
Asplenium	Limoniū Ger-	vtrique
Phyllitis	manicum	Rosæ
Borago	Sem. Pyrolæ	Rosmarini
Buglossum	Ophioglos-	flores
Bursæ pastoris	sum	Flor. Sábuci.

IV N I O, & initio IV L I I.

Abrotonum	Cassitha	Epithymbra
Agrimonia	Centaurium	Equisetum
Alchymilla	minus	Euphrasia
Altercum, siue	Chamædrys	Galega
Hyoscyamus	Chamæpitys	Genistæ semē
Altheæ flores	Rosæ in regio-	Gratiola
& folia	nibus tem-	Hypericum
Anethum	peratis	Hyslopum
Anthemis	Syr. Ros. cōser.	Iacobæa
vtrique	oleū, vnguē-	Labrū Vene-
Artemisia	tum, succus	Laurus (ris
Asari folia	Betonica	Lysimachia
Ballotæ	Brassica mari-	lutea
Calamintha	na	Maiorana
montana	Botrus	Marrubium
Calédulæ stil-	Branca vrsina	Marum
laticia	Cari semen	Matricaria
Cardus bene-	Coriandrum	Melissophyl-
dictus	Epithymū &	lum
	f	Men-

Mentha	res	cus & stilla
Menthastrum	Periclymini	ricia
Mercurialis	flores, & fru-	Ros solis
Millegrana	ctus, & folia.	Ruta utraque
Nepeta	Petroselinii	Sabina
Nummularia	Macedonici	Salvia
Origanum	semen	Sanicula
Papaver	Phlomos	Satureia
Rheas	Pilosella	Serpyllum
Opium	Polium	Scordium
Parietaria	Polygoni aqua	Verbena
Parthenij siue	& luccus	Veronica.
Cotulae flo.	Portulacae suc-	

I. V. L. I. O.

In regionibus temperatis quæ prætermiffæ
sunt Iunio, faciendæ.

Quæcumque Solis feruorem requirunt, pa-
randa, vt Theriaca, quæ in calidioribus regio-
nibus parari solet, Iunio mense, vbi omnia
sunt præcocia.

Parantur Trochisci Aliptræ moschatae, qui
mollescunt Ladanum & Styrax, & Soli exponantur.

Quod si quis eo tempore hæc neglexerit
aut prætermiserit, licebit aquam rosaceam ad-
dere calidè; & vi caloris liquecant; (sicut
balneo) quod melius est, quia illa longa inso-
latio exoluit vires odoratorum.

Apud nos quia semina seriùs matureſcunt,
inſolatio & fermentatio Theriaces poteſt iu-
uari & accelerari in balneo vel hypocausto.

Colligenda

Abſinthium	Lauendulę flo-	Sem. Anethi
Abrotonum	res	Morus
Ageraton	Ligustiſci ſemē	Orobùs
Coriandrum	Sem. Sefeli	Capita &
Dauci Cretici	Maſſilienſis	Sem. Papa-
ſemen	Sem. Litho-	ueris vtriuf-
Sem. Petroſe-	ſpermatis	que.
lini	Lupinus	Psyllium
Hydropiper	Sem. Maluę	Ribes
Pulegium	Flores Melilo-	Sophię ſemen
vtrumque	ti	Tanacetum.

A V G V S T O.

Quęcumque neglecta aut omiſſa ſunt præ-
cedente menſe, ſiant Auguſto.

Collig.

Altheę ſemen	Fraxini ſemen
Sem. Cataputię	Milium
Cnici ſemen	Floſ Nymphę
Cornus	Petum. Mel Peti
Cynosbatoſ fructus	Omphacium
Dauci vulgaris ſemen	Prunus ſyl.
Cucumis Elaterij	Sem. Sábuci & Ebuli
	f 2 Rham-

Rhamni Cathartici	Momordica
sem.	Scordium
Polium	Seseli Æthiopici se-
Ricinus	men.
Spica Lauendulae	Sem. Hyoscyami
Tribulus aquaticus	

SEPTEMBRI & OCTOBRI.

Antispodium e Myrto & Cydonio
 Cortices Castaneorum
 Cotonea mala Halicacabum Mespilus
 Rhamni cathartici semen
 Radices nonnullae omittae Vere nono. vt,
 Iridum, Paeoniae, Acori.

NOVEMBRI & DECEMBRI.

His duobus mensibus, Nouembri videlicet ac
 Decembri, eade erit ratio, si modo in eis conti-
 gerit eiusmodi caeli teperies, vt radices adhuc
 valida nulla vel frigoris vel niuis tempestate
 concutiantur. nam sepe iisdem mensibus con-
 tingit, vt sine vlla caeli iniuria Pharmacopaeis
 quod reliquum est radicū in hortis remanen-
 tū, aequē ac in praecedētibz, colligere liceat.

*Sequuntur & nonnulla purgantia me-
 dicamenta M. Lobelij.*

ALI-

453

ALIQVOT MEDI-
CAMENTA COMPOSITA
HABERE IN PROMPTV
OPERAEPRETIVM.

DOLUM esse si quis compositis utatur Villa-
nouanus dixit, ubi in promptu habentur sim-
plicia: Duabus tamen de causis nonnulla compo-
sita pharmaca non minus utilia quam necessaria
sunt. Prima & potissima, quotiescumq. prae-
cipientes implicati morbi, eorundemq. sauis-
sima symptomata adeo urgent, ut nova medicamenta,
magistralia vocata, repente per otium concinnare
non liceat. Secunda, quia multa comprobata, &
usu & ratione recepta compositiones fermenta-
tione egent; unde nova & optata exoritur facul-
tas; quandoquidem simplicia quouis loco, calo &
solo, ad manum esse nequeunt; ideo quo tempore
maxime vigent, in annum usum ex his compo-
sita nonnulla medicamenta preparari, permisceri
& asservari operapretiū est, ut Theriaces com-
positio, Mithridatica, Philonis antidotus, &
huiusmodi. His rationibus ductus, quia medica-
mento purgante indies utendū, aliquot tuta eaq;
paucaparmaca composita, blando nulloq; labo-
re euacuantia, singulis humoribus dicata, nobis
f 3 elegi-

elegimus; quibus diu felicissimè usi sumus, & ex duabus tribusque cōpositionibus unā fecimus, ne mole & copia cōpositionum obruamur; quæ diu in officinis asservari solita, sæpe putrēt, non sine Pharmacopœorū & agrotantium dispendio.

CHOLAGOGVM ROSATVM

CLEMENS, OMNI ÆTATI VTILE, ori, ventriculo & visceribus gratū, febribus & affectibus biliosis aptū. Respondet Electuario Rosato, & Elect. è Prunis solutiuo.

℞. Succī Rosarum rub. ℥ xv.
 Sacchari albi ℥ xxx.
 Mellis candidi despumati ℥ vj.
 Prunorum ℥ xx. quæ exhibent pulpæ solidiusculæ ℥ xvj.
 Passularum à stipitibus mundatarum ℥ xij. quarum pulpa solidiuscula est vaciarum vj.
 Pruna & Passulæ coquantur separatim ad mollitiem ex decocto sequenti, & per se-taceum cernantur.

℞. Cichorei totius
 Boraginis Acetosæ
 Polytrichi, vel Adianti
 Endiuæ } ana m. iij.

Hor.

Hordei integri m. j.

Glycyrrhizæ mundæ ℥ j. β.

Florum violarum

Boraginis ana m. j.

Anisi ℥ iij.

Fiat omniū decoctio in f. q. aquæ ad ℥ iij.

In cuius colatura coque in vase occluso Pruna
& Passulas. In residuo infunde, coque leniter

Seminis Psyllij

Quatuor seminū frigid. maiorum

Sem. Lactucæ

Oxalidis

& Porri lacæ contusorum

Dissolve G. Tragacanthi ℥ j. β.

Saccharum, Mel & Succus rosarum coquantur
ad Electuarij solidiusculi consistentiā: de-
inde pulpæ & emulsionēs seminū addan-
tur, iterumque coquantur lento admodum
igni; tum demum insperge pulveres

Cinnamomi electi ℥ β.

Santalorū rub. ℥ j. β. Santal. alborū ℥ vj.

Garyophyllorum

Surculorū vel foliorum Lentisci } ana ℥ j. β.

vel Garyophyllorum ℥ iij. ℥ j.

Macis ℥ iij.

Adde denique singulis lib. siue ℥ xij. huius

f 4

Ele-

Electuarij, Scammonij optimi ℥ j. cocti in
 ℥ j. β. Succo rosarum lento igne vel cineribus
 calidis, quemadmodum coquitur à Mesue in
 suo Elect. Rosato.

Tota compositio est librarum v. & ℥ v.
 Dosis à ℥ iij. ad ℥ iiij. v. & vj.

Si velis minus purgare, vtare minori dosi.
 medicamenta enim validiora minori dosi as-
 sumpta, debilia sunt.

EXTRACTVM MELANAGO-
 GVM SANGVINEM DEFECANS,
*& serosa excrementa euacuans, omnibus cutis
 & cuticulæ vitiis, lepræ & elephantiasi con-
 ueniens, siue à bile, siue à pituita salsa. Sple-
 neticum & Hepaticum medicamentū efficax.*

℞. Succorum Rosarum rub. defecatorum ℞ ij.

Suc. fumarie

Lupulorum

Boraginis

Pomorum dulcium

Mercurialis

Endiuie vel Cichorei

Vini albi

} ana ℞ j.

(culo occluso.

Quibus decoque sequentia in balneo oper-

℞. Po-

℞. Polypodij recentis, & adhuc viridis ē quer-
cu vel fraxino ℥ vj.

Foliorum Senæ mundatorum ℥ ix.

Summitatum & florum Thymi,
Cassithæ
& Absinthij } ana ℥ vj.

Radicū Lapathij acuti virentium
Helenij Ebuli, vel
Corticis radicum Sambuci
Corticis rad. Fraxini
& Populi nigri } ana ℥ j.℞.

Capillorū Veneris vel Polytrichi
Asplenij Chamædryos
Chamæpityos } ana m. j.℞.

Florum Chamæmeli Romani
& Cotulæ fætidaæ siue Parthenij ana m. j.

Seminis Cnici ℥ iij.

Sem. Anisi
Fœniculi } ana ℥ vj.
Carui

Contusis, infusis, decoctis, expressis &
transcolatis infunde

Agarici candidissimi & leuissimi

Hermodytylorum, &

Pulpæ Colocynthidis ana ℥ j.

Omnium Myrobalanorum ana ℥ ij.
f 5 Zingi-

Zingiberis	Cinnamomi	} ana ℥ j.
Schoenanthi	Macis	
Galangæ	Garyophyllorum	

Iterum expressis & defecatis percoquantur lento admodum igni cum mellis candidi ℥ tri-
bus ad mellis vel Electuarij liquidi crassitudi-
nem. Addendo singulis ℞. Scammonij præ-
parati vel cocti in succo Rosarū, vt antè dixi-
mus, ℥ β. pul. Gummi Arabici ℥ j. Dosis
℥ iij. ad ℥ iiij. & vj.

Extremis morbis adiciuntur vniuersæ com-
positioni

Hellebori albi
& nigri ana ℥ β.

CATHARTICVM HY- DRAGOGVM.

℞. Radicum Graminis ℥ vj.
Rad. Asari ℥ j.
Granorum Hederæ arboreæ ℥ iiij.
Garyophyllorum Galangæ tenuis
& Cinnamomi ana ℥ ij.

Coquantur ex arte, vt dixi modò, in f. q.
aquæ mulsæ, & ℞. j. vini albi, ad ℞. j. Colatu-
ræ adde Succorum rad. Iridis & Brassicæ ma-
rinæ ana ℞. β.

Succo.

Succorū Chamælēæ & densatorum, vt docui-
& Thymelææ ſumus capite de Chamæ-
lēæ, ana ꝑ iiij.

Vel eorundem vice in regionibus frigidis quę
carent vel non abundant Chamælēæ &
Thymelææ, ſume

Extracti Laurcolæ vel Gratiolæ ꝑ j.

Percoquantur igni lento cum ſacchari ꝑ j.
ab igne vbi abſtuleris, adde pulueris radicis

Mechioacæ ꝑ j. ꝑ.

Tarrari albi ꝑ ꝑ.

Macis ꝑ ij.

Datur ex aqua Graminis & mulſa à ꝑ iiij.
ad ꝑ iiij. cum pari quantitate Melanogogi.

DIACNICVM CVM CITRO

SOLVTIVVM PHLEGMAGOGVM

& Hydragogum, quartana febre affectis, vt
ſi quod aliud, vtiliſſimum. Reſpondet Dia-
carthamo & Electuario à Citro ſolutiuo
Morſpeliensium.

HÆC Compoſitio à Cnico ſiue Carthamo
nomen accepit, tamquam præcipuo agente: me-
ritò igitur ꝑ iiij. Medullæ ſeminis Cnici
cum Rondeletio legendum, pro ꝑ iiij. (vt de-
prauatè habent omnia exemplaria) cenſemus.

Ad

Ad hac Cnici semen omnium viscerum obstructiones reserat; colluviem propellit, & pituitam purgat egregie.

Recipit autē Medullæ seminis Cnici ℥ iii
vel eius loco sume seminis Cnici boni &
pleni ℥ xiiij. ℥ vj. ʒ ij.

(ex ʒ j. autem seminis habebis ḡ. vj. medullæ.

Contundatur, & fiat emulsiō ex aqua mulsa, vel iure gallinacei, vt docet Dioscor.

Conser. Corticis Citri* melle conditi ^{*ad deterfionem pituitæ}

Conser. Violarum &

Florum Boraginis ana ℥ x.

Carnis Dactylorum vino albo maceratorū ℥ j.

Pul. specierum Diatragacanthi frig. ℥ j. ʒ j.

Turbith ℥ j. ʒ vj.

Diagridij vel Scammonij ℥ j.

Zingiberis albi ʒ ij.

Hermodytylorum ʒ iiij.

Spiritus Anisi, vel

Fœniculi Cochlearia tria.

Mellis optimi despumati ℥ xij.

Sacchari albi ℥ xx.

Terenda terantur & permisceantur.

ANTI.

ANTIDOTI DIAPHOENICI

MESVAE EMENDATA DESCRIPTIO.

R. Dactylorū Cheyron, id est, è Chayero op-
pido, non Cirrhon siue fuluorum, vt malè
ex Græco vertit Ruellius, nonnullas offici-
nas secutus, ℥ xij. & β.

Macerentur vino* albo, loco tepido ad *Rondelet.
mollitiē, terantur, cernantur per cribrum.

Pinearum non penidiorum aqua hordei mun-
datarum & infusarum ℥ v.

Turbith optimi ℥ iiij. ℥ iiij.

Amygdalarū dulcium purgatarū ℥ iiij. ℥ vj.

Scammonij ℥ i. β.

Zingiberis Piperis longi

Cinnamomi Macis

Galangæ Xyloaloës

Foliorum Rutæ siccorum

Anisi Fœniculi

Dauci Cretici, vel eius lo-
co Cari semen aroma-
ticum.

} ana ℥ ij. β.

Probè trita omnia excipiantur, libris tribus
Mellis despumati ex infusione vini Dactylo-
rum & aqua Hordei, in qua post lotionem
Pinei & amygdala macerata sunt.

Tota cōpositio est ferè lib. v. & ℥ xj. Dosis
ab ℥ β. ad ℥ vj.

H I E.

462 MEDICAMENTA COMPOS.
 HIERA AROMATICA
 SIVE PILVLAE EX ALOE
 AROMATICAE.

℞. Aloës succotrine aliquoties macerate succo
 Rosarum rub. & exsiccate in clibano ℥ ii
 Agarici Trochiscati tenuissime triti ℥ ii
 Cinnamomi
 Rad. Afari
 Spicæ Nardi
 Mastiches
 Caryophyllorum
 Macis
 Galangæ
 Schœnanthi
 Xyloaloës
 Croci
 Cum Syrupo è Stœchade excipiantur.

PLURA iam non excutiemus, freti D. Ron-
 deletij Pharmaceuticam officinam mendis innu-
 meris vindicatam, tandem in publicum prodit-
 turam.

Quarenti autem Medicamentorum varia
 & comprobata genera, eiusdem Rondeletij Re-
 mediorum formula obiiciantur.

SVC

463

S V C C E D A N E A,

Q V I D P R O Q V O

V O C A N T.

AΝΤΙΣΤΑΝΤΙΑ, hoc est, Simplicia, quae aliorum facultate similium penuria supponi possunt medici consilio. Quae nomine Galeni circumferuntur, & à Paulo ad verbum propè citantur, Galeni non esse hinc liquet, quod statim ipso initio Galenum citat. Adhuc Anacardij fructus mentionē facit, qui Galeno ignoratus fuit. Postremò multa supponit absurdissima, ut loco Agarici, Euphorbium: pro Serpyllo, Potamogetona: vice Galla, sordes gymnasiorum: in locum Polypodij, radicem Chamalea aut chamaleontis: pro Polytricho, Absinthium, & alia eius generis plurima viribus dissimilia. Tamē quae recipienda magis sunt, tum ibidem, tum ex Galeni libris, tum etiam ex Arabibus utcumque proferemus: ut

P R O Aqua pluvia, supponi potest aqua fontana pura, & ab omni mistione sincera, Galenus lib. 1. comp. pharm. part. in diacodio.

Acatia, succus & caro prunorum agrestium, vel hypocistis, Auit. 2. canon.

Asaro, acori par pondus & dimidium. Carpesium

sum quoque pro asaro & cum asaro, lib. 2
compos. phar. part.

Absinthio, cum Galen. abrotenum: & econtri
pro abrotono absinthium.

Acanthij semine, lychnis, & econtrà ἀνταγό
μερον.

Acantha Arabica seu Ægyptia herba (qua su
caba Serapioni dicitur) acantha leuce no
stras eidem dicta bedegar.

Alicacabo, semen solani.

Aspaltho, pix liquida, brutia.

Æthiopica olea lachryma, lachryparam aca
cia partes duas, seu pro gummi lemnij, gummi
Arabicum.

Acoro, ad flatum & hepar ac lienem iuan
dum, cumini par pondus, & tertia pars ari
stolochia, Auicenna.

Anchusa, hyacinthus.

Arsenico, sandaracha.

Amylo, sicca farina.

Amygdalis amaris, absinthium.

Aristolochia quauis, una ex tribus aristolo
chiis, quamcumque habueris, Gal. lib. 3. comp.
phar. part.

Adipe vulpis, ursinus.

Adipe cervino, anserinus.

Alu-

Alumine, sal fossitius.

PRO Balauftio, malicorium.

Buccinis, ostrea usta.

Balsami liquore, myrrha stacte.

PRO Cinnamomo casia aut amomi duplum ad odoris gratiam, Gal. lib. 5. comp. ph. part. in dentifricio Pro Cinnamomo, duplum optima casia, vel cū Quinto medico duplum vel multum carpesii, vel certè non paucior casia, Gal. lib. 2. 3 & 8. comp. ph. part. & lib. antid. Quidam carentes Cinnamomo, in vicem eius ponunt aquale pondus ex semine cardamomi, Democrates in Cyphi, lib. 2. antidotorum Gal.

Casia, cinnamomum, Gal. lib. 2. comp. ph. part.

Casia cortice, nardus Indica vel malobathri folium, vel contrà, lib. 6. comp. ph. part.

Chamameli floribus, duplū foliorū & radicum.

Costo hodie rarissimo, pyrethri dimidiū, vel bacca cedri vel radix helenij vel ircos.

Cimolia terra, ex Cimolo una Cycladum retri-mentum ferri & mole simul attritorum.

Cardamomo maiore, minus, & contrà.

Calamintha omnis mentastrum & pulegium similia sunt facultatibus, ob id iniicem sunt antiballomena.

g

Croco,

Croco, crocomagma.

Cypero, iuniperus maior.

Cumino, semen ruta vel agni.

Clinopodio, heliotropium.

Colocynthide, semen ricini.

Capparis radice cortice, cortex radicis tamaricis vel erica.

Cicuta semine, coriandrum.

PRO Dictamno, elelisphaccus vel nepitha.

Deronico, dimidium seu dua tertia garyophyllorum, Auic.

Damaſonio, eringium.

PRO Elaterio, succus foliorum cucumeris agrestis.

Ebeno, lignum Guaiaci, & contrà. Nam quas vires hodie in ligno Guaiaci experimur, ebenus tribuit Gal lib 6. simpl.

Eupatorio Mesua, absinthij & asari ana dimidium pondus eius, ut ambo simul mista aequent pondus Eupatorii Mesua, ab eupatorio Graecorum diuersi.

PRO Folio, folium garyophylli, nardus Indica si inuenitur, casia, id est, vulgare cinnamomum, macis, Auicenna 2. canon.

Ferrum, ferrugo, squama ferri: idem propè polent, & pro se mutuò ponuntur.

Fini

Fimo palumbis, fimus columba.

Felle suillo, vel perdicis, vel piscium.

PRO Gentiana, asari, & radice capparis ana
dimidium.

Gongilide, heliotropium.

Glycyrrhiza succo, aequaleradicis eius. Andro.in
arter. 15. apud Gal. lib. 7. comp. ph. part.

Gnidio cocco, semen lathyridis, & contra.

Galbano, sagapenum.

PRO Hammoniaco, propolis.

Hermodactylo, in doloribus iuncturarum folia
Anchusa & dimidium Bdellij.

Hedera gummi, gummi Persici.

Hyacintho, flos Isatidis.

PRO Iride Illyrico, helenium odoratum.

PRO Lapide lasio, lapis gagates.

Lapide magnete, lapis Phrygius.

Lapide Phrygio, pyrites lapis vel argyrites.

Libystico, semen staphylini, idest, pastinaca, pra-
sertim agrestis.

Lepore marino, cancer fluuiatilis.

Lanaria radice, radix veratri nigri.

Lycio, succus radice centaurij magni, lib. 7. simp.

alijsuccus baccarūpericlymini, auctor libelli

Dynamenon, Galeno male adscripti.

RO Melle, mel aërium vel saccharum.

Malobathro, casia, vel nardus Indica.

Myrrha Troglodytica, calamus odoratus.

Myrrha, Smyrniū, & contrā. Diosc. in Smyrni

PRO Nasturtij semine, folia eius sicca.

Nuce moschata, par spica.

Nardo Syriaca, iuncus odoratus.

PRO Opopanace, hammoniā, vel galbanum
vel sagapenum, vel bdellium, lib. 2. ad Glau
conem in curando scirrho. (di

Ocimo garyophyllato, melissa in affectibus co

Oleo Laurino. pix liquida, licet illo inferior, v

oleum cedrinum, vel cicinum, vel vetus, v

oleum ex lucerna cum Hera, Gal. lib. 1. com

ph. part. vel coctum (sic enim tenuius fit, &

veteri ac cicino simile) vel sordes lucerna

rum luti crassitie, ibidem.

Oleo rosato, violatum, nymphaea, amygdalinum

autem loco rosacei boni, id est, ex multis ros

cum oleo omphacino insulso facti, lib. 3. com

phar. part. initio.

Oleo ricinino seu cicino, raphaninum.

Opebalsamo, opocarpasum Gal. vel myrrh

acte, vel liquor myrti.

Oryza, hordei farina.

Oesyppo, medulla ceruina.

Omphacio, succus rhois, vel vinum austerum.

PRO

P R O Pipere longo, album: pro albo, nigrum optimum, id est, grauissimum, & contrà, 4. sanit. tuend.

Periclymeni fructus drachmis tribus, radicis eiusdem drachma tres, lib. 9. comp. phar. part.

Phoenicobalanorum pinguium carnis drachmis tribus, palmula seu daëtyli tres, aut sex, Gal. lib. 7. comp. phar. part. in arteriac. 15. Andromachi.

Psyllio, lens palustris.

Petroselino Macedonico in Theriaca, alterius regionis petroselinum, Galen. lib. 1. Antid.

P R O Resina fricta, pix, aut pix brutia, Galen. lib. 9. comp. phar. part.

Rubigine, scoria ferri.

Raphani seminis drachmis decem, succi eiusdem cyathus unus, Gal. lib. 9. comp. phar. part.

Rosis, flos rosarum, vel contrà, Gal. lib. 6. comp. phar. part.

Rhoë coriario, rhus obsoniorum, & contrà, Gal. lib. 6. comp. phar. part.

P R O Staphide agria, pyrethrum.

Spodio Gracorum, cinis super fornacem aurariam inuentus melior quàm abur vstū, quod nescio cur hodie Barbari spodium vocent.

Styrace, castorium.

Sale Indo, saccharum candefactum.

Sagapeno, gummi cedri, hammoniacum, resina picea sicca.

Spuma nitri, nitrum molle vel aphronitrum,
Gal. lib. 3. comp. phar. part.

Sulfure viuo, flauum vel vstum & purgatum.

Satyrio, semen eruce, vel scincus, vel contra.

Sinapi, cardamomum vel cardamum.

Scammonio, ricinus.

Stibio contuso, squama aris, stannum vstum.

Sapia offe, pumex.

Serapiade, peonia radix.

Scilla, bulbis.

Struthio in sternutamentis elleborus albus.

PRO Terebinthina, larix dicta resina, ei prope-
modum similis Gal. 1 lib. comp. phar. gen.

Thapsia succo, chamaleontis nigri succus, vel
nasturtium, vel nasturtij aut eruce seminis
pendus equale, licet illa sint multo inferiora
thapsia, Gal. lib. 1. comp. phar. part.

Tamaricis succo, succus sambuci, Gal. lib. 9.
comp. phar. part.

PRO Veratro albo, nigrum.

Visco quercino, chamaleon niger.

Vino Falerno, aliud quoduis colore fuluum sub-
stantia tenue, ut perluceat, & sit odorum ve-
hemens

hementer, ut Aruifum ex Chio. Lesbium ex
Mitylene, Cresso, Methymna, & Imolites;
Gal. lib. I. comp. phar. gen.

PRO Zedoaria, aristolochia.

Zingibere, pyrethrum.

Αὐτὴ καὶ οὐρα, vel horum aliqua vel alia,
potest quauis regio noua, desideratis facultate
affinia facere, doctorum medicorum cōsilio: nam
si Arabibus & Gracis pro sinapi Cardamomum
forte ipsis frequentius licet substituere, quāni
pro cardamomo frequentissimum nobis sinapi
vsurpabimus: praesertim cūm ut pro cinnamo-
mo casiam, sic contrā pro casia cinnamomum
assumi probauimus: idemq; in aliis faciendum
puto. Ob id Galenus lib. 7. simplicium, melisso-
phyllum (inquit) marrubio facultate simile, sed
ipso multo imbecillius, ob id melissophyllo utitur
neme. Nam absurdum fuerit, praesente ubique
terrarum magno marrubij prouentu, uti melis-
sophyllo. Si cui verò ad manum non fuerit mar-
rubium, melissophyllo uti poterit, obseruata eius
pra illo imbecillitate, ut ob id quantitas eius au-
geatur. hac Gal. qua ratione pro cinnamomo du-
plum casiae optimè miscemus medicamentis, ut
quantitate qualitatis imbecillitatē redimamus.

Qua igitur apud singulas gētes sunt copiosa,

§ 4

modò

modo sint facultate proxima his qua desiderantur, quia faciliora sunt paratu, ponantur, ut in Asia in frigidis capitis affectibus, aut in declinatione calidorum, rustici cedrio dicto utuntur: eius panuria pisselao, id est, pice & oleo mistis liquida forma: interdum etiam cedrio & pisselao simul magis & minus mistis, prout vires eius intendere student: hoc autem linunt sinciput, nares, frontem, aures, & quibusdam plantam & sedem, Gal. lib. 2. comp. phar. part.

Sed videmur Antiballomenis non egere, qui magna cura iam simplicia generis omnis in promptu habeamus: imò maxime egemus, cum multa simplicia veteribus laudatissima (ut Theriaces compositio docebit) hodie nobis parum sint cognita. Qua ubi ceria erunt, his utendum potius quam antiballomenis. Ut enim plaris est equo domini oculus, quam equisonis industria; plaris agro domini vestigium, quam villici stercorisatio; plaris familia paterfamilias, quam procurator; plaris prator, consul, rex, pastor, quam proprator, proconsul, prorox, mercenarius: sic plus tribuendum puto his qua maiores magno delectis & ratione optima in compositiones caoptauerunt, quam qua illorum loco coacti adoptamus. Hac haecenus ex Iacobo Siluio.

P E.

P E T R V S C O V D E B. ⁴⁷³

P H A R M A C O P O E O.

L I B E L L U M hūc, Pharmacopœe can-
dide, denuò percurrissem, atq. exactius
ruminassem, loca agrotata reliqua leniendo,
ac nubila scholiis illustrando, extremam illi
manum adhibens; nisi otium, opusculi angu-
stia, typographi quæque commoda occasio,
atq. immatura quodammodo frugis extor-
sio, perorare me, atque vela ventis commit-
tere coëgissent. Omnia itaque hæc, cum obiter
saltem, ex tempore, & tamquam ex trans-
cursu tibi tradantur (etenim ne tantillum
quidem à Pharmacopœo vestra farina homi-
ne, cuius tamen propriè muneris est, hæte-
nus nostro seculo produsse cognoscitis) æquo
sunt consulenda animo, dum meliora dare
Deus permiserit.

F I N I S.

G S

D E

DE SVCCEDANEIS
LOBELII, IMITATIONE
RONDELETTII, E CVIVS FRA-
GMENTIS ET PRAELECTIONIBVS
HABCFERE DECERPTA SVNT.

CVM attentiore lectione animadvertis-
sem vulgatum Succedaneorū libellum,
quem nonnulli Galeno, alij Paulo acceptum
ferunt, scatere mendis, & plerisque locis mu-
tilum esse; utpote qui ex Græco in Arabicum,
& de Arabico sit denuo Latine versus, aut po-
tius peruersus, à Mauro quopiam, vel Mauro-
græco, qualis fuit & Actuarius: visum fuit,
quæcumque Dioscorides, Galenus, Aëtius atq.
Paulus litteris mādassent, experimentaq. tum
veterum tum recentiorum confirmassent, seli-
gere; eaque sic digerere, ut quid alteri cuius
æquipolleat, studiosis in posterum patēret.

Hunc autem libellum neoterici cuiuspiam
esse, vel id plus satis arguit, quòd nonnulla ad-
dita inibi sint quæ Galeni tempore ignota fue-
re, uti Anacardia, aliaque complura: nullo ta-
men ordine aut delectu, ac sine iudicio. Ut,
quòd fortè Chamæmelini legerant alicubi,
nominis decepti affinitate, Melinum subdide-
runt;

runt; quàm in scitè, nullus est qui id ignoret: illud enim laxat & moderatè calfacit, hoc verò refrigerat astringitque. Eadem ineptia, quòd fortè Cephæam Portulacæ similem legissent, illius vires huius facultatibus responsuras putarunt. Itidē leporem fluuiatilem cancri loco vsurpari; vel, vt alius quispiam correxit, marinum, indoctè, vt qui ignorasse videatur cancrum alimentū & antipharmacum esse; leporem verò vel odore solo vomitorium & venenū. Nec hoc falsum solummodò, at & discriminis plenū, cū loco Opobalsami Opocarpation substituunt, quod venenū frigidum est Dioscoridi, vinoque, vti Cicuta, expugnādum, teste Gal. lib. De antidotis. Verū si hīc Carpasōn legamus, vera fuerit lectio, est enim tenuium partium. Cinnamomo item Behen rubrum responderē nequit. Neque placet ordo seriesq. collationum: nam olea oleis, non resinis aut aquis sunt conferenda; vt, quoad eius fieri potest, sint simillima. Deinde si non licet ex specie proxima, saltem è genere, cū abundemus probis remediis. Nec parui facio regionū vbi nascuntur proprietates, veluti Creticarum plantarum, quas Italicis efficaciores puto; nisi squalida admodum fuerit æstas: tum enim

enim Polium Italicum aut Stœchas non cedunt Cretico aut è Stœchadibus insulis.

Imperitiæ fatuæ est, substituenda præcipere rarioribus inuentu, ea quibus caremus, aut adulterata, vt loco cinnamomi, amomum. Insaniæ itidem, vbi abundamus lactuca, opocarparum optare. Licuerit tamē, si qua sint rarius obuia aut minus trita, eorum loco vsurpare viribus similia, vti Terebinthinę verę loco, Lentiscum, qui frequentior & feracior est.

Cum autem succedaneis vti non rarò cogamur, nec enim omne fert omnia solum, nec vbiuis medicamēta opportuna occurrunt, (ruri enim *ἐν τοῖς οἰοῖς* vtendum; & cum medicamenta necessaria ad repentinos casus ad manum minimè sint, præsentibus vtendum) eligenda erunt quæ nostris simplicibus substitui possunt, vt Galenum fecisse legimus, cui Euphorbium cum ad spicula, aculeos & infixæ eximenda deesset, ex alueariis Propoli pro Euphorbio felici successu vsurpauit.

Succedancorum verò vsus hodie magis est necessarius quàm vmquam fuit; cum multis quæ antiquis in regionibus suis exortiuis & exoticis diues & vber prouentus sufficiebat, hodie careamus, tum suppositicia Hebræorum
&

& mercatorū vafro ingenio adulterata transfuehantur; quæ si reiicienda, alia fubftituere neceffe eft. Adhæc pleraq. prifca fimplicia medicamēta exoleta, antiquitū notiffima & vfi-
tatiffima, hodie ignorantur.

Permultæ Arabibus excogitatæ & vtilis in-
uentæ compositiones, efficaciffimæq. remedia
in vsum recepta, quorū fimplicia barbarie vo-
cum nobis prorfus ignota funt. Quid enim
nominibus illis barbaris fignificare voluerint,
nefcimus; aut illis caremus. At in fuccedaneo-
rum delectu & vfu, peffima illa medicorū con-
fuetudo meritò reiicienda, quæ iam à multis
annis inualuit, magno ægrotantium incōmo-
do; qua in compositione remediorum omnia
quæ commendata funt vel ad morbum, vel ad
partem affectam, vel aliquod fymptoma, con-
gerunt temere; & cū omnia fimilia vfurpa-
runt, haud habent amplius quod pro ea herba
aut medicamēto fubftitui poffit. Quod fi vna,
duabus, vel tribus herbis contenti effent; num-
quam fuccedaneo deftitueretur pharmaca-
rius. Sin autem quantitas neceffaria foret, pro
manipulo adde duos, pro duobus tres vel qua-
tuor. Hinc duo confequentur cōmoda; certior
medicamenti operatio, facilior & citiffima
præ-

præparatio; pluribus remediis & succedaneis summo artis Medicæ ornamēto abundabit medicus, cui iterare, immutare, supponere pharmacæ licebit, & plura quàm vulgus Medicorum & Clinicæ sapere. Vt si in suo decocto Boraginē præscribat; ea si defuerit, Buglossum agreste substituet, vel contrà: si Scariola defit, succum substituere vel syrupum licebit: si Cichorium, Dens leonis, vel Endiurâ: si Chamæpitys, Chamædrys substituatur, si defit, vel contrà. Sed quid faciet, si omnia congerantur in vno eodemq. medicamento? certè nihil aliud erit, quàm poëticum illud chaos,
Rudis indigestaque moles.

Illud Villanouani ante oculos voluant, vbi in promptu habentur simplicia, dolum esse si quis compositis vtatur.

A praua igitur consuetudine recedant, & illos tamquam scopulos vitent: caueant item malos, auaros, improbos, indoctos & impudentes pharmacarios, qui nummi & lucri rapaces, farraginem medicamentorum etiam semiputridorum collaudant. Quidam hoc faciunt vt copiam ostentent, vel ignorantia, vel superbia; & aliqui docti, ne videantur in remedium cognitione minus exercitati.

Por-

Porro cum sint quædã compositiones vtilis
priscis medicis excogitatę, experiętia & ratio-
ne receptę & cõprobatę, nonnulla succedanea
inuestigare, agnoscere, & sufficere oportet, vt
parari possint nobilissima pharmaca, quę ea
ratione minimę excludenda & reiicienda: cum
non tanta infelicitate succedanea quædã illis
non inferiora interdum æquę bene expleant
omnes pollicitationes genuini medicamenti.

SUCCEDANEA. QUANTVM FIERI
potest, eiusdem sint generis
& speciei.

Rondelet. Herba pro herba.
Radix pro radice.
Flos pro flore.
Semen pro semine.
Succus pro succo.
Lachryma pro lachryma.
Resina pro resina.
Muccago pro mucagine.
Metallum pro metallo.
Lapis pro lapide.
Terra pro terra.
Pix pro pice:
Axungia pro axungia.

Medulla

Medulla pro medulla.

Auis pro aue.

Serpens pro serpente.

Pars animalis pro parte.

COMPOSITIO PRO COM-
POSITIONE.

Puluis pro puluere.

Trochiscus pro Trochisco.

Opiata pro opiata.

Electuarium pro electuario.

Pilulæ pro pilulis.

Eclegma pro eclegmate.

Tabella pro tabella.

Confectio pro confectioe.

Conseruatio pro conseruatione.

Syrupus pro syrupo.

Emplastrum pro emplastro.

Oleum pro oleo; siue simplex, siue
compositum.

Vnguentum pro vnguento.

THEO.

IMITATIONE RONDELETII. 481
THEOREMA VNIVERSALE
VEL COMMUNE.

Medicamentum quod substitui debet, siue in- ternis, siue ex- ternis conueni- re debet	{	viribus occultis, mani- festis, & consisten- tia. Sit etiam simile in Sapore, Odore, Ætate, Natalitiis & regione Natura & tēperamento.
--	---	--

Nonnulla in externis remediis supponun-
tur; quibus in internis vti non licet: vt suc-
cus Carpathi substitui potest pro Lactucæ suc-
co in externis: cū tamen venenum sit, non
introsumitur.

Non totum simplex; sed aliquæ partes sub-
stituuntur.

vt Muccago seminis Psyllij pro muccagine
seminis Cydoniorum: non totum semen, quia
pars interior temperamento differt à mucca-
gine, & venenata putatur. Neque etiā Cydo-
nium malum conuenit pro semine suo; quia
viribus & consistentia differt.

h

For-

Formulæ quædam in quibusdam remediis sibi mutuo succedunt. vt

Conseruatio, pro syrupo eiusdem simplicis fructus, floris, vel radicis.

Conseruatio Capillorum Veneris, pro syrupo in opiata substitui potest: Sed in syrapi consistencia non potest; quia remedij formulæ non patitur.

Pro liquidis liquida substitui debent: quare deficiente syrupo, aqua vel herbæ decoctum substituatur.

In quibusdam conditis supponere licet syrupum Conseruationis; quia in syrupo conseruantur. Vt syr. Conseruationis Citri, pro syrupo è corticibus Citri. Syr. Conseruationis radicis Buglossi, pro syrupo de Buglossio.

Emplastris item pro vnguentis vti licet; & contrà, modò pars affecta assentiatur. vt Emplastro filij Zachariæ, pro vnguento Resumptiuo; & Resumptiuo pro emplastro. In thoracis verò affectibus, nisi dissoluatur aut malaxetur, nō vtendū, quia emplastra imposita dilatationem costarū & respirationē impediunt.

Emplastrum è Cerusa, pro vnguento albo, nisi inflammatio prohibeat; quæ neque dura neque graua ferre potest.

V A R I A

IMITATIONE RONDELETII. 483
V A R I A A L I A M E D I C A -
M E N T A P R O A L I I S S V B -

*stituere licet, modò vires
correspondeant.*

Pilulæ pro confectionibus: & Confectiones
pro pilulis. vt

Hiera simplex pro pilulis de Hiera & Be-
nedicta; & contrà.

Et pro pilulis pituitosis; Electuarium Dia-
carthami; de Citro solutium.

Pro biliosis, Electuariū de succo Rosarum,
& contrà, obseruata cuiusq. quantitate. Hieræ
& similiū Electuariorū doses augendæ, ob mel-
lis molem, quæ medicamenti vires minuit.

Syrupus pro eclegmate, si lambendo assumi
debeat, vt

Syr. Iuiubarum pro Lohoch sano & experto.

Syr. è Papauere, pro Diacodio.

Puluis pro trochisco, & contrà, vt

Diarrhodon pro trochiscis diarrhodon.

Trochisci de Squilla, pro eclegmate de
Squilla, aucta vel imminuta quantitate pro
ratione, indicatione morbi, & scopo medici.

In simplicibus partes aliquando religiosè
non obseruantur.

vt Turbith pro Agarico trochiscato, & contrà.

h 2

Hic

Hic simplex pro composito ponitur, vel compositum pro simplici.

pro Agarico Colocynthis in minori quantitate. Carthami duplum & triplum pro Agarico, & contrà.

Difficile tamen inuentu simplex medicamentum substituendū, quod verè vndeque omniq̃ue ex parte conueniat, vt testatur Auicennas in suo canone; vbi vix reperies duo simplicia medicamenta, aliorum facultate similium pænuria, substitui tutò possint. Quod cum difficillimum foret, ille aliquando duo, interdum tria, pari pondere & mensura, nonnumquã duplicato & triplicato, addita quinta aut octaua parte alterius medicamenti, supponit. Quia paucissima sunt medicamenta quæ omnino simile temperamentum obrineant, aut eandem cōsistentiam, crassitiem, tenuitatem partium, & proprietates occultas.

Variis in compositionibus est medicamentorum vsus.

Vel ob calorem, frigus, humiditatem, siccitatem; in principio primi, in medio & primo gradus, & sic de aliis.

Vel ob partium tenuitatem, vel crassitiem, lentorem, saporem, odorem, colorē: quare id
quod

quod tēperamento respōdet, sēpe dissidet crassitie vel tenuitate pattiū; vel alia facultate. vt pro Asaro Acorum substituendum censent. At in omni operatione nō conuenit. non enim omnia potest Acorus quæ Asarum. Vrinas quidem & menses ciet: (quare in vreticis tantū supponendum) vomitum verò excitare, aquasque educere, vti Asarum, minimè valet.

Eadem ratione Hyacinthus pro Anchusa substituitur: Sed si ob colorē Anchusa opus sit, vt in vnguentis, Hyacinthus non conueniet.

Eius verò loco Lacca supponitur, vel Brasilia, Santala rubra, Lacca pictorum, vel Coccus baphica.

Assa dulcis pro fœtida nō cōceditur propter odorem, vt Auicennas substituit, in affectibus vteri, quia odore iucundo vterum sursum alliceret: sequitur enim odorata, fugit fœtida.

Propter saporem quædam vsurpantur; sed non conueniunt vnde quaque.

Pro Saccharo Mel & Manna substitui poterit in quibusdam remediorum formulis, vt in medicamentis laxantibus; minimè autem in adstringentibus, quia Manna ventrem soluit magis quàm Saccharum vel Mel.

Muccus utilis est in fluxu sanguinis, & ob

h 3

lento-

lentorem vsurpatur Fœnumgrēcū, quod muc-
caginem reddit, sed calidā: ideo in sputo san-
guinis reicienda, quemadmodum in externis
remediis, vt Ophthalmia, in qua oui albumen
præfertur quidem in principio & incremen-
to, in statu verò & declinatione muccago Fœ-
nigræci commendatur.

Quæ supponuntur, non in omni formula
remedij substituuntur.

vt Myrrha pro Bdellio in pilulis & vnguentis.

Sed in pilulis è bdellio nullo modo cōcedi-
tur, quia sanguinis fluorem & hæmorrhoida-
rum, vt menses Myrrha, elicit.

In substitutis igitur hæc obseruare oportet,
vt suppositicium in locum adulterari genuini
pænuria; eadem efficiat quod ipsum genui-
num præstabat.

Vt si calfaciebat, refrigerabat, humectabat
vel siccabat, adstringebat vel laxabat, vel con-
coquebat.

Pro Absinthio simpliciter dicto in cōpositio-
nibus Græcorū, Seriphium vel Santonicum.

Pro Absinthio è Ponto vel Tauro monte,
Romanum.

Pro Romano, illius loci vbi habitas.

Hoc licet in omnium herbarū delectu præ-
stare,

stare, quæ sunt alicuius regionis; modò illam ipsam herbam regionis finitimæ, vel saltem simillimæ assumas. Cuiusmodi est *Craux* vulgò Gallo-provinciæ, siue Creta, vbi Thymus nostras angustifolius & Epithymus optima & copiosissima.

Secundo loco herbæ regionū humidarum, modò æstas squalida fuerit, in locum calidarum substitui possunt. Quod fecisse Galenus docet in præparatione Theriaces.

Pro Macedonico Petroselino, Petroselinum alterius regionis.

Sed regionis similitudinem obseruare oportet. nam regio auget vel minuit medicamenti efficaciam & bonitatem.

Pro Iride Illyrica, Venetam sumemus. & Pro Africana, Florentinam.

R A D I C E S.

pro { Rhapontico, Radix Centaurij maioris, vel nostri Rhabarbari magna, siue Rhabarbarum ad alios vsus prius infusum & expressum. Rhabarbarum torrefactū improbatum à multis propter empyreuma.

Zingibere; Costus, & contrà, vel Helenium, vel Pyrethrum.

h 4

Costo;

(Costo; Pyrethrum.

Aristolochia longa; Rotunda, & contrà;
vel vna pro omnibus.

Acoro, Calamus aromaticus Officina-
rum, & contrà.

Acoro in laxantibus & cientibus vrinas
& menses; Radix Asari.

Asaro, quando purgare & vomitū ciere
opus est; Elleborus, Semen genistæ &
Raphani, vel hæc tria simul.

Galanga; Cyperus rotundus; & contrà.

Calamo odorato Libani; Schœnâthum;
calamus siue Acorus officinarum: si
ad odorem solum; Santalum citrinum
officinarum.

pro

Althæa; radix maluæ hortensis, vel syl.

Asparago altili; Corruda imminuta
quantitate, quia acrior & efficacior.

Rusco; Radix Asparagi, & contrà.

Cortice radicis Capparis; Cortex radicis
Tamarisci, Sambuci, Ebuli, Populi
& Lauri.

Apij; Petroselini, vel Macedonici.

Gentiana; medietas Asari & radicis
Capparis.

Turbith; Thapsiæ radix, siue Turbith
Mesuæ.

{ Mesuc, Agaricus trochiscatus, vel Co-
 locynthis minore dosi.
 Zingibere, Mechin.
 Serpentaria, Iarus, Dracunculus.
 Lapatho, Oxalydis radix.
 Rhabarbaro ad laxandum, succus Ro-
 pro { sarum.
 Rhabarbaro ad adstringendum; Hydro-
 lapathi radix, vel Galangæ maioris,
 si calore opus est; si refrigeratione, ra-
 dix Bistortæ.
 Nardo, Nardi species.
 Secacul, radix pastinacæ marinæ.

S V C C E D A N E A Q V A N T V M

FIERI POTEST SINT SIMILIA

*omni ex parte, viribus, genere,
 & specie. ut,*

Omnes Dauci	Abrotoni,	Brassicæ,
Species,	Sideritidis,	Calaminthæ,
Intubi,	Aconiti,	Cepæ,
Adianti,	Veratri,	Chelidoniij.
Condrillæ,	Anagallidis,	Costi,
Hierachij,	Anchusæ,	Nardi,
Rumicis,	Anemones,	Betæ,
Absinthij,	Asparagi,	Bliti,
		h s Iu-

Iuniperi,	Marrubij,	Aristolochiæ,
Sabinæ,	Leucoij,	Valerianæ,
Cedri,	Orcheos,	Bituminis,
Rhāni Diosc.	Maluæ,	Picis Resinæ,
Myrti,	Polygoni ma-	Allij,
Piperis,	ris & femine	Porri,
Cyclaminis,	Symphyti,	Plantaginis,
Ranunculi,	Tribuli,	Panacis,
Hederæ, exce-	Rubi,	Pastinacæ,
pta Hederu-	Equiseti,	Lychnidis,
la terrestri.	Vrticæ,	Conisæ,
Rutæ,	Tithymalorū,	Nymphææ,
Seseli,	Mercurialis,	Anthemidis,
Apij,	Heliotropij,	Verbasci.
Rosmarini,	Origani,	

Et denique omnes, nisi quid proditum inhibeat, vt de Clematide; quarum altera vrere, ventrem laxare, bilem, pituitam trahere scribit Diosc.

Prior verò alui profluua & dysenterias sedat.

Sic eucumis agrestis, & satiuus: pepo & colocynthis. sed hæc paucis euenire solent.

De partibus etiam obseruandū. nam aliquæ facultatibus differūt, vt Radix mediij menses decocta sistit per aliquot dies sumpta. Semen autem

autem in vino sumptum menstrua pellit.

Iuniperi fructus introsumentur; ramenta
verò occidere produntur.

Coriandri herbæ succus interficere credi-
tur: semen verò medicatum.

Qua ratione medicos minimè vniuersali-
bus, sed potius particularibus niti præstaret:
Nam eorum plerumque est maxima differen-
tia quæ eadem esse putantur.

Sume igitur

Pro folio Indo & Malabathro, folia Citri,
Canellæ vel Malabathri vulgaris.

Pro foliis Lauri; Citri folia.

Papaueris albi; Solani folia; Papaueris nigri
minore quâtitate, vel folia Hyoscyami albi.

Lactuca; Scariolam, & contrâ.

Cichorio syluestri; Dentem leonis.

Pro Dictamni prima specie; secundam, ter-
tiam, vel pulegium.

Calamentha montana prima; secundam, &
tertiam. Sic de similibus.

Chamæpity; Chamædryn, & folia Eupatorii.

Malua syluestri; horrensæ.

Malua arborescente; Althæam.

Thlaspi; Nasturtium.

Mentha; Balsamitam.

Pulegio

Pulegio Regali; Ceruinum, & contrà.

Lepidio Pauli Æginetæ; Drabam, vel Iberida, vel Nasturtium.

Phyllitide; Asplenium siue Scolopendrium, Ceteráchve, & contrà.

Foliis Oleæ vel Lentisci	} Folia	nucum Iuglandis,
		Cupressi,
		Pini, vel Pinastris.

Foliis Myrti	} Baccas Myrti, vel Iuglandis nucs imaturas.

Thymo; Saturciam, vel Origanum.

Ruta syl. Rutam domesticam siccata maiori quantitate; vel contrà.

Spica Lauēdula; Lauendule species hortenses.

Adianto; Saluiam vitā, Polytrichum, Adiantum nigrum Plin.

Telephio; Portulacam.

Portulaca; Umbilicum Veneris.

Foliis Terebinthi; Lentisci folia.

Myrto alba; nigram, & contrà.

Foliis Myrti; folia Pyri siluestris, Sumachi, Lentisci, Cotinos, Sorbi, Cydoniorum.

Foliis Oleastris; Oleæ folia.

Foliis Sambuci; Ebuli, & contrà.

Beto-

Betonica; Verbenacam.

Melissā; Marrubiū, & contrā: Corticem Citri.

Apio mōtano; domesticū siccū in maiori dosi.

Cepea; Portulacam.

Nardo montana; Nardum Gallicam.

Philyreæ foliis; Oleæ folia, & contrā. (trā.

Foliis Caprifici; Ficus domesticę folia, & con-

Thymbra; Thymum vel Serpyllum.

Coriandri foliis; Petroselinum hortensis folia, in
externis remediis tantum.

Hypomarathro altero; Coriandrum vel Petro-
selinum domesticum.

Foliis Dauci; pastinacę agrestis vel domesti-
cę folia.

Conisa prima, secundam.

Conisa secunda; tertiam maiori quantitate &
siccata. (trā.

Sanguinalis feminę foliis; folia maris, & con-

Hippuride prima; secundam, & contrā.

Semperuiuo maiore; paruum Vmbilicum
Veneris, & contrā.

Foliis Labruscę; domesticę vitis folia minus
cultę.

Chamælęa; Thymelęam, Chamępityn pri-
mam Diosc. Laureolam.

Alfinę foliis; Helxines folia, & contrā.

Vite

Vite alba; nigram, & contrà.

Bubonio, siue Inguinaria, siue Atere Attico;

Antirrhinum, & contrà.

Foliis Sabinæ; folia Cupressi, Iuniperi,
Cassiam.

Dorycnio; Mandragoram, & contrà.

Draguntio; Ari.

Foliis Abietis; Populi folia.

Eryfimo; Erucam, & contrà.

Foliis Hippolapathi; Lapathi folia.

Foliis Piceæ; folia Pini.

Lathyridis foliis; Tithymali folia.

Libanotide sterili; folia Libanotidis coronari

Lepidij foliis; Nasturtij folia.

Nymphæa alba; luteam, & contrà.

Sorbi foliis; Mespili folia, & contrà.

Oxyacantha vera; Pyrastrum.

Foliis Pepli; Tithymali folia.

Pityusæ foliis; Tithymali folia.

Polygoni maris foliis, feminæ folia,

Filice femina; marem.

Seride; Condrillam.

Smyrnio; Apium aut Petroselinum.

Solano hortensi; Halicacabum.

Symphyti Petræi foliis; alterius folia.

Pro Beta alba; nigram.

Pr

IMITATIONE RONDELETII. 495

Pro vnus speciei Tithymali foliis; folia aliorum in laxando.

Pro Tragorigano; Origanum, & contrà.

Pro foliis Tribuli terrestris in refrigerando; folia aquatici; non in humectando.

Pro Hypecoi foliis; folia Papaueris.

Pro Verbasci vnus foliis; aliorum folia.

Pro Spica Indica, Syriaca; Valeriana.

Pro Viticis foliis & semine; Rutæ folia & semen.

Pro Seridis foliis; Lactucæ folia.

Pro Buglosso siue Boragine latifolia; Buglossum angustifolium.

Pro Soncho leui; Sonchum asperam, & contrà.

Pro Fumaria; Senam.

Pro Hyssopo; Origanum, Sampsucum.

Pro Hyperico; Androsimum, Ascirum, Schoenanthum.

Pro Stœbe Diosc. Stœben herbariorum, Iaceam, Scabiosam, Pastoriam bursam, Bellides, & Gnaphalia.

Pro Halyca, Auenæ ptisanam totam.

Pro Amylo; farinam siliginis siccam.

TA-

TABVLA PRIMA REFERENS CAPSVLAS
RADICVM ET CORTICVM.

5	Cosrvs.		Cinnamomū siue offic. cassia tenuis	Cortex inter- nus nucis moschatae	Asarum	
4	Zedoaria	Calamus odoratus	Cassia siue of- fic. cinnatho- mum crassum	Nux moscha- ta	Schoenan- thum	pro Corti- ce thuris
3	Zerumbet	Galanga maior	Phu	Macis	Spica Nardi	Cortex Pini
2	Mequin.	Galanga minor	Anthophylli	pro Folio malobathri	Spica Cel- tica	vel Len- tisci
1	pro Zingi- bere.	Cypero	Garyophyllis			

Corric. quer- cus	Cortic. mali- granati.	Cortic. my- robal. Citri- narum
Ilicis	Cortex nucis iuglandis	Kebularum
Suberis		Indarum
		Emblicarum
		Bellericarum

In hac tabella primum reposuimus Zingiber, quia frequentius eo utimur quam Mequim (quod species est Zingiberis) si fortè alterum pro altero sumatur, nihil inde mali sequetur. Zerumbet, Zedoariam & Costum in ultimis capsulis reposuimus, quia eis minus frequenter utimur. Hoc modo medicamentis dispositis multo minori negotio medicamenta parabuntur, ut quæ frequenter in compositionibus simul ponuntur, simul inueniantur. Adde quòd hæc medicamentorum dispositio ἀπὸ ἀλλόμεινα indicabit. Nam quæ in prima capsula ponuntur, pro secunda poni possunt, & e contra diminuto pondere. Cum dicimus quantitatem augeri, nolumus duplum substitui; quia hæc medicamenta non sunt duplo fortiora, quamquam pro Cinnamomo duplum Cassiæ iusserint antiqui substitui: nam si medicamenta

sint adedò imbecilla, satius est eis non uti, quàm duplo pondere substituere ea: nam moles medicamenti auge-
tur, & vis aliorum medicamentorum minuitur. Ut omnia
medicamenta ordine digerantur, oportet locum in mul-
tas classes diuidere, & in vna classe partes superiores at-
que inferiores. In iisdem classibus distinguenda erunt
medicamenta calida, frigida, sicca & humida, tam sim-
plicia quàm composita.

CAPSVLA RADICVM SECVNDA.

5	Costus dulcis Arabum		
4	Tussilago	Pistolochia	
3	Helenium	Clematidis	
2	Iris Floren- tina	Arist. longa	Hermodacty- lus
1	pro radice Iridis Ve- netæ	Aristolochiæ rotundæ	Asphodeli

CAPSVLA RADICVM QVARTA.

3	Cucumeris agrestis	Centauri minoris	Polypo- dij	Ellebori vtriusque		Hernodacty- lorum
2	Asphode- li	Suc. Rosa- rum	Tur- bith	Ebuli.	Asari	
1	pro rad. Gentianæ	Rhabar- bari	Agari- co	Hernoda- ctyli	Cyclami- nis	Asphodelo- rum

CAPSVLA RADICVM QVINTA.

3	Boragi- nis		Malua- rum	Thapsi barbati	Sphondy- lij	Radix Vlmi
2	Buglossi	Behen rubri	Bismalua- rum	Bistortæ	Pancratiij	Consolidæ minoris
1	pro rad. glycyrrhi- zæ.	Behen albi	Lilio- rum	Quinque- folij	Squillæ	Pro radice Consolidæ maioris

CAPSVLA RADICVM SEXTA.

5	Corticis rad. lauri	Asari	Staphidis agriæ	Behen rubri
4	Cort. rad. Sâ- buci, & Ebuli	Ari	Clematidis alterius siue Flammulæ	Behen albi
3	Fraxini, vel Populi	Serpentariæ	Rad. Dentil- lariæ	Boraginis
2	Rubia mi- noris	Raphani agrestis	Pyrethri	Buglossi
1	Pro rad. Ru- biæ maio- ris	Cortic. Sam- buci		Glycyrrhizæ

TABVLA SIVE CAPSVLA SEMINVM.

4

3

2

1

Pro sem. Cucurbitæ	Melonum	Citrulli	Cucumeris
Lactucæ	Portulacæ	Endiuæ	Scariolæ
Violarum	Papaueris albi	Papaueris nigri	Hyoscyami
Bombacis	Maluæ, Bifmaluæ	Psylli	Cydoniorum
Lini	Fœnigraci	Lauendulæ	Kervi rubri vel Citrini

CAPSVLA LIGNORVM.

5	Citrinum	Xylobalsamum	Scobs Buxi
4	Rubrum	Surculi Lentisci	Ebenum
3	pro Santalo albo	Aspalathus	Guaiacum
2		Ligno Aloës	Echinera- dic.
1			Salcaparilla

P U R G A N T I V M.

1. pro Scam- monio	3 Discriidium	3 Colocyn- this	4 Ammonia- cuni
Sena	Semen Car- thami	Folia Brasicae marinae	3 Salgeminae
Folia Scam- monij	Thymelaeae	Chanaxlae	2 Salpetrae
Semina hede- rae	Sem. Asari	Semen Geni- flae	1. pro Sale nitro

4	Thymus	Chrysocol- la, vel fortè Chrysolith.	Elleborus albus	Alhan- dal	Coccus Cnidius	
3	Epithy- mus	Lapis Ar- menus.	Niger	Diacri- dium	Semen Ca- taputiae	Rhaponti- cum
2	pro Cassi- tha	Lapide La- fuli	Colocyn- thide	Scammo- nio	Rad. Ti- thymali	Myrobala- ni s.
1						Rhabarba- ro

Polypo- dium	Rhabarba- rum	Chamae- læa	Efula
Turbith album	Lapathio	Thyme- læa	Turbith
Turb. ci- neritio		Brassica marina	Polypodio

S E M I N V M.

5	Capita pa- paueris	Acetosæ						Semenvio- larum
4	Semen Mandra- goræ	Portulacæ	Citrulli					Cnici
3	S. Hyos- cyami	Scariolæ	Melonum	Bifinalux	Foenigræci			Vrticæ
2	Papaue- ris nigri	Endiuæ	Cucumeris	Maluarum	Linl	Psyllij		
1	S. Papaue- risalbi	Lactucæ	Cucurbitæ	Bombacis	Sesami	Cydonio- rum		

SEMINVM.

5	Cemini	Pastin. syl.	Rutæ agrest.			
4	Carui	Pastinacæ domestice	Rutæ domestice	Sinapi	Semen cō- tra vermes	S. Paliuri
3	Feniculi dulcis	Petroselinii	Ammeos	Erucæ	Caulium	Hyperici
2	Anisi	Apij	Seseli Aethio- pici & Pe- loponensis	Thlaspi	Rapæ agre- stis	Milij Solis
1			Seseli Massi- liensis	Nasturtij	Rapæ do- mestice	Alkekengi

S E M I N V M.

Piper longum	Cardamomi maioris		3	Berberis	Sorbarum
Piper album	Cardamomi minoris	Granorum paradisi	2	Vuarum immaturarum	Mespilorum
Pipere nigro		Cubebarum	1	Spinæ albæ	Cornorum

pro { semine Myrti, Berberis, & contrâ. Mandragoræ, Cicutæ.
 Napi; Rapi. pro { Semine Afari, Semen
 Carthami, Vrticæ, vel Agaricus Genistæ.
 non Trochiscatus.

SEMINVM ET FRVTICVM.

5	Geni- flæ	Aceto- flæ	Gallarum	Cytini	Vua Co- rinthia		Ficus
4	Afari	Citri	Sumach	Balaustio- rum	Passulæ mundatæ	Tamar- Indi	Sebesten
3	S. He- deræ	Berbe- ris	Myrtillorū	Cortic. maligra- nati	Dactyli	Prunis acidis	Iuiubæ
2					Pruna dulcia		Passulis mundaris
1					Ficubus		

CAPSVLA FLORVM.

3	Oenanthes	Cichorei	Nymphææ luteæ	Sambuci	Saluæ	
2	Myrti	Buglossivulgaris	Nymphææ albæ	Meliloti	Stœcha- dis	Geniææ
1	Florib. Rofarū siue boraginis	Buglossi latif. Violarum		Chamæ- meli	Anthes	Sambuci
					Cytini	
					Balaustio- rum	

3	Leucoij	Flor. Cicho- rei	Spicæ, vulgo <i>Aspic</i>
2	rubri	Flor. Intubi domestici	Lauendulæ
1	Leu. lutei	Flor. Tama- risci	Flor. Saluæ
		Flor. Geniææ	

Pro Acaciæ succo; succus Prunellorum probatur, & Rhois, Diosc.

Dioscorides succum Hypocystidis substituit: verum aliquanto magis adstringit & siccat, si in antiquorum pharmacis recipiatur.

Pro Opio, Meconium; vel succus Lactuæ syl. vel domesticæ, quantitate maiori.

Pro Absinthij succo; Abrotoni, Eupatorij, vel Centaurei minoris vtriusque, vel Agerati.

Pro succo Absinthij Pontici; nostratis Romani succus: differt tantum regione, vt Macedonicum à Pontico. In externis remediis, Santonicum & Marinum; vel ablutum leuiter in internis concedatur.

Pro Opobalsamo; Stacte. i. styrax liquida non adulterata, vel oleum Myrrhæ. In suffusionibus ad digerendum; Oleū Spicæ Laudulæ, quod æquè tenuium est partium.

Pro Glycyrrhizæ succo, infusum & decoctum eiusdem; vel succus vuarum passularum; vel vinum coctum, siue sapa.

Pro Lycio; Amurca.

Pro Citri succo; Limonum.

Pro Thymelææ; Chamælææ succus.

Pro Cyclaminis; Iridis.

Pro

512 DE SVCCEDANEIS.

Pro Omphacij; Rhois, & contrà.

Pro Aloë; Absinthij succus.

Pro Semperuiui; Cotyledonis succus & cōtrà.
Vel Solani, Lactucæ.

Pro Sanguine Draconis; Laccam sustinuit
Auicennas.

Pro Elaterio; succus cucumeris agreſſis ali-
quantum coctus.

Pro Sapa; vinum dulce, & contrà.

Pro Licio; Gentianæ succus in vlceribus.

Pro aqua fontana; fluuiatilis.

Pro aqua plu. fluuij potius quàm fontana, con-
trà quàm Galenus præcipit in Diacodio,
quia composita est partim ex pluuia, par-
tim ex fontibus.

DE LIQVORIBVS
ET LACHRYMIS.

Pro Opobalsamo, Staete siue myrrha liquida
natura vel arte parata: Liquor Terebinthi.

Non { Opocarpalum, vt auctor Succeda-
neorum præcipit,
Olenm laurinum.
Liquor myrti.

Non semen Myrti, & Zedoariæ, vt præcepto-
res nostri statuerunt. pro Carpobalsamo se-
men

men Lentisci vel Terebinthi, cuius multæ
sunt species. Cubebæ in minori dosi; vel
Terebinthi partes duæ, vna Cubebarum.

pro Cedria { Oleum è ramentis Iuniperi pa-
ratum per descensum.
vel Gummi Iuniperi.

Pro Xylobalsamo, surculi Lentisci.

Pro Oleæ lachryma; G. Elemni.

Pro Myrrha; Bdellium, vel succus Smyrni,
vel Apij.

Pro Opopanace; Ammoniacum; vel Galba-
num; vel Bdellium, maximè cum emollire
volumus. Gal. vsus est Propoli in externis.

Pro Manna thuris; cortex cui adhæret ali-
quid thuris.

Pro Thure; Mastiche & resina pini sicca.

Pro Styrace; Benzoinum.

Pro Terebinthina; Mastiche.

Pro Mastiche; Abietina resina indurata aut
frixæ, vt docet Diosc.

Pro Cupressina; Laricina.

Pro Abietina; Resina pini.

Pro Pice, Resina pini cocta.

Pro pice liquida; pix oleo dissoluta, vel pix ex
oleo Iuniperi liquefacta.

Pro Pissasphalto; pix & bitumen.

k

Pro

515 DE SVCCEDANEIS.

Pro Mumia; Pissasphaltum.

Pro Alphalto; Petroleum; vel Gagates, & contrà. Et carbones petræi è terræ visceribus, quibus fabri ferrarij vtuntur.

Pro Lacca; Myrrha.

DE MINERALIBVS.

Pro Antimonio; plumbum vstum, & contrà. Auicen. & Stannum vstum.

Pro Lithargyro; plumbum vstum, Molybdæna.

Pro Plumbe, Stannum.

Pro Flore aris, ærugo.

Pro Spodio; Antipodium ex myrto, lentisco, olea, oleastro, malo cydonio, vel cornu cerui vstum.

Pro Pompholyge; Spodium Diosc.

Pro Cadmia; Lapis calaminaris.

Pro Sandaraca Græcorum; Auripigmentum, & contrà.

F I N I S.

INDEX IN VAL. GORDI

RECEPTARIUM.

A.		343, 344, 347, 348
Abrotonum	344	Amarena cerasa 198
Abſinthii Ponticum	161, 334	Ambra 297, 298
Abſinthium Romanum	161	Animentum dulce 355, 356
Abſinthium ruſticum	161, 324	Amomi loco quid 97, 79, 125, 146, 226, 265, 275
Acacia 125, 135, 425		Amomum verum 97, 99
Acacia ſuccedanea 388		Amomum falſe 96, 97, 99, 145
Acacia ſuccedanea 125, 131, 135		Amylum 40
Acini 359		Anchuſa 316
Acori loco quid 59, 79		Angelica 72, 139
Acorus 268		Anguria 211
Acorus verus quid 76, 125, 139		Animalium partium delectus 425
Adiantum nigrum 208		Anthera 291
Adipum præparatio 383		Antiballomena 403
Adulteria ſimplicium med. 425		Antophylli 26
Aeromeli 269		Apparine 345
Aerugo 353		Aquæ marina loco quid 308
Agaricus Trochiſcatus 287		Archeutida 278, 331
Ageratum 49		Aristoloch. rotunda 131, 196, 297, 306, 307
Agreſta 136		Aristol. tenuis 126, 132
Albatecha 289		Aromaticum Garyophyl. 10
Alleluia 340		Aromaticum roſatum Gal. 23
Alœs præparatio 379, 380, 396		Aromaticum Indicorum libellus Garçiz 22
Alum 102		Arthanita 361
Alvpias 196		Artimonium 103
Alvpias loco quid ibid.		Arum 134, 175
Alypum ibid.		Aſarum 45
Alzanahan, alchanach, alzanach 369		Aſpalathi loco quid 273, 274, 275, 276, 277
Amaracus 159, 273, 274, 275,		Aſpalathus 275, 274
		Aſphaltum 115
		k 2
		Aſple-

I N D E X.

Asplenium	169, 173, 308	Calamus arom.	268
Aurea Alexandrina	94	Calamus vnguentarius	279
Auri & argenti limaturæ	27	Camphorata	341
Aurum aut argent. foliatum		Capillus Veneris verus	208
merum	66	Carabe	298
Aurum coctum	96	Cardanimum	23, 24
		Carduncellus	340
Balanus Myrepica	328	Carduus benedictus	ibid.
Balaustium	100	Carneola	61
Balsami loco quid	52, 53, 94, 283	Carolina	178
Balsamita	53, 338	Carpobalsami succedanea	27, 53, 276, 317
Balsamum quid significet	98, 283	Carpobalsamus	317
Bardana	357	Caryon myrepicon	312
Batega	289	Carydion	ibid.
Baucia	112	Caryota	112
Bedeguar	178, 221	Caulis agrestis	106
Benedicta laxatiua	226	Cassa	128, 302
Bitumen Iudaicum	115	fistula	53, 123
Blatta Byzantia	278	extracta sine fol. Senæ	206
Borax	355	extracta cum fol. Senæ	207
Branca ursina	106, 338	extracta pro clyster.	ibid.
Brassica siluestr.	106	lignea	24, 53
Buglossa domestica	228	Cataputia maior	328
Buglossa siluestr.	316	Catharticum Imperiale	240
Buglossa vulgaris	186	Cathengit	362
Bulbi sem. loco	110	Catholicon	215, 216
Bunias	122, 127	Celtica	240
Bupthalmum	340	Centumneruia	339
Burungi	93	Cerotum infrigidans Gal.	365
Cachrys	140	Santalinum	ibid.
Calamintha campestris	28	Stomachale	366
Calamint. domestica	166, 167	Ceterach	169, 209
Calamint. montana	28	Cinnamum	32, 316
Calamint. sil.	167	Cinnamomum crassum	32
Calami arom. veri loco quid	273, 274, 276, 278, 301	tenue	ibid.
		Chalcitis	124, 125, 126
		Chalcitidis assatio	ibid.
		Chal.	

I N D E X.

Chalcu-cecaumenos	376	Cymbalaris	357
Chamædrys	58,60	Cyminum Carmenum	251
Chamæmelum	368	Cyperis	56,57
Chamæpitys	124,159,221	Cyperus rotundus & longus	57
Cherua	328	Cyphi trochisci	134
Cheyri	283,323	D Arseni	32
Colocynthis preparatio	382	Dauci Cretici loco quid	59,81,95,125,131,132
Comæ	29,123	Daucus Creticus quis	54
Condita varia	147	Denarius	239
Confectio cordialis	65	Dentalium	355
Hamech maior	219	Diacalamintho Gal.	29
Hamech minor	221	Mesuz	28
Liberans	63	Diacameron	26
Anacardina	93	Diacarthamum	232
Confectiones aromaticæ	20	Diacatholicon	215
Opiata	78, & seq.	Diacodion Actuarij	101
Conyza	336	comp. Mesuz	ibid.
Cōseruarum faciendarum ratio	148	simp. Mesuz	100
Conseruz varia	ibid.	Diacasia cum Manna	205
Consolida maior	103	Diacastorium	103
Corallium rutilum	102	Diacinnamomum	31
Corticum delectus	422	Diacydonium simplex	149
Costus	26,45	è succo cydoniorum	151
hortensis	345,346	compos.	150
Cotula maior	457	Diacorum	75
Crassula	339	Diacoutum	45
Cretamus agrestis	148	Diacuninum	30
Crinon	315	Diacureuma maior	50
Crispula	340	Diadamasenum	214
Critimum spinosum	77	Diagalanga	39
Crocus Cilicius	122,123	Diahyssopum	44
Coricius	130	Diairis Salomonis	41
Croton	328	simplex	ibid.
Cubebæ	278	Dialacca maior	47
Cyanea glycyrrhiza	230	Diamarenarum comp.	198
Cyclamen	361	simpl.	ibid.
		Diamargaritum calid.	35
		frigid.	

I N D E X.			
frigid.	34	Dosis Specierum ad libram	
Diambra	25	ynam mellis	79
Diamoron	196	Drosomeli	259
Valerij Cordi	197	Dulcis radix	102
Diamoschum amarum	38	ELaterium	254
dulce	37	Elect. de baccis Lauri	108
Dianisum Mesuae	24	Diapzonias	73
Dianthos	33	Ducis	58
Diaolibanum	78	Eleischof	227
Diapapauer	201, 202	Episcop.	ibid.
Diapenidion	40	Lactitix Gal.	66
Diaphœnicon	222	de Gemmis	60
in forma solida	224	Indum maius	216
Diaprasium	51	Indum minus	218
Diaprunum comp. laxat.	215	Iustinum	62
composit.	212	Lactificans Rasis	67
Diarrhodon abbatis	46	Lenitium	208
Diasatyrium Mesuae	110	Lenitium de Manna	209
Nicolai	109	Plinifarcoticon	68
Diasena	225	de Psyllio	227
Diathamaron	25, 26	Resumptrium	74
Diatrachacanthum calid.	42	Rosarum Mesuae	229
frigid.	ibid.	de succo Rosarum in forma	
Diatrion pipereon	57	solida	230
Diatrion santalon	55	de Sebeste	210
Diaturbith cum rhabarb.	230	Elelisphacon	95, 342
minus	231	Ellebori nigri extractio	393
maius	ibid.	Emplastr. album coctum	376
Diaxyloaloes	56	Apostolicon	373
Diazingiber	58	Apostolicon aliud	375
Dictamnus Creticus	223	de baccis Lauri	378
Diptamnus vulgaris	271	Basilicon magnum	377
Diploma	300, 301	de Crusta panis	378
Dosis sacchari ad conseruas		Diachylon compos.	367
149		Diachylon magnum	368
Dosis Specierum ad libram		Diachylon paruum	369
ynam sacchari in confect.		Diachylon simpl.	366
Solidis	20	Griseum	377
		de	

de Meliloto	369	Gallæ cupressi	291, 292
de Mucilag.	367	Gallion	142, 339, 345
Oxyrocenum	372	Gemma Populi	227
Triapharmacum	372	Gentiadis radix	131
Viride	377	Gersa serpentaria	355
Endiuia vera	167	Gersam faciendi modus	384
Entallium	355	Glandes siue suppos.	242
Epatis lupini præparatio	385	Glans vnguentaria	328
Epitaphium Val. Cordi	416	Gleba Armena	102
Eruce semen	93	Gluten Alehanach, alzanach	369
Esbrium	343, 348	Glycyrrhiza	20
Eldre Antidotus Actuarij	146	Grana Solis	226, 247
Antidotus Aërij	142	Granum Ben	328
Esulæ præparatio	383	Gratiola	49, 249
Eupatorij eiusque succi succedaneum	49, 178	Gummi splendidum	151
Eupatorium	49, 249	Arab.	125
Extractiones purgantium medicament. artificiosæ	392	vermiculatum	ibid.
Foeniculus porcinus	54, 71	Halus, aut Halum, siue Alum	102, 103
Filix	362	Harmela	268
Fisticum	111, 112	Helenium	316
Flores castæ fistulæ solutiæ	204	Hepatis lupini præparatio	385
Florum delectus	421	Hepatica	209
Flos aris	334	Herba crassula	339
Folia Caryophyllorum	225	Judaica	ibid.
Folij succedaneum	20, 21, 56, 69, 73, 140, 142, 178, 273, 274, 293	Sanctæ Mariæ	ibid.
Folium	21, 22	Moschata	340
Indum	124	Paralysis	149, 339
Malobathri	129, 133	Turca	340
Fraxinella	271	Venti	344
Fructus Balsami	129	Herbarum delectus	420
Fructuum delectus	472	Hibiscus	352, 353
Alanga magna	20, 21	Hiera Pachij	238
rufa	21	picra composita	234
		picra cum Agarico	ibid.
		picra simpl.	233
		picra	233

I N D E X.

piera Rhasis ad pilul. coch.		Lichen	209
230		Liguſtrum	321
Hieralogodium	235	Limatura auri, argenti	27
Hypocytis	101	Limaturæ ferri præparat.	381
Hysſopus humida	369	Lingua auis	90, 111
Iarus	336	ceruina	173, 345
Iasme	322	Lithontribon	70
Iatmini flos	ibid.	Lohoch ad aſthma	203
Indicorum aromatum libellus		de Papauere	201
Garcie	22	de Pino	200
Imperatoria	72	de pulmone Vulpis	203
Infuſio Roſarum	161, 162	ſanum & expert.	199
Violarum	162	de Scylla	202
Iris Illyrica	86	Luph planû, & Luph criſpum	
Iua	124	110, 112	
arthritica	159	M Abathematicum	106
moſchata	221	Macedonicum	60, 70
Iulep Roſatum	187	Macropiper	266, 302
Violatum	188	Magma Hedychroum	130
Iuncus Arabicus	128	Maiorana	273
odoratus	142, 146	Malobathrum	124
Iuniperus magna	278	Malobathri folium	129, 133
L Accæ ablutio	380	ſuccedaneum	124, 129, 131, 276
Lachryma Terebinthi	130	Malum terræ	238
Lachrymarum delectus	424	Mameræ loco quid	147
Lapathiolum	339	Mandragoræ pomorum ſucci	
Lapis Armenus	225	pænuſia quid	303, 304
cancrorum	298	ſoliorum loco quid	357
Lappa maior	357	Manna Orientalis	259
Laffulata	346	Manus Chriſti perlata	43
Lauendula	329	Marathrum	344
Laureola	336	Marum	273
Lepidium maius	254, 268	Mari loco quid	273, 276
Lepis chalcu	376	Matricaria	344
Leucopiper	302	Matris filua	340
Libanotidis ſpecies	139	Maturella	340
Libanum	372	Medulla ceraſorum	197
Libra medicinalis	20	Me-	

I N D E X.

Medullarum præparatio	386	Zaxenea	80
Medulla prunorū acetos.	212	Muzus Sapor	165
Mei loco quid	71,72,130,131	Myrobal. nigri	251,254
Mel Anacardinum	192	Myrrha Troglodytica	122
Emblicorum	ibid.	Myrrha	344,348
odoratum aromaticū Dan-		Myrtus	312,348
tiscanum	165,166	NAbuch	195
Rosatum	189	Napus	97,112,122
Rosatū aliud efficacius	190	Nardi Indica loco quid	142
Passularum	192	Nardus Celtica	86,134
Tabarzet	200	Galatica	128
Melanopiper	302	Indica	139
Mellis Artici loco quid	139	Nardus quid	62,73
Melon magnus Indus	289	Nasalia	242
Mentha aquatica	312	Nasturtium album	251
crispa	342	Nenuphar	34,182
Græca	345	Neromisch	67,68
Romana	346	Nerion	146
Saracenica	340,346	Nigra spina	131
Mentaltrum	288	Nihil album	358
Meum	54,71,72	Nucleus seminum quid	34
Meu	71,72	Nux Indica moschata	318,319
Meu loco quid	80,96,124	Myristica	59
Mezerei præparatio	383	Vnguentaria	318
Michleta	107	Nymphæa alba & lutea	34
Milium Solis	226	182	
Mira solis	329	OBolus	139
Mithridatiū Andromachi	140	Oculicancrorum	298
Damocratis	133	Ocymum citratum	37
ex Cleopatro & Antipatro	136	Oesypus	362,369
Mina cydoniorum arom.	188	Oesypum faciendi modus	386
Cydoniorum simp.	188	Oleander	146
Moschocaryon	318	Oleorum destillatio artificio-	
Moschus	23	sa	396
Mucharus	163	Oleum Absinthij	324
Muria	308	Amygd. amarorum	327
Musa Enea, siue Egetea vel		Amygd. dulcium	ibid.
		Anethrum	320
		k 5	Bala-

INDEX.

Balaninum	328	Sambucinum	322
de Cappare	308	Sampfuchinum	311
Castorei	305	Scorpionum compos.	306
Chamæmelinum	320	Scorpionum simp.	ibid.
de Cherua	328	Sesaminum	330
Cheyrium	323	Spicæ	329
Coffinum	301	Tartari	310
Cydoniorum	310	Terebinthinæ	ibid.
de Euphorbio	305	Violaceum	325
Formicarum	307	Vitellorum ouorum	312
Hyoſcyami	329	Vitrioli	400
Hyperici	313	Vulpinum	308
Iafininum	322	Olus-atrum	29,60,63,70
Irinum	313,317	Omphacinum oleum	311
ex Iuniperi granis	300	Omphacium	156
ex Iuniperiligno	299	Onyx	278,298
de Lateribus	309	Opium in oleo diſſolui non potest	303
Laurinum	329	Opobalfamum ſuccedaneum	
Liguſtrinum	321	Euritij Cordi	331
Lilinum	321	Opobalf. ſuccedaneum	27,50, 70,105,113,122,133,273, 276
Lumbricorum	307	Opobalfamum	97,98
Mandragoræ	303	Orchys	112
Maſſichinum	304	Origanum Creticum	251
Menthæ	324	Orientale	87
Mofchelinum	317	Origani Perſici loco quid	88
Myrtillorum	323	Origanum Perſicum	87,251
Myrrinum	ibid.	Oxymel compos.	190
Narciſſinum	321	ſimpl.	ibid.
Nardinum compos.	301	Scyllit. comp.	191
Nardinum ſimp.	300	Scyllit. ſimpl.	ibid.
ex Nymphæa citrina	326	Oxyſacchara compos.	173
Nymphæatum album	325	ſimplex	172
Papaueris	329	Pæonia	68
de Piperibus	302	Palma Chriſti	328,329
Populinum	326	Panis porcini	361
Populinum aliud	ibid.	Papauer	
Rofaceum	325		
Ruta	319		

I N D E X.

Dapauer rubrum	344	Benedictæ	250
Paralyfis herba	339	Cochiæ Rhafis	250
Parietaria	344	de Colocynthide	251
Pastilli Theriaci	113	de Cynoglossa	269
Pastinaca marina	77	de Eupatorio	252
Pelecini pænuria quid	139	de Euphorbio	ibid.
Perficaria	339	Fœtidæ maiores	253
Periclymenum	340	Fœtidæ Rhafis	253
Perfici flor. & fol. vapor & destillata aqua aluū soluunt	204, 205	de Fumo terræ	254
Petroleum clarū flauum	105,	de Hermodactylis	255
330		de Hiera compos.	256
nigrum & crassum	331	de Hiera cum Agarico	257
Petrofelinum agreste	53	de Hiera simpl.	256
Macedonicum	29, 60	Imperiales	265
Pharmacopœus qualis esse debeat	13	Indæ	255
Philoniū ex Gal. & Aegin.	83	de lapide Armenio	258
maius, sine Romanum	81	de lapide Lazuli	257
Mesuae	82	lucis maiores	259
Perficum	83	lucis minores	260
Phisticum	58	Mastichinæ	260
Phu	97, 131, 340	de Mezereco	258
Phyllitis	173	Pestilentiales	263
Phyllon	143, 145	de Oſto rebus	267
Pilul. de Agarico	247	de Opopanace	266
aggregatæ	248	de Quinq. gen. Myrob.	266
alephang.	243	de Rhabarbaro	262
alephang. Val. Cordi	269	de Sagapeno	267
de Aloë & mastiche	261	de Sarcocolla	263
de Aloë lota	262	Sine quibus	263
Arabice	245	Stomachicæ Alkindi	264
Arthriticæ	246	Stomachicæ Mesuae	265
Aſſaieret	245	Pillularum maſſa extract.	395
Aureæ	248	Pimpinella Germanica	339,
de Bdellio	268	345	
Bechiæ	269	Pimpinella Italica	343
		Pinguetinum præparatio	386
		Piper nigrum	29, 123
		Piſtadium	58, 111
		Planta-	

I N D E X.

Plantago maior	339	Radicum delectus	417
Plumbi præparatio	381	Radix concaua	296
Polium montanum	123	Ranich	100
Polytrichon	339	Raued	285
Pompholyx	358	Raued Seni	178, 249, 252, 259
Ponderum ratio	388	Requies Nicolai	85
Prasium viride	376	Rha siue Rheu Pontici præu-	
Primula Veris	149	ria quid sumi possit	26, 144,
Propolis	374		274
Prunorum siluest. vapor &		Rhabarbari extractio	394
aqua destill. aluum soluant		Rha Ponticum verum	98, 126
204, 205		Rhodostagma	283
Prunus siluest.	360	Rhus culinarium, obsoniorum	
Pseudodictamnus	271		103, 145
Pulegium ceruinum	288	Ricinus	328
Pulicaria	336	Rob de Berberis comp.	196
Pulmonis Vulpini præpara-		de Berberis simp.	ibid.
tio	385	Ceraforum	197
Pulpa Casæ fistulæ solut.		Nucum	196
204		de Ribes comp.	195
Ceraforum	197	de Ribes simplex	ibid.
Prunorum	212	Rosa asinina	68
Sem. Asparagi & Rusci		Rosata nouella	72
111. 226. 247		Rosmarinus	139
Tamarindorum	206	Rubricæ Lemniæ loco quid	
Puluis ad Epithemata cordis			137
77		Rubus Idæus	197
ad Epithemata hepatis	78	Ruscus	226
ad Glandes vel Supposito-		Sacchari libra in confectio-	
ria	242	nibus quantum specierum	
Puluis aut Tragea laxat.	241	requirat	20
medicaminis Turbith	240	Saccharum Tabarzet	31, 229
Senæ præparatæ	241	Sagapenum	109, 125, 126
Sternutatorius	242	Sal Hammoniacum	105, 106
Punicæ siluest. flos	202, 147	Salis Indi loco quid	255, 258
		Saliunca	27, 86, 95
		Salpetra	355
		Salvia Romana	345
		Sampsa-	
Q Vid pro quo	465		

I N D E X.

Sampfuchus	273, 301	Seta cruda	39
Sanguiforba	339	Sextarius	101, 343
Sanguinis Hirci præpar.	385	olei	315
Santalum Machoziri	21, 22	Sicilicus	102
Moschatellinum	34	Sigilli Lemnij loco quid	124
Sapa	181, 248	Sigillum Lemnium	114, 124
Sapphiri loco quid	65	Siler montanum	29, 124
Sapphirus	61	Simplex absolute scriptum	
Sarda gemma	61	quid denotet	434
Satyrium	109, 112	Simplicium delectus	417
Saxifragia	53, 63, 160, 240, 345	Sinapi album	93
Scammoneæ præparatio	382	Sinnus	97
Scariola	47, 55, 182	Sinon	ibid.
Scatuncellum	357	Sinonum	53, 97, 99
Schoenanthum	45, 48, 114	Syrup. de Absinthio maior	161
Schoenon	133, 138, 275, 277	Acetositis Citri	154
Scyllæ præparatio	383	Acetositis Limonum	155
Scincus	109	Acetosus compos.	154
Scolopendria	173, 209, 308, 345	Acetosus simpl.	153
Scolopendrium	281	de Agresta	156
Scordion	122	Arantiorū acetosorū	ibid.
Scorea ferri	88	de Artemisia	159
Scoreæ ferri præparatio	381	Byzantinus comp.	158
Secacul	76, 77, 89	de Byzantiis simpl.	ibid.
Seitaragi Indum	90, 254	de Calamintha	166
Semen rosarum	291	de Cichorio cum Rhabar.	168
Seminum delectus	421	Dinarij	158
Semperiviva minor	357	de Duabus radicibus	152
Sericum	39	de Epithymo	180
Serit	144	de Eupatorio	178
Serpentaria	112, 336	de Fumaria maior	163
Serpentariæ loco quod	384	de Glycyrrhiza	176
Sesamum	330	Granatorum acetosorū	157
Seseli	29, 96, 124	Granat. dulcium	157
Creticum	53, 55, 70, 71, 131	de Hyssopo	177
tenue	131	de Endivia comp.	168
		Infu-	

I N D E X.

Infusionis rosarum	161	78,282,291	
Infusionis violarum	162	Spodij præparatio	38
de Iribis	173	Spodium	28
de Lupulo	187	Squama aris	374,376
de Mentha maior	164	Styrax	123,128,304
de Mentha minor	165	rubea	104,105,286
Myrtinus compositus	184	Succedanea	463
de Nymphaea	181	Suchaha	178
de Papauere compos.	183	Succinum	271,297,298
de Papauere simp.	ibid.	Succorum delectus	422
de Pomis	156	Succus Borag. & Buglossæ,	
de Prassio	175	185,186,187	
de Quinque radicibus	152	Eupatorii	49,249
de Stæchade compos.	179	Scyllæ 359	Violarum 175
de Stæchade simpl.	ibid.	Sumach	103
de Succo acetosæ	185	Suppositoria, seu Glâdes	242
de Succo Boraginis	ibid.	Symphytum petrum	102,103
de Succo Buglossæ	186	Synononites lapid.	298
de Succo Endiuicæ	167	Syrupus de Pyris	123
de Succo Myrtillorum	184	de Cichorio Val. Cordi	ibid.
de Succo Violarum	175	Refectiuus	194
Violarum compos.	174	T Amariscus	88
Sifer	76,77	Terebinthinam coquendi	
Sisimbrium	57,312	modus	387
Sison	97,99,145	Terebinthi loco quid	130
Sistra	72	Terræ cimolix loco	145
Smaragdi loco quid	64	sigillatæ loco quid	64,65,
Smaragdus	61	84,124	
Solanum	358	Testiculi Vulpis	112
Sorba	360	Tetrahit 339	Thamar 26
Spargula	332	Thereniabin	252,265,
vera	345	282,290,293	
Species ad Suppositoria	242	Theriaca Andromachi	113
Spica Celtica	86,39,114	Androm. senioris	127
Lauendula	329	Diatestaron	132
Romana	86,95,134	Thymbra	30,44
Spina nigra vel cærulea	131	Thymiama	105,286
Spodij loco quid	64,65,74,	Hammoniacum	145
		Thlaspi	

I N D E X.

Chlaspbi	114, 251	Tryphera magna	85
thus album aut flauum	79	minor	87
masculum	ibid.	Persica	90
Tirus	272	Sarracenia	88
Tragea laxat.	241	Tussilago	182
Tribulus aquaticus	333	Valeriana	340
Trifolium acetosum	340	Vas duplex	300
Troch. de Absinthio	293	Venter Mergi	146
de Agarico	287	Vermicularis	357
Alhandal	293	Vesicaria	169
Alkekengi	289	Vini Falerni loco quid	276
Alindaracaron	130	Viola	207, 282, 283
Aliptæ moschata	286	Violaria	207
Bechij albi	294	Viperæ	122, 272
Bechij nigri	296	Viscus quercinus	374
de Berberis	285	Vlmus	367
de Camphora	290	Vmbilicus marinus	298
de Cappare	280	marinus	355
de Charabe	287	Veneris	357
Diaui	282, 283	Vnguent. Aegyptiacum	353
Diaion	ibid.	Agrippæ regis	332
Diarrhodon	285	Album	351
de Eupatorio	282	Album capsuratum	364
Gallix moschata	286	Apostolorum	333
Hedychroi	130, 273	Aregon	334
de Lacca	284	de Arthanita maius	360
de Lacca Val. Cordi	296	de Arthanita minus	361
de Myrrha	288	Aureum	354
Ranich	279	Citrinum	ibid.
de Rhabarb.	285	Comitissæ	358
de Rosis	289	Dialthæa compos.	353
Scyllitici	272	Dialthæa simpl.	352
de Spodio	291	Diapompholygos	358
de Succino Val. Cordi	297	Fuscum	357
de terra sigil.	291	Martiatum	336
Theriaci	130	Martiatum magnum	341
de Thiro	ibid.	Martiatum paruum	347
de Vipera	272	Pectorale	364
			Po.

I N D E X.

Populeon	356	Xylocasia	24, 251
Potabile	362	Xylocinnamomi loco quid	
Rosatum Mesuae	363	317, 318	
Rubrum caphuratum	364	Z Ambach	322
Vngula caballina	182	Zarnabum longum, rotun-	
Vua Lupina	358	dum	331
X Yloaloës	46	Zedoaria	62, 331
Xylobalsami loco quid	66,	Zurumbet	62
70, 513			

F I N I S H

LECTORI S.

HANC, candide Lector, editionem ferè
 absolueramus; cùm ecce offeruntur
 nobis à D. MATTHIA LOBELIO (pro
 ipsius vetere erga nos amicitia) Animad-
 uersiones quædam, necnon & emenda-
 tiores quotidianorum lenitiuorum vsi-
 tatissimorum solutiuiorumque medica-
 mentorum, quas alioqui passim offi-
 cinæ peruertunt, descriptiones: Quæ,
 vt emendatius paullo ac illustrius opus redde-
 retur, tanquam ἐπιμετρου adiuuere placuit.
 Tuum erit, hoc ab animo tibi gratificandi cu-
 pido profectum boni consulere.

Pag. 445. lin. 17. Quæ verò solius naturæ &c.
 pone in margine Syluius.

Pag. 449. lin. 22. pro botrus reponere botrys.

461. lin. 13. pro Scammonij ꝑ j. β. lege ꝑ j.

462. lin. 1. ante HIERA AROMATICA
 intersere hæc sequentia.

I

ELECTA-

ELECTARIUM INDVM.

Dissuadet præparationē Electarij Indi noster Rondellorius, quia non multum differt à Diaphœnico. Adstringentia & attenuantia Electario Indo addiderunt, quæ deteriorem potius compositionem fecerunt, & deprauarunt, vt exploranti facilè patebit.

LENITIVA È CASSIA
medicamenta.

E Cassiæ Ægyptiæ filiquis à diuersis auctoribus multa & varia medicamenta lenitiua descripta; minimè paranda aut dispensanda censentur, quia vel acescunt vel exsiccantur, & eorum laxandi vis perditur.

FLOS CASSIÆ.

E Cassiæ recentis & prægnantis fistularibus filiquis pulpa elicitor, quam florem Cassiæ & Cassiam extractam vocant: Sed cum Cassiæ filiquæ siue fistularis recens pulpa melius asseruetur in sua theca, quàm excreta; quid extractione ante vsum opus est? Triplex Cassia extracta in officinis prostare solet. Cassia extracta sine Sena & cum Sena. Cassia extracta cum Manna; Cassia cum saccharo & cum melle pro clysteribus & pauperibus. Si præscribat
tur

Cassia extracta.

tur à medicis,paretur hoc sequenti modo.

CASSIA extracta communis Nicolai.

℞. Horum violarum,

Violariæ siue foliorum violarum,

Maluæ,

Mercurialis,

Betæ,

Parietariæ ana M.℥.

Absinthij pontici siue vulgaris M.℥.

Herbæ istę virides coquatur artificiose in ℥q.

aquæ; è cuius colato ablue siliquas Cassiæ,

& dilue in eius portiuncula pulpæ Cassiæ

℥j. Mellis ex reliqua colati parte despu-

mati ℥ss. percoquantur lento igne ad ele-

ctarij formam.

DIACASSIA cum *MANNA* nō multum

differt à *Dia catholico*, nisi Sena; Rhabar-

baro & Polypodio,

DIACATHOLICON Nicolai, vel potius

è Dia-catholico liquamentum.

Huius vniuersalis medicamēti varia est de-

scriptio. Exemplaria vulgata habent pro pul-

pæ Cassiæ & Thamar-Indorum ana ℥ij^{bus}

sacchari ℥ij. id est ℥xxiiij. Andernacus au-

tem pro ℥ij. sacchari addit Cassiæ & Tha-

l 2

mar-In-

mar-Indorum ana ℥ viij. Rondelletius verò
℥ vj. mediocritate fretus. Hoc Catholicon
lene siue mite in suauissimam & lenissimam,
cum Cassiæ operatione maximè cōuenientem
compositionem, redegimus: quam è Dia-
catholico liquamentum diximus. neglecto Dia-
catholico maiore Fernelij, quod recipit Tur-
bith & Diagredium, ab his benignis medica-
mentis & intentione Nicolai multū aliena.
Paretur ergo in hunc modum.

℞. radicū filiculæ siue * Polypodij recentium
fol. Senæ mundatorum ana ℥ xvj.

Glycyrrhizæ rasæ

Anisi ana ℥ ij.

Seminis fœniculi ℥ j.

Foliorum violarum M iiij.

Florum violarum M j. s.

4^{or} seminum frigidorum maiorum ana ℥ j.

Contusa omnia, dempta Sena & seminibus
frigidis, floribusque violarum, 24. horas vel bi-
duo aquæ pluuiæ p' v. vel q. s. madefacta, de-
coquuntur leniter ex arte in balneo Maris; mox
paulo antequam ab igne deponantur, Senam
adiiciunt cum seminibus frigidis & floribus
violarum, maceranturque calidè aliquot horas
in balneo. Vbi tantisper refrigerint, linteolo
exco-

excolantur & leuiter exprimuntur, ne Polypodij & Senæ vis astrictoria eliciatur. Colatum iterum decoquitur, dū mellis crassitudo fiat, adiectis sacchari boni subrubri, perdulcis, vel albi pinguis ꝑ iij. Postea ab igne remotis adde floris Cassiæ vapore decocti præscripti extractæ & Thamar-Indorū ana ꝑ vj. sacchari candi & Penidiarum ana ꝑ jß. succi vel infusi ross. ꝑ iij. æstate addi poterit decocto libra vna succi Mercurialis defæcati & purificati. & pro diuitibus in singulas ꝑ scrupulus vel ꝑ ß. Rhabarbari selectissimi.

* Polypodij magna aut crassamentū, quia *Rondel.* copiosos flatus gignit, ventrem lædit, eumque magis obstruit quàm reseat; leuiter Polypodium decoquendum iussimus, vt efficacius suas vires, easque suauiores, exuat. Decoctionem enim mediocrē sustinet, quemadmodū Sena & Turbith, vti monuimus in nostris stirpium Observationibus Latinis. Ponderus eius etiam adauxi, quia vili emitur pauperum commodo; longèque maiori pondere in decoctis, vti Sena, & alia permulta, quàm in substantia, vt vulgus loquitur, assumitur.

Aliqui omittūt Saccharū Penidiarū leui incommodo, quia Penidix parantur ex saccharo pingui, leniente.

ELECTARIUM LENITIVUM.

Elect. Lenitium cōuenit cum Diacatholico & Diacalsia, quare eo carere possumus. Hæc de Electariis lenioribus sufficiant, pluribus humoribus, exustis potissimum expurgandis idoneis.

DIA-SEBESTEN.

Dia-sebesten Montagnanæ bilem tenuem euacuat. In Italia & regionibus calidis magis vsitatum quàm in hisce frigidis tractibus, ubi rarò dispensatur, quemadmodum Elect. è Psyllio Mesuæ, quo etiam carere possumus. Recipit copiosè scammonium cum trochis. è Spodio vel antispodio, ex Oxyacatha, trochis. Diarhodon, quò Scammonij vires remissiores sint, & alui fluores dispendiosæ vitentur. Pro hisce inusitatis electariis medicus doctus facile cholagogum rosatum decocto conueniendi siue è myxariis siue è Psyllio, Fumaria, Epithymo, Eupatorio, Rhabarbaro & huiusmodi pro ratione & natura morborum diluit.

ELECTARIUM è Succo Rosarum Nicolai fortissimum est cholagogum & minus castigatum aut emendatum.

Anti-

Antidotus siue CONFECTIO HA-
MECH apud Mesuem.

Ex veterum antidotis retinent hanc confe-
ctionem neoterici ob insignes vires ad omnes
morbos ex pituita salsa, flaua bile, adustisque
humoribus ortos, & prauos eorū ichores; sca-
biem, impetiginem, elephantiasin, luem Ve-
neream & quæuis cutis & cuticulæ vitia. Im-
probandi tamē sunt qui hac cōpositione vtun-
tur in pituita crassa euacuanda ob Myrobala-
nos, quæ magis impinguant materiam lentam
ex Galeni & antiquorum sententia. Sed quia
hæc compositio, vt scitè monet Rondelletius,
sine arte composita videtur: & contra theore-
mata à Galeno, Mesuico & aliis tradita: nam
infunduntur diutius & coquuntur maximè
inæqualia, vt Polypodium, Myrobalani, Ag-
ricus, Colocynthis, Rhabarbarum &c. lubuit
eius parandi rationem explicare. Quid enim
opus quinq. diebus in macerando Polypodio
ex sero lactis? cū nostra ætas ipsum Guaia-
cum lignum durissimum, eiusque cortices &
huiusmodi 24. horis aqua tantum feliciter
macerat. Serum autē diutius asseruatum facile
aescit, situm ducit & putret. Octo vel 10. ho-
rarum

rarum Rhabarbari infusum (præterquam in
 alui fluoribus, ventriculi & intestinorum im-
 becillitatibus, lubricitatibus & leuitatibus à
 bile alimentis permixta, vbi solemus exhibe-
 re fortem Rhabarbari expressionem & ipsum
 Rhabarbarū in tota substantia) commenda-
 tur à perbonis medicis, ne vis adstrictoria eli-
 ciatur. Hæc monuimus, vt nonnulli è nostris
 pharmacopœis sint paulò diligentiores in pa-
 randis pharmacis, ediscantque rationem com-
 ponendorum medicamentorū, quam ipsi mo-
 dum faciendi vocant.

℞. Myrobalanorum flauarum ℥ iiij.

Cepularum, Indarum,

Rhabarbari

Epithymi ana ℥ ij.

Agarici Colocynthidis

Polypodij querni ana ℥ xvij.

Absinthij Thymi

Senæ ana ℥ j.

Violarum ℥ xv.

Anisi Rosarum Fæniculi ana ℥ vj.

Succi fumarizæ ℥ xij.

Pruna numero sexaginta

Vuarū passarum à vinaceis purgatarum ℥ vj.

Polypodium leuiter cōtusum, cum passulis,
 Absin-

Abſinthio, Prunis, fæniculo & aniſo 24. horas
madefactum ex ſeri lactis aſinini vel caprini
q. ſ. in vaſe oris anguſti obrurato. ferueſce ali-
quot leuioribus ebullitionibus: deinde addatur
Colocynthis contuſa & forficibus incifa cum
agarico nodulo laxo excepta; Thymū, Epithy-
mum, Myrobalani, Sena, Viola, Roſæ & Rha-
barbarum, macerentur 12. horas, & vnica fer-
uefactione parumper decoquatur addito ſuc-
co defæcato fumarizæ, quia paucam aut fere
nullam ſuſtinet decoctionem. Cola leniter ex-
primendo. In colati portiuncula diſſolue
Mannæ ℥ ij. & coletur. Coque igne tantillo
colati reliquam portionem, addita ſeſquilibra
ſacchari boni uſq. dum mellis craſſitudinē ha-
beat. mox ubi refriguit, tepenti adhuc ſyrupo
miſce Caſſiam, Thamar-Indos, Mannam &
Scammonij præparati ℥ j. β. paulatim inſper-
gendo puluerem hunc.

Myrobalanorum flauarum

Cepularum

Indarum ana ℥ β.

Bellericarum

Emblicarum

Rhabbari

Seminis fumarizæ ana ℥ iiij.

l s

Semi-

Seminis anisi
Spicæ Nardi ana ʒ ij.

TRYPHERARVM *differentia.*

Trypherarū variæ sunt descriptiones. Quæ Galeno ascribitur apud Mesuem, recipit multa quibus Galenus nunquam vsus est, vt Moschum, Ambar, Caryophylli, Nux myristica, Macis & Santala.

Tryphera magna Nicolai cum opio paratur & sine opio, sed cum opium aufertur, adimenda Hyoscyamus & Mandragoras; cum non minus sterilibus mulieribus aduersentur quàm opium.

Est & alia Tryphera minor ad differentiam maioris ex arte Phenonis. Item Tryphera moschata Mesuæ &

Saracenicæ duplex { Mesuæ
& Nicolai.

Trypheram Persicam Mesuæ, quia apud multos vsu recepta & à medicis Rhotomagensibus & Rondelletio cōprobatur in refrigerando ventre, eodemq. relaxato cōfirmando & roborando, omnesq. humores fere euacuando cum astrictione & refrigeratione, sine vlla ventris læsione, retinuimus; delicatis & imbec.

imbecillis tutiorem futuram quam Antidotus
Hamech ob Diagredium & Colocynthida:
quamuis validiora medicamenta mitescant
cum aliis in pauca quantitate exhibita. Sic
enim paratur.

℞. Succorum Solani

Endiuæ faciuæ

Apij defæcatorum ana ℞ ij.

Succi lupulorum ℞ j.

Prunorum Damascenorum numero l.

Violarum recentium ℥ iij.

Foliorum Senæ

Myrobalanorum Citrearum

Cepularum

Indarum confricatarum in oleo

amygdalino dulci

Agarici ℥ j.

Castithæ ℥ β.

* Epithymi ℥ v.

Spicæ Nardi Indi-
cæ ℥ iij.

Feruefac paulisper,

** pro ℥ 4. Epithymi ut in veteri
exemplari legitur, Cordus, Anti-
dotarium Florentinum & alij non-
nulli ℥ 40. legunt. Succorum
autem præscriptorum ℞ j. Quæ
quantitas longè superat omnia huius medicamenti simplicia:
adde quod calidior foret eius operatio. & succi ingredientia
vix caperent quæ infundi debent. Syrupus ex Epithymo Mesue
cui nomen ab Epithymo tanquam præcipuo agente ℥ xx. tan-
quam Epithymi primo loco habet.*

cola,

cola, & incolati dimidio dissolue pulpæ
 Thamar-Indorum ℥ iiij.
 Pulpæ Cassiæ ℥ iiij.
 Mannæ ℥ j. β.
 Io-sacchari siue sacchari violati ℥ xij.
 Alteri colati parti adde sacchari optimi
 ℥ xxxvj.
 Aceti boni ℥ j.
 Coquatur igne leuissimo, & supradictis com-
 misceantur.
 Deinde adde sequentia in puluerem redacta
 Rhabarbari selecti ℥ ij.
 Myrobal. Citrinorum ℥ j. β.
 Indorum
 Chebulorum ana ℥ j.
 Bellericorum
 & Emblicorum ana ℥ β.
 Seminis fumarie
 Trochiscorum Diarhodon
 Macis Mastiches Cubeborum
 Spodij vel Antispodij ē Myrto vel Cydonio
 Santali citrini ana ℥ ij.
 Seminum Cucurbitæ
 Citrulli
 Melonum
 Cucumeris mundatorū } ana ℥ ij. β.
 Anisi

Anisi ℥ β.

Spicæ Nardi ℥ ij.

Tenuissimè trita inuoluantur oleo violato, &
fiat omnibus mixtis electarium artificiosè.

*Pilula Aggregatiua ex inuentione D. Mesua,
inter omnes Aggregatiuas potissima.*

Quia omnes humores implicatos è capite,
ventriculo, hepate & visceribus euacuant, Ca-
tholicæ vocantur, aut Diacatholico comparan-
tur; & quoniam ad multa utiles, multiq̃ue vsus
quotidiani; eius descriptionem damus ex ve-
teri exemplari depromptam.

℞. Myrobalanorum Citrinorum

Rauedseni ana ℥ iiij.

Succi Eupatorii Mesua, id est Agerati Diosc.

Succi Absinthij ana ℥ ij.

Diacredij siue Scamoniij præparati succo Ros.

Turbith boni

Aloës ana ℥ vj.

Myrobala. Chebulorum

Indorum

Agarici candidissimi

Colocynthidis

Polypodij ana ℥ ij.

Maltiches

Rosa.

Rosarum

Salis gemmæ

Epithymi

Anisi

Zingiberis ana 3 l.

Elect. Rosati Mesuæ q. s.

In his pilulis hoc reprehensione dignum, quod vulgus pharmacopœorū Cordū, Wecherum & alios secutus, tū in superiori Germania cum & inferiori, pro Eupatorio Mesuæ, Gratiolam, visceribus impendiō effrenatum hostem, substituant. Ageratum enim esse Mesuæ Eupatorium superabundē docuimus in nostris Stirpiū Aduersariis.

Hæc sequentia sub finem pag. 462. adiicienda, nempe post HIERA AROMATICA &c.

Quia in hisce Aquilonicis plagis tot seplarij, Salgamarij potius quàm pharmacopœi, Barbitonfores, Lithotomi, Circumforanei, Agyræ, Ludimagistri, medicamentarij indocti & sacrificuli vafri, rapaces & lucri auidissimi, nulla medicinæ parte illis probè peruestigata, per hominum mortes experimenta agitant, tam repentē hodie Medici aut potius Medica-


Medicasteri fiunt; qui tandem in locum experientissimorum Medicorum irrepserunt; magnæ gentis, rudis & rusticæ turbæ applausu: apud quos sordet, laceratur & malè audit ars Medica diuina, nobilissima & antiquissima, summo ægrotantium dispendio, & tædio proborum medicorum; consultò dataque opera eatenus & parcius attigimus, imò prætermisimus (tanquam nefas plagiumque profanare & perdere artem) medicatos succos siue nobilissima liquamenta, extracta cathartica vocata, quæ longè minori noxa & mole, maiori cum efficacia in corporibus egregiè operantur: tandiu vsquedum leges cessabunt in hos indoctos & inexpertos carnifices qui se medicos profitentur, ubi aliquot remediorum formulas memoria didicerint, animaduerrere.


F I N I S.


Métal


Handwritten text in a medieval script, likely Latin, arranged in two columns. The text is faint and difficult to read due to fading and ink bleed-through from the reverse side. The script appears to be a Gothic or similar medieval hand.


Handwritten text, possibly a section header or a specific line of text, located in the center of the page. It is also faint and difficult to decipher.













Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1595/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1595/A